




Cel
V 82.3
on







L'ORTO BOTANICO

DI PADOVA


NELL' ANNO MDCCCXLII

DESCRITTO ED ILLUSTRATO

DAL PROFESSORE

ROBERTO DE VISIANI

PREFETTO DELL' ORTO STESSO



6 Agostini dis. in pietra

L. 162

ETARDINO BY



Botanico Kier in Venezia

A. Tozzini del.

BOTANICO DI PADOVA

#. Roberto de Visiani

L' ORTO
BOTANICO
DI PADOVA
NELL' ANNO MDCCCXLII



PADOVA
COI TIPI DI ANGELO SICCA
Piazza del Duomo, N. 297.

Aug. 1912

27243

NOTIZIE STORICHE DELL'ORTO BOTANICO

E

DE' SUOI PREFETTI

Se il tessere brevemente la storia delle utili istituzioni fu sempre riputata opera commendevole e fruttuosa, come quella che le cause addita onde sorsero, e gli ostacoli che vi si opposero, e gli accorgimenti usati per superarli, e fa ragione a que' benemeriti che le immaginarono o le addussero a compimento; ciò a miglior dritto dovrà affermarsi di quelle, la cui fondazione stata essendo di grandissimo giovamento alle scienze cui appartengono, forma ragguardevole parte della storia delle medesime. Tra le quali ultime se io mi farò a riporre l'Orto botanico dello Studio di Padova, rinomato in ogni tempo per la vetustà dell'origine, per l'acconcezza e disposizione delle sue parti, per gli uomini celeberrimi che ne furono reggitori od allievi, certo nessuno che alla utilità sua alcun poco consideri, e vegga nelle opere dei botanici del secolo XVI. e XVII. quanti qui ne accorressero per istudiarne le rare piante, potrà giustamente accagionarmi di parziale affezione a questo insigne ornamento della padovana Università. E fu perciò che quella gloriosa Repubblica, che per ben quattro secoli resse i destini di queste avventurate provincie, trovò giusto il commettere sin dal 1741 al celebre Giulio Pontedera, che qui leggeva Botanica, la storia dell'Orto nostro; ed egli raunò a tal fine documenti e memorie in gran numero, che ora si custodiscono nella biblioteca dell'Orto stesso. Or di questi documenti, e d'altri ancora da me raggranellati frugando qui e colà nell'archivio della Università

e negli scritti de' botanici di quel tempo, mi venne in animo di valermi onde compilare e far pubbliche alcune brevi notizie sul Giardino di Padova e de' suoi Prefetti, con che sopperire nel miglior modo ad una storia circostanziata di lui, che tuttor si desidera nella scienza.

L'Orto di Padova, detto in origine Orto medicinale, ed anche Orto de' semplici, come quello che serba e coltiva le piante medicinali, che formano la maggior parte de' semplici medicamenti, fu fondato dalla Repubblica Veneta nella prima metà del secolo XVI. Dell'anno vero di sua fondazione grandemente discordano gli scrittori, altri riferendola al 1533, altri al 1535, alcuni al 1540, al 1545, ed anche dopo. Però doversi ella riportare al 1545 viene incontrastabilmente provato dal decreto stesso con cui il Senato Veneto la comandò, e che esiste nell'archivio della Università e fu da me pubblicato, nonchè dalla testimonianza dei contemporanei Marco Guazzo, Pietro Belon e Pietro Andrea Mattioli (1). Dalle concordi parole di questi autori, nonchè dagli atti pubblici dell'archivio suddetto, chiaramente raccogliesi come Francesco Bonafede, che sino dall'anno 1533 professava in questo Studio la *lettura dei semplici* (che è ciò che più tardi chiamossi *Materia medica*, ed ora *Farmacologia*), scorgendo la difficoltà d'insegnare ai giovani la cognizione delle piante medicinali senza farne ad essi la materiale dimostrazione; e sull'avviso eziandio dei Professori di Medicina, fra' quali particolarmente del celebre Giambattista da Monte; espose a quel Magistrato che soprantendeva allo Studio, e dicevasi dei Riformatori, la necessità di piantare un Orto pubblico, destinato alla istruzione dei medici, in cui si ragunassero da tutte parti, e specialmente dai paesi del Levante soggetti al Dominio Veneto, le piante medicinali; e nell'Orto stesso vi fosse una spezieria, ove si accogliessero saggi di tutti i semplici della miglior qualità, perchè potessero ivi studiarsi e distinguersi dai men buoni o dai falsi. Con ciò il benemerito uomo proponeva, oltre la fondazione dell'Orto, quella eziandio d'un Museo farmaco-

logico, nel che precorreva di un mezzo secolo l'Aldovrandi. Questa prima domanda del Bonafede, a cui devesi il pensiero della istituzione dell'Orto nostro, non essendo stata nè rejecta nè acconsentita, il Rettore della Università degli Artisti (sotto il qual nome s'intendevano tutti i professori e studenti non addetti alle Leggi) con sua lettera degli 8 Novembre del 1543 richiese al Magistrato la concessione della medesima; nè traendone ancora il frutto desiderato, con altra lettera dei 14 Febbrajo 1544 rinnovellò l'inchiesta; e fu a prezzo di sì ferma perseveranza che il Senato, mosso dall'evidente vantaggio di tal proposta, e dalle istanze che e gli scolari ed i dottori ne veniano facendo un dì più che l'altro, in data dei 29 Giugno del 1545 decretò in quel Consiglio, che chiamavano *dei Pregadi*, di acquistare in Padova un luogo acconcio, non già alla fondazione del Museo proposto dal Bonafede, sì invece alla fondazione di un Orto medico. Al quale incarico essendo stato eletto il dotto senatore Sebastiano Foscarini, ed avendo egli stimato opportuno all'uopo quello spazio di terreno che anche adesso è occupato dall'Orto botanico, ne stipulò di corto la locazione coi monaci di S. Giustina, che ne erano i proprietari, nel settimo giorno del Luglio successivo. Trovato il luogo, la cura di fondarvi sopra il Giardino fu confidata a M.^r Piero da Noale, già professore straordinario di Medicina nella nostra Università, ed in questa cattedra predecessore del Bonafede; al patrizio Daniele Barbaro, dottissimo uomo, Patriarca che fu poi d'Aquileja; e per l'esecuzione a mess. Andrea Moroni da Bergamo, che allora curava la costruzione del tempio di S. Giustina ⁽²⁾. Sul disegno pertanto immaginato da quest'ultimo si pose mano al lavoro; e puossi credere che questo sia stato incominciato poco dopo appigionato il fondo, e proseguito molto celeremente, se poco appresso, cioè nel 1546, l'Orto nostro era tale da meritare il famoso elogio fattone dal cenomano Pietro Belon, e l'altro più particolareggiato di Marco Guazzo ⁽³⁾. In quest'anno medesimo condotto l'Orto a tal punto da abbisognare dell'opera di un

botanico per essere arricchito di piante, e della vigilanza sua per essere custodito, venne dai Riformatori con lettera de' 18 Agosto invitato a presiedervi messer Luigi Anguillara, che alcuni tennero per Bolognese, altri per Ferrarese, ma che da Giovanni Kentmanno e da Corrado Gesnero, conoscenti ed amici suoi, nonchè dai contemporanei Marco Guazzo e Bartolommeo Marante, viene chiamato Romano. Il Guazzo anzi ne chiarisce sin la famiglia, dicendolo figlio del q.^m *Francesco Squalermo, physico del SS.^{mo} Papa Leone*. È poi molto probabile ch'egli fosse nativo di Anguillara presso Bruciano nello Stato Romano, per cui deposto il cognome gentilizio Squalermo, assunto avesse quello del natio luogo, e si chiamasse Anguillara, come atutamente argomenta il dottissimo Zeno (4). Discepolo l'Anguillara del cel. Luca Ghini, che aveva alcuni anni innanzi insegnata la Materia medicinale in Bologna, stava egli pure in quella dotta città, e per molto studio sugli antichi botanici, e per utili relazioni coi viventi a quel tempo, e per varii viaggi in tutta Italia, in Provenza, in Isvizzerà, in Istria, in Dalmazia, nel Peloponneso, nelle isole di Candia e Cipro, s'era levato in fama di sperto ed assai dotto botanico. Questo uomo, forse il primo Italiano che facesse viaggi botanici, che il grande Haller non dubitò di chiamare il maggior botanico che fosse stato sino allora in Italia, e che lo Sprengel appellò eruditissimo, e nella ricerca delle piante esercitatissimo (5), fu invitato a Padova col titolo di *Erbario e Maestro dell'Orto medicinale* collo stipendio di ottanta ducati all'anno, cresciuti a cento nel 1551; ned egli tardò guari a pigliarne il governo (6). Si fu questi il primo Custode e Prefetto dell'Orto nostro, giacchè il Bonafede, comechè promotore dell'opera, non fu mai chiamato a prendervi alcuna parte. Pietro Belou pone in suo luogo un *Luigi Mundella, erbario Romano*, e sulla di lui fede più altri; ma un tal nome non leggesi in alcun atto privato o pubblico di questo Studio, e dee credersi confuso e scambiato per errore coll'Anguillara. A questo fu dato l'obbligo di attendere all'in-

cremento ed alla prosperità del Giardino; e per agevolargliene la sorveglianza gli fu acconciata una casa che già esisteva nel medesimo, col debito di soggiornarvi (7); nè da quel tempo fu più permesso ai Prefetti di alloggiare altrove, *quo* (giusta il precetto di Catone) *assidua domini praesentia cultura melius procedat*. Non altro incarico ebbe mai l'Anguillara, nè insegnò qui la dottrina de' semplici, come affermò lo Sprengel (8); la qual cattedra restò affidata al Bonafede per tutto il tempo che l'Anguillara fu qui. Sotto la prefettura di lui nel 1547 si decretò che le immondezze delle pubbliche vie fossero recate all' Orto per ammendarne il terreno, e fu ordinata e compiuta, per facilitarne l'accesso, la costruzione di quel ponte che dicesi *delle Priare* (9). Durò quindici anni nell'incarico l'Anguillara, dal 20 Agosto 1546 alla fine di Luglio del 1561; nel quale anno, qual che ne fosse la causa, di qui congedatosi, riparò a Ferrara, ove nell'Ottobre del 1570 morì di febbre pestilenziale. A lasciar Padova l'ebbero forse condotto le calunnie con che i malevoli s'erano adoperati di renderlo sospetto ai Riformatori, benchè la Università lo avesse vittoriosamente difeso (ved. Facciol. *Fast. Gymn. Pat.* Vol. III. pag. 400 et seq.), e i motteggi e le ingiurie del Mattioli e dell'Aldovrandi (ved. Fantuzzi *Vita di U. Aldovrandi*, Bologna 1774, p. 60-64), come verosimilmente dubita il Tiraboschi (*Stor. della Lett. Ital.* Vol. VIII. pag. 555, ediz. ven.). Nell'anno stesso, ch'ei di qui si partiva, pubblicò un assai pregevole libro, contenente osservazioni su varie piante da lui vedute nei viaggi sopraccennati, ed intitolato *Semplici* (Venezia presso Vinc. Valgrisi 1561), nel quale argomentossi d'indovinare quali si fossero alcune piante tuttora oscure, di cui trattarono gli antichi, e segnatamente Dioscoride: lavoro penoso e difficile, in cui riuscì sovente più fortunato di tutti gli altri commentatori; onde il suo libro, cui non potrebbe rimproverarsi coll' Haller che la brevità soverchia delle descrizioni, per cui è talora malagevole il riconoscere la pianta che esse risguardano, fu assai lodato dal Seguiet, dall' Haller stes-

so, e dallo Sprengel. Lo tradusse, il commentò ed imprresse a Basilea il cel. Gio. Baubino nel 1593. Vantò l'Anguillara a discepolo l'illustre Jacopo Camerario.

Nel tempo stesso ch'egli reggeva l'Orto, i Riformatori, quasi a tutelare più amorosamente l'infanzia di questo loro prediletto Stabilimento, avevano dato incarico al patrizio Pier Antonio Michiel, versatissimo nella cognizione dell'erbe, di promuoverne ei pure l'incremento e l'arricchimento, concedendogli facoltà di trovare e pagare un giardiniere con ducati venti all'anno, e di chiudere affatto il muro circolare dell'Orto, che non essendo compiuto offeriva occasione a frequenti e pregiudizievoli ruberie ⁽¹⁰⁾. Il primo giardiniere, di cui resti notizia negli atti della Università, si fu un cotal Jacopo da Treviso, deputato a tener mondo e curato l'Orto medicinale, quale allora questo chiamavasi; ed ei vi prestò l'opera sua dal primo di Gennajo del 1553 a tutto il Gennajo del 1565 ⁽¹¹⁾. Adoperossi con amore il Michiel all'adempimento dell'obbligo assunto dal 1551 al 1554, come rilevasi dalla lettera 30 Marzo 1554 dei suddetti Riformatori. E come se ancor ciò fosse poco, il doge stesso Francesco Donato allorchè con lettera dei 23 Sett. nominava nel 1551 il cel. Gabriele Falloppio a Lettore di Materia medica, di Notomia e di Chirurgia, raccomandavagli insieme di *non negligere l'Orto suo*; e delle cure prodigatevi da quel grande trovava una testimonianza nelle opere di Pena e Lobelio, i quali affermarono aver veduto nell'Orto nostro un *elegantissimo albero di guajaco* seminatovi dal Falloppio ⁽¹²⁾. E si fu appunto per la congiunta opera del Michiel, del Falloppio e dell'Anguillara, che l'Orto stesso era salito, benchè recente, ad altissima rinomanza: laonde il Belon, che sin dall'anno 1546 visitandolo l'aveva predicato pel più magnifico degli Orti da lui veduti, rivedendolo nel 1557 trovò giusto di allargarne le lodi, e di parlare eziandio delle rare piante che vi crescevano, fra le quali non dimentica il falso guajaco sopra citato ⁽¹³⁾. Duolmi che nessun catalogo sia giunto a noi, da cui desumere il numero primitivo delle sue piante:

deesi però crederlo notevole rispetto ai tempi e dalle parole dello stesso Belon, e dal titolo di *ricchissimo* di che l'onora il Gesnero ⁽¹⁴⁾, e dalle frequenti citazioni delle sue piante registrate dall'Anguillara ne' suoi *Semplici*, e meglio ancora da una *Informazione sullo Studio di Padova* scritta intorno all'anno 1552 da Gianfrancesco Trincavello veneziano ad un gentiluomo suo concittadino, ch' esiste manoscritta nella Biblioteca di S. Marco in Venezia, da cui ritraesi che l'Anguillara avea riempito l'Orto d'erbe rare e bellissime, ponendovene più di 1500 sorte; numero non ispregevole se vogliasi considerare alla poca età del medesimo, ed alla ristretta somma delle piante allor note; e se abbiassi a ritenere, com'è molto probabile, che a quel tempo non vi si coltivassero che piante indigene.

Partitone l'Anguillara, volle fortuna che fosse di que' tempi in Italia Melchiorre Guilandino di Conigsberga, botanico illustre e sventuratissimo. Reduce egli da viaggi fatti per amore della scienza in Asia, in Palestina e in Egitto, mentre naviga dalla Sicilia alla volta del Portogallo, per poi recarsi alle Indie, viene ferito e fatto schiavo dagli Algerini. Francato appena di servitù con duecento scudi d'oro, mandati ai barbari qual prezzo del suo riscatto dal Falloppio, che gli era stretto d'antica e salda amistà, veleggia lieto verso l'Italia; ma dalle rive desiderate per fiera procella respinto, sbattuto novellamente sulle coste dell'Africa, a nuoto salvasi dal naufragio; ed approdandovi ignudo e rifinito, ottiene a stento per larghe promesse d'essere condotto a Genova. Ivi la liberalità di quei patrizii Battista Grimaldi, Paolo Spinola, Nicolò Doria, Baldassare Lomellino e Franco Lercari sopperisce a' suoi molti bisogni, e sovviene generosa a' suoi debiti. Ora quest'uomo, che le patite calamità e la fortezza dell'animo nel tollerarle non rendeano men venerabile che la dottrina, trovandosi per caso in Venezia, fu con mirabile concordia de' Padri eletto a successore dell'Anguillara cinquanta giorni dopo che questi si era tramutato di qua, come ricavasi dalla lettera di sua nomina, data dal doge Girolamo Priuli li 20 Settembre del 1561,

assegnandogli cenventiquattro ducati. Non appena fu egli preposto alla direzione dell'Orto ⁽¹⁵⁾, che rappresentò di corto ai Riformatori le necessità del medesimo; ed avutine i cercati provvedimenti, diessi a tutt'uomo ad arricchirlo di rare piante. Locchè veggendo il Senato, meditando il mezzo di rendere meglio utile e fruttuosa questa nobilissima istituzione, ed avvisando a ragione quali vantaggi ne verrebbero agli studiosi se alcun uomo della cognizione dei semplici addottrinato si facesse a mostrarli e dichiararli ai discepoli nell'Orto stesso ove erano coltivati, venne a deliberare con decreto 20 febbrajo del 1564 doversi al Guilandino *imporre il carico di leggere, mostrare e dichiarare nel medesimo Horto li semplici*. Con ciò fu creata allora, cioè diciannove anni dopo fondato l'Orto, la cattedra di Botanica, che per assai tempo si chiamò *Ostensione dei semplici*, onde distinguerla dalla Materia medica, la quale dicevasi *Lettura dei semplici*, e trattava dei rimedii composti e di quelli che traevansi dal regno minerale ed animale, ed era stata fondata già per opera del Bonafede sin dall'anno 1533 ⁽¹⁶⁾. Attese con molto amore il Guilandino al buon governo ed alla ricchezza dell'Orto, per cui s'ebbe in più tempi assegni straordinarii, quando per ristaurarne i malconci edifizii, quando per acquistarvi novelle piante, e quando ancora per intraprendere egli stesso alcuni viaggi allo scopo di raccorne altre per l'Orto. Fra le opere da lui promosse a vantaggio di questo resta tuttora memoria di una principalissima, quale si fu la costruzione di una macchina idraulica fattasi l'anno 1575, la quale posta in acconcio edificio fuori dell'Orto, e rimpetto al portone che guida ad esso, spinge l'acqua per sotterranei tubi nelle vasche e fontane del medesimo; con che provvedesi all'innaffiamento delle sue piante ⁽¹⁷⁾. Sussiste ancora antica e corrosa lapide, che ricorda quest'opera, la quale affissa prima all'interno lato dell'ala sinistra del portone d'ingresso, fu nel 1839 trasportata nell'atrio della casa ove abita il professore, coll'intendimento di sottrarla alle ingiurie delle stagioni. Ivi può leggersi, ed è la seguente :

HEVS VIATOR BENE PRECARE PRAESTAN
 TISSIMIS SENATORIBVS JACOPO FOSCARI
 NO DOCTORI PRAETORIQUE PATAVINO ET
 FRANCISCO DVODO PRAEFECTO PATAVINO
 QVI STIRPES SITI ARENTES ADDVCTA IN VI
 RIDARIVM AQVA LONGE REFOVERVNT ABI
 MDLXXV

Funse il Guilandino con tanto plauso ed utilità la novella scuola, insegnandovi tutto di che poteano abbisognare gli studenti per la piena conoscenza dei semplici, che il Senato trovata soverchia l'altra della Lettura tenuta in allora da Bernardino Trevisan, la sopprese; nè questa cattedra si riebbe se non dopo la morte del Guilandino medesimo ⁽¹⁸⁾. Ma quell'inculto Magistrato, crescendogli i carichi, non cessò di onorarlo con sempre nuove significazioni di stima; perlochè riconfermatolo più volte nelle due cattedre, accresciutogli in più epoche lo stipendio, sino a trecento settanta ducati o fiorini, dategli facoltà di scegliere ei medesimo a suo piacere e pagare due giardinieri, in luogo del solo che nominavasi dai Riformatori, volle con novità d'esempio dichiararlo professore in perpetuo, aumentandone lo stipendio fino a 600 ducati; nel quale però, come prima, erano compresi i salarii dei giardinieri ⁽¹⁹⁾. Dalle quali soleenni testimonianze della pubblica fede confortato egli quel più, arricchì l'Orto quant'era in lui, come puossi ritrarre meno dal Catalogo stampato dal suo discepolo Giorgio Schenck ⁽²⁰⁾, e da quanto ne dice ivi lo Schenck medesimo, ma e più dalle opere dei contemporanei Giovanni Bauhino, Matteo Lobelio, Corrado Gesnero, che ne accennano di molte altre esistenti in quest'Orto all'epoca del Guilandino, e delle quali ha tessuto un indice diligente il benemerito Pontedera nel volume primo della Storia dell'Orto nostro. Uomo nelle lettere ed in ogni parte della naturale filosofia versatissimo si fu il Guilandino, di raro ingegno, di singolare facondia, nello studio dell'erbe dottissimo, per cui il Ponte-

dera stesso non dubitò di scrivere aver egli a gran pezza vantaggiato tutti i suoi successori. Onorato dai Magistrati, amato da' suoi allievi, riverito da tutti, morì di colica in Padova addì 8 Gennajo del 1589, dopo ventitrè anni e tre mesi da che reggeva l'Orto, e la doppia scuola della lettura e della ostensione dei semplici. Pubblicò molte opere, e sono:

Apologiae adversus Petrum Andream Matthiolum. Liber primus, qui inscribitur Theon. Patavii ap. Percacchium 1558, 4.º

Papyrus, hoc est Commentarius in tria C. Plinii majoris de Papyro capita: accessere Hieron. Mercurialis repugnantia, qua pro Galeno strenue pugnatur. Item Melchioris Guilandini assertio sententiae in Galenum a se pronuntiatae, ac ejusdem Glossemata in praecedens Hier. Mercurialis caput. Venet. apud Ant. Ulmum 1572, 4.º

Epistola de quibusdam stirpibus ad Conradum Gesnerum.

De stirpibus aliquot Epistolae V. Patav. 1558, 4.º

Problemata XX.

Descriptio aviculae indicae, quae in perpetuo volatu est, quaeque dicitur Manuco-Diaca, vel Manucodiata.

Conjectanea synonymica plantarum. Pat. 1591. *Eadem publicante Jo. Georgio Schenckio.* Francof. 1600, 8.º

Lasciò morendo i suoi libri, che ora trovansi nella Marciana in Venezia, e buona parte delle sue sostanze alla Repubblica, che lo avea colmo d'onori e di benefizii; l'altra parte legolla a Benedetto Zorzi, cui era affezionatissimo. Fu sepolto nel chiostro di S. Antonio. Ebbe nemici acerrimi il Mattioli, lo Scaligero, il Casaubono; lodatori i primi botanici del suo tempo; amicissimo il Falloppio; seguaci di sua dottrina moltissimi, fra' quali un per tutti, Prospero Alpino. Durante la prefettura di lui nella coltura dell'Orto a Jacopo Trevisan era succeduto nel Marzo del 1565 Francesco Farinante, ed a questo il dì 1.º Gennajo del 1566 Matteo Borghesau, che vi stette fino al 1574, così attestandolo gli atti di questa Università.

Trapassato il Guilandino, fu con ducale dei 10 di Novembre del 1590 di Pasquale Cicogna dato l'incarico di *Custode dell'Orto ed Ostensore dei semplici* a Jacopo Antonio Cortuso, gentiluomo padovano, nella cognizione dell'erbe spertissimo, e coll' assegno di cento ducati. Assuntone appena il governo, chiese egli ed ottenne che fosse cinto di fossa l'Orto per impedirne le inondazioni ⁽²¹⁾, e due anni dopo furono a sua richiesta apprestati per Marco Manante fiammingo tubi di piombo per derivare l'acqua dalla macchina posta dal Guilandino alle varie parti dell'Orto stesso ⁽²²⁾. Questo fu a di lui cura arricchito per guisa, che ne uscirono in luce due cataloghi ragguardevoli delle sue piante: l'uno sopra citato pubblicato dallo Schenckio col titolo di *Hortus Patavinus*, Francof. 1600, 12.^o; l'altro intitolato *L'Horto dei semplici di Padova. In Venetia appresso Girolamo Porro* 1591, 12.^o: entrambi i quali danno una medesima enumerazione dei vegetabili che ivi si coltivavano del 1591, e sommarono a 1168; ai quali aggiungendo le varie specie, di cui non fu in quello nominato che il genere coll'aggiunta *e sue specie*, sarà agevole apporsi come l'Orto nostro potesse allora contare almeno duemila piante. Dalla prefazione posta dal Porro al catalogo per lui stampato si fa aperto come il Senato Veneto avesse risoluto d'abbellire l'Orto con ornamenti vaghissimi di statue rappresentanti gli Iddii od i personaggi dell' antichità più eccellenti nella cognizione delle erbe, di fontane e serbatoi d'acqua opportuni non solo ad innaffiarne le piante, sì ancora ad *irrigar tutto il Giardino con grandissima facilità; e sopra tutto di fabbricarvi fuori della muraglia che lo circonda intorno intorno stanze o camerette in quella forma che tuttavia si veggono principiate dall'uno e dall'altro lato della porta verso la strada, per dove s'entra in esso Giardino. Le quali stanze et appartamenti haveranno a servire a varie e diverse operationi attenenti alla materia medicinale, come per gratia d' esempio a fonderie, distillatorie, et altre sì fatte. Et in altra stanza particolarmente a ciò*

deputata si farà conserva di minerali, terre, pietre, gioje. In altra si conserveranno pesci ed animali marini, e tutti i mostri meravigliosi che manda il mare, sali, sponghe, coralli, e simili. Altre stanze serviranno per gli animali terrestri; altra per li volatili, che vi si terranno secchi e ben conservati. Tulche da così vario e diverso ordine di cose si formerà un bellissimo e meraviglioso Museo a pro e beneficio degli studiosi di questa rara professione. Et in questo picciolo Theatro, quasi in un picciol mondo, si farà spettacolo di tutte le meraviglie della natura. Le quali parole, che il Porro scrive avere udite dal Cortuso, ho voluto io qui riferire a far manifesto come il Senato Veneto precorresse di qualche secolo le altre nazioni nel bellissimo divisamento di raccorre in un luogo solo quanti sono i naturali prodotti, onde coll'agevolarne lo studio facilitare ancora lo scoprimento delle utili applicazioni, di che potrebbero eglino vantaggiare la Medicina. Pure, benchè apparisca dal sopra detto ch'erano di già incominciate le stanze per riporvi siffatti oggetti, non fu oltre proseguito il lavoro, nè condotto a termine il generoso proposito. Ignorasi la vera epoca della morte del Cortuso, che alcuni molto verosimilmente riportarono al dì 21 Giugno del 1603. Sembra diffatti ch'egli cessasse dalla vita e dall'ufficio in quell'anno in cui finiva eziandio la riconferma concessagli per anni sei colla ducale 19 Dicembre 1596 di Marino Grimani, giacchè dalla ducale dei 5 Agosto 1606 di Leonardo Donato ricavasi essersi offerto *prontamente* Prospero Alpino il dì 3 Ottobre del 1603 ad accoppiare in sè solo alla Lettura, ch'ei professava sin dal 1594, la custodia ancora dell'Orto, e l'ostensione dei semplici (resesi vacanti per la morte del Cortuso), ed esservi stato anco eletto dai Riformatori d'allora. Nulla pubblicò colle stampe il Cortuso: studiò però molto accuratamente le piante, giovò de' suoi lumi e fornì di specie ignote il Mattioli, il quale non contento di averne fatto onorevole ricordanza in assai luoghi de' suoi *Commentarii* sopra Dioscoride, volle pure intitolargli una pianta dal

Cortuso stesso trovata in Valstagna della provincia Vicentina, che appellò *Cortusa*, il qual nome tuttora rispettasì nella scienza.

De' giardinieri dell'Orto non havvi notizia negli atti della Università dal 1574, anno in cui fu rimessa al Guilandino la cura di sceglierli e pagarli del suo, la quale continuò ancora al Cortuso, sino a che nel 1593 fu questi incaricato di stipendiarli per conto pubblico; e solo allora apparisce essere stati scelti da lui a titolo di *primo e secondo Gastaldo* Melchiorre Zambon e Battista Carraro, i cui salarii si pagarono sempre in appresso dalla cassa della Università. Cominciarono il loro servizio dal 10 Aprile di quell'anno: lo Zambon con ducati ottanta, e poscia novanta sino al 1616; il Carraro con ducati sessanta sino al 1594; a cui li 24 febbrajo del 1595 successe Bartolommeo Tiso, che morì nell'ufficio in febbrajo dell'anno 1617.

Il celebre Prospero Alpino di Marostica, che reduce da un viaggio fatto in Egitto nel 1580 con Giorgio Emo, avea già nome illustre fra' medici e fra' botanici per opere pubblicate, e che sin dall'Aprile del 1594 tenea nello Studio nostro la lettura de' semplici, fu li 3 Ottobre del 1603 incaricato insieme della custodia dell'Orto e della ostensione de' semplici, come chiaramente ritraesi dalla testè citata ducale dei 5 Agosto 1606 di Leonardo Donato, esistente nell'archivio della Università, coll'aggiunta di soli ducati cinquanta all'anno alla sua paga ordinaria di ducati duecento. I meriti però distinti dell'insigne uomo movendo l'animo del Senato, gli valsero l'anno 1613 il cospicuo e inusitato aumento del suo stipendio sino a settecentocinquanta ducati. Illustrò sommamente le due cattedre che copriva, e l'Orto ch'ei dirigeva, e continuò in questi incarichi sino alla morte, avvenuta l'anno 1616. Diede in luce le seguenti opere:

De Rhapontico Disputatio. Patav. apud Petr. Bertolium 1612, 4.º

De Balsamo Dialogus. Venet. 1592, 4.º

De plantis Ægypti Liber. Venet. apud Franc. de Franciscis 1592, 4.º

De praesagienda vita et morte aegrotantium Libri VII. Venet. 1601.

De plantis exoticis Libri duo. Venet. apud Jo. Guerilium 1629, 4.º

De Medicina Ægyptiorum Libri quatuor. Lugd. Batav. 1719, 4.º

Historia naturalis Ægypti. Lugd. Batav. 1735, 2 vol. 4.º

All'Alpino per decreto del doge Giovanni Bembo dei 14 Gennajo del 1616 successe Giovanni Prevozio, nativo di Augst nella Svizzera, città altra volta considerevole, e detta *Augusta Ravracorum*, ora grosso villaggio a due leghe da Basilea. Insegnava egli allora la pratica straordinaria di Medicina, alla quale venne aggiunta la sola ostensione de' semplici, coll' accrescere di ducati sessanta lo stipendio proprio di quella. La lettura invece dei semplici stette per due anni vacante, e solo nell'anno 1618 con ducale dei 26 di Ottobre di Antonio Priuli fu conferita a Jacopo Zabarella. Sotto la prefettura del Prevozio fu ristaurata la casa, fu raccomandata e tramutata di luogo la macchina idraulica, e fu inoltre concesso un assegno annuo a un cotale Maestro Ambrogio, perchè ne curasse la migliore conservazione (23). Morì esso nel 1631, imperversando in Padova la pestilenza, e lasciò maggior fama di medico che di botanico. Pubblicò queste opere:

De remediõrum cum simplicium tum compositorum materia. Venet. 1640, 12.º

Hortulus medicus. Patav. ap. Jac. de Cadorinis 1681, 12.º edit. IV.

Medicina pauperum et Libellus de venenis. Lugd. 1693, 12.º

Scrisse ancora un Trattato *De compositione medicamentorum*, che si pubblicò da' suoi figli in Padova nel 1666 in 12.º

Nella coltura dell' Orto, sotto la presidenza del Prevozio, era intanto sottentrato a Bartolommeo Tiso nel febbrajo 1617 Domenico Zanetti, e nel 1625 vi si aggiunse qual secondo

giardiniere Biagio d'Asolo, poi nel 1628 trovasi indicato qual altro giardiniere un Tonello.

Morto il Prevozio, nominò il Senato, come da lettera del 17 Gennajo del 1631 chiaramente apparisce ⁽²⁴⁾, Giovanni Rodio danese tanto alla cattedra di Botanica e alla direzione dell'Orto, quanto alla lettura de' semplici, la quale era allora vacante per la morte di Jacopo Zabarella. Non esiste però memoria alcuna negli atti dello Studio nostro od altrove, da cui ritraggasi aver egli assunto questo duplice incarico. Per lo che rifiutatosi il Rodio, qual che ne fosse stata la causa, il Senato con ducale di Francesco Erizzo dei 9 Maggio del 1633 conferì l'uno e l'altro ad Alpino Alpini figlio di Prospero, il quale per le parole della ducale suddetta era da tre anni impiegato nell'ostensione de' semplici; dal che deducesi aver egli supplito al professore mancante sin dalla morte del Prevozio. Nulla trovasi di rimarchevole operato dall'Alpino nella sua prefettura, nè lasciò scritti nè opere pubblicate che ne raccomandino la memoria. Diè soltanto in luce i due libri *De plantis exoticis* del padre suo in Venezia nel 1627, e a questo forse accennano per isbaglio, confondendone l'editore col l'autore, le parole della ducale sopra citata, colle quali vien detto *aver egli mandato alla stampa un libro nella materia de' semplici*. Morì nel 1637. Prestarono l'opera loro in quegli anni ch'ei presiedeva all'Orto, Giovanni Macchion o Maggion dal 1631 continuando fino al 1694, Gio. Maria Zanchetto dal 1634 al 1637, e Giulio Rizzi o Ricci successo a quest'ultimo in quest'anno medesimo, e sino al 1664.

All'Alpino per ducale di Francesco Erizzo dei 13 Marzo 1638 seguì si nella ostensione che nella lettura de' semplici il celebre Giovanni Veslingio, nativo di Minden nella Vestfalia, conservando insieme l'insegnamento della Notomia e Chirurgia, che da più anni ei teneva nella nostra Università con altissima rinomanza, ed accrescendogli lo stipendio sino a settecento ducati all'anno. E il grand'uomo sostenne tutti e quattro gli incarichi con tal valore, e diè in tutti sì belle prove di

sua perizia, da essersi meritato e dai contemporanei e dai posteri durevole e chiara fama di distinto botanico ed anatomico. Nè men lodevole opera prestò il Veslingio all' Orto affidatogli; chè ritrovato da lui affatto privo di piante straniere ⁽²⁵⁾, fu arricchito ben presto di rare specie procacciate dall'Egitto, dalla Spagna, dalle Indie. Nè a ciò contento, indusse egli i Riformatori a mandare in Creta a spese pubbliche un botanico raccoglitore, che si fu Ignazio Des Champs fiammingo, il quale di quell' isola trasportò all' Orto quasi trecento fra semi e piante vive, di cui stampò un catalogo il Tommasini (*Gymn. Pat.* pag. 90). Per le quali cure crebbe il Giardino nostro in numero ed isceltezza di vegetabili, come lo attestano i due elenchi stampatine dal Veslingio; l'uno col titolo: *Catalogus plantarum Horti Gymnasii Patavini, quibus auctior erat anno 1642, Praefecto ejusdem Horti D. Jo. Veslingio* (Patav. 1642), che nomina 1602 piante; l'altro sotto quello di: *Catalogus plantarum Horti Gymnasii Patavini, quibus auctior erat anno 1644 etc.* (Pat. eodem anno), che ne annovera 1647, e che venne anche ristampato dal Tommasini alla pag. 99. Alle quali aggiungendo quelle registrate in un autografo del Veslingio posseduto dal Pontedera, il novero delle piante che educavansi nell' Orto nostro a que' tempi, per testimonianza del Pontedera medesimo, ammontava presso a duemila specie. Aveva il Veslingio, pria di venire a Padova, viaggiato in Grecia, in Palestina e in Egitto; perlochè aveva potuto commentare ed illustrare le piante egizie osservate e descritte già dall'Alpino, aggiungendovene altre ancora da quest' ultimo non vedute. Continuò il Veslingio sino a' tre di Settembre del 1649, cioè sino alla morte sua avvenuta in quel giorno, nel multiplice incarico, pubblicando le seguenti opere di Notomia e di Botanica.

De plantis Aegypti Observationes. Patav. 1638, 4.^o

Opobalsami veteribus cogniti vindiciae. Patav. 1644, 4.^o

De Balsamo Epistolae duae ad Baldum Baldum in Romano Gymnasio Practicae Medicinae Professori.

Paroeneses ad rem herbariam publicis plantarum ostensionibus praemissa. Patav. 1644, 4.^o

De florum usu Dissertatio habita anno 1602. V. Non. Maj. Pat. typ. Paul. Frambotti, 4.^o

Syntagma anatomicum. Pat. 1644, Amstel. 1666.

Oltre ciò scrisse un'elegante lettera a Pietro Servio, professore di Medicina in Roma, che pubblicò poscia il Tommasini (*Gymn. Pat.* pag. 86), e contiene una descrizione dell'Orto nostro. Fu sepolto nella chiesa di S. Antonio, e gli fu eretto nella medesima per cura degl' illustri Ottavio Ferrario e Giovanni Rodio onorevole monumento.

Continuarono sotto di lui nella coltura dell'Orto Giovanni Macchion e Giulio Rizzi.

Passato di questa vita il Veslingio, gli fu poco stante nominato a successore nella lettura ed ostensione de' semplici Giorgio Dalla Torre, gentiluomo di Padova, con ducale de' 6 di Ottobre del 1649 di Francesco Molin, ed a richiesta degli scolari. Sotto la prefettura di lui fu riparata la casa del Prefetto con palafitta nel fiume, che ne lambe il lato settentrionale, e col ristaurarne il coperto; fu quasi rinnovato l'idroforo; fu costruita una conserva per custodirvi le piante di Greta, d'Egitto, delle Indie, e d'altri paesi caldi; fu rallargata d'un terzo e migliorata la casa de' giardinieri. De' quali provvedimenti, che il Dalla Torre riferì allo zelo del senatore Angelo Marcello, allora prefetto della città, volle egli perpetuare la ricordanza con iscrizione da lui composta nello stile del tempo, che fu scolpita in lapide murata nell'interno del portone che guida al Giardino, donde per conservarla fu trasferita l'anno 1839 nell'atrio dell'abitazione del professore. Ivi essa può leggersi come segue:

ANGELO . MARCELLO

QVOD . MVSARVM . VIRETA . SILVESCENTIA IN
 TERLVCAVERIT . ATQVE . CRESCENTIBVS . HERBIS . CAS
 TALIOS . LATICES . INDVXERIT . NVDISQVE . STIRPIBVS
 FLORVM . CORONAMENTA . NATVRAE . MVN
 DVM . ADIECERIT . QVO . TEMPORE . VRBIS . PRAEFECTVS
 ERADICATO . OMNIS . HOSTILITATIS . ACONITO . PACI
 FERAS . OLEAS . LAVRIS . TRIUMPHALIBVS . INSEREBAT
 GEORGIVS . A . TVRRE
 REI . HERBARIAE . PROFESSOR . ORDINARIVS . HORTIQ . PV
 BLICI . PRAEFECTVS . B . M . P .

Attese ancora il Dalla Torre all'arricchimento del Giardino; perlochè ottenne un ordine dal Senato de' 23 Luglio 1661, affinchè fossero a spese pubbliche raccolte piante a tal uopo. Però un anno innanzi ne aveva egli pubblicato un elenco col titolo: *Catalogus plantarum Horti Patavini*, Pat. 1660; ed un altro con egual titolo ne diè in luce l'anno 1662; dai quali cataloghi, nonchè da uno serbatoci manoscritto dal Pontedera nel primo volume della sua Storia dell'Orto nostro, ricavasi che a' tempi del Dalla Torre vi si coltivavano meglio che 2272 piante, fra le quali non poche esotiche, come la *Cassia fistula*, *Tamarindus indica*, *Canna indica*, *Arum Colocasia*, *Jasminum odoratissimum*, *Coix lachryma*, *Ipomaea Quamoclit*, e molte altre. La estesa fama, di cui godeva il Dalla Torre non solo come botanico, sì ancora qual medico, gli procacciò dal Senato l'onore di essere con ducale 28 Agosto 1666 nominato professore di Medicina pratica straordinaria, conservando la ostensione de'semplici, ed abbandonandone la lettura, la quale con decreto dei 4 Novembre dell'anno stesso venne affidata ad Ilario Spinelli. Nè gliene venne gloria minore allorchè essendo stato richiesto il Collegio medico dello Studio, se l'aria di Padova e le sue terme potessero essere di giovamento alla malattia di che infermava la Elettrice di Baviera, ei vi rispose col pubblicare un libro intorno all'acqua

ed all'aria, che intitolò: *Junonis et Nestis vires in humanae salutis obsequium traductae*, Pat. 1668, 4.º La liberalità del Senato gli accrebbe in più volte lo stipendio, sino a che nel 1679 questo ammontava alla cospicua somma di 1550 ducati. Nè a ciò contento, lo promosse nel 1680 alla cattedra di Pratica medica ordinaria in secondo luogo, con ducale di Alvise Contarini dei 29 Ottobre, coll'obbligo però di continuare la ostensione dei semplici e la custodia dell'Orto. I quali incarichi sopravanzando per avventura le forze sue, chiese egli al Senato che quest'ultimo fosse dato a Jacopo Pighi, che leggeva già Notomia da più anni, promettendo di fare ei pure una qualche lezione, e d'invigilare alla miglior coltura dell'Orto; il che fu accordato con ducale degli 8 Agosto 1681 del doge medesimo Contarini. Ma tal sollievo concesso al benemerito uomo fu di corto interrotto dalla subita morte del Pighi, avvenuta nei primi mesi del 1683, e quindi poco dopo di un anno dalla nomina di lui alla custodia dell'Orto, per cui pochissimo poté operare a pro del medesimo; pure troviamo notizie negli atti pubblici aver il Pighi fatto raccor piante, estesone un catalogo conservatoci dal Pontedera, e fatto ristaurare la macchina idraulica e le fabbriche del medesimo, che ne aveano mestieri ⁽²⁶⁾. Morto il Pighi, profferse di bel nuovo l'opera sua il Dalla Torre quanto alla scuola, proponendo ai Riformatori l'ab. Felice Viali, già stato professore a Pisa, perchè sotto la sua direzione attendesse al Giardino; il che fu concesso dal Magistrato, a condizione che il Dalla Torre seguitasse nella ostensione dei semplici, ed il Viali abitasse costantemente nell'Orto, come ritraesi dalla lettera 20 Marzo 1683 del Magistrato medesimo. In appresso avendo il Dalla Torre pubblicata la sua *Historia plantarum*, e per gli anteriori e lunghi servigi essendosi reso degno di una speciale remunerazione, il doge Marcantonio Giustinian con lettera dei 3 Aprile 1687, dietro proposta dei Riformatori, lo promosse alla prima cattedra di Medicina pratica nello Studio; e riconoscendo non poterglisi conservare l'altra della ostensione dei

semplici, conferì questa al Viali. Cessò in tal guisa dalla prefettura e dalla ostensione l'uom venerabile, che da ben trentotto anni sosteneva con tanto plauso, e con manifesto vantaggio della scienza e dell'Orto, l'insegnamento dell'una e l'amorevole direzione dell'altro. Diede in luce le opere sopra citate:

Junonis et Nestis vires in humanae salutis obsequium traductae. Pat. 1668, 8.^o

Historia plantarum. Pat. 1685, fol.

Oltracciò pubblicò due cataloghi dell'Orto nostro:

Catalogus plantarum Horti Patavini, Pat. 1660, al quale fece egli stesso alcuni commenti in un suo manoscritto, che serbasi nella biblioteca dell'Orto stesso, e s'intitola: *In Catalogum plantarum Horti Patavini anno MDCLX editum Notae*; le quali però non furono pubblicate, ma servirono a lui per la compilazione dell'altro *Catalogus plantarum Horti Patavini*. Patav. 1662, 16.^o

Sotto la prefettura sua lo coltivarono, oltre Giovanni Macchion, Antonio figlio di questo fin dal principio del 1651 in assistenza del padre, e Filippo Picci o Rizzi dal 1660, qual altro assistente gratuito del padre proprio, cioè di Giulio, che già era giardiniere sin dal 1637. Avvenne in questo mezzo, che non albergando il Dalla Torre nel Giardino, ma nella casa paterna, che qual padovano ei possedeva nella città, Giulio attribuendo a sè solo il merito di avere levato l'Orto alla floridezza che allora vi si ammirava, chiese ai Riformatori che per tali benemerienze fosse accordato a suo figlio, sino a che avesse paga e posto fisso, tutto il frutto di quel terreno che circonda l'Orto medesimo, e che prima e poi era stato sempre lasciato a beneficio ed utilità del Prefetto. E ciò eragli stato consentito dal Magistrato con terminazione dei 15 Luglio del 1660; se non che il Dalla Torre, mosso da sì sfacciata impudenza, ne fe sì vive doglianze ai Riformatori, e chiamò siffattamente la cupidità insaziabile e la venalità d'ambi i Picci, che questi con decreto dei 30 febbrajo del 1661 furono cacciati dall'Orto. Per l'accaduto però avvedendosi il

Magistrato essere necessario, a togliimento di nuovi disordini, che il Prefetto continuamente vegli lo Stabilimento affidatogli, fu al Dalla Torre dai Riformatori *commesso di dover subito » portarsi ad habitare la casa dell' Horto, et nella medesima » fermare il suo soggiorno, acciò possa meglio invigilare a » tutto quello concerne il servizio dell' Horto, conforme è » di sua particolare obbligatione, e di nostra risoluta volontà.* » Espulsi i Picci, continuarono i due Macchioni nella coltura dell'Orto; però Antonio vi stette soltanto sino al febbrajo del 1664, nel qual mese passò di vita, e gli fu eletto a successore il dì 15 del mese stesso Tommaso Andreola, qual secondo giardiniere, o ajutante del primo. Il Macchion in seguito, gravato di 80 anni d'età, de' quali ne avea consumati 54 nel Giardino botanico, e mal reggendo alle fatiche indispensabili per coltivarlo, chiese ai Riformatori gli fosse concessa la soccorrevole e gratuita opera del nipote Antonio Tita, allevato già fra le piante, e conoscente di loro coltura: quel desso che passò poscia dalla umile condizione di giardiniere a quella di autore, pubblicando nel 1713 il catalogo dell'Orto che teneva in Padova il cav. Gianfrancesco Morosini, e ch'era dal Tita stesso curato; aggiuntovi un suo viaggio botanico pei monti di Feltre, di Bassano e de' Sette Comuni Vicentini. E i Riformatori vi consentirono, promettendo con lettera 5 febbrajo 1683, che il Tita succederebbe all'Andreola, quando questi da secondo giardiniere fosse promosso a giardiniere primario.

Assunto ch'ebbe il Viali, per la ducale 3 Aprile 1687 di Marcantonio Giustinian, la ostensione de' semplici, diessi a tutt'uomo a riparare il Giardino, ad accrescerlo ed abbellirlo; per cui il degno suo successore Giulio Pontedera non dubitò di scrivere in una lettera diretta a Nicolò Comneno Papadopoli, e da questo publicatasi nella sua *Historia Gymnasii Patavini*, Ven. 1726, pag. 16, doversi il Viali riputare quasi un secondo padre dell'Orto dopo il Bonafede, non essendo restato per lui che quel Giardino, a cui cedevano d' antichità e d' ampiezza tutti gli altri d' allora, fosse tenuto e predicato ancora primo

di tutti per nobiltà, per eleganza d'architettura, per copia d'acque, per vaghezza di edifizii acconci a ripararne le piante. Nel quale arduo proposito insistendo egli colle esortazioni, colle preghiere e cogli uffizii per tutti i 34 anni che ne tenne il governo, gli venne fatto di lasciarlo a noi di quella bellezza che vi ammiriamo. Furono perciò costruite nel 1694 le numerose fontane e vasche dell'Orto, ed eretto da'fondamenti il gran portone d'ingresso nel 1700, sui colossali pilastri del quale stanno scolpite al di fuori, a regola di chi v'entra, le parole: *HIC OCULI, HINC MANUS*; al di dentro le altre: *FULMINIS OPUS*; per indicare come la porta stessa traesse sua origine dall'essere stato incenerito dal fulmine un porticato antichissimo che prima era addossato alla porta vecchia, nella quale occasione fu rinnovata questa nella maestosa forma che or vi si scorge. Nel medesimo anno si fabbricarono presso alla casa del Prefetto quattro svernatoi per le piante; si rinnovò in miglior guisa la macchina idraulica nel 1702; e si fecero altre riparazioni ad essa, e all'edifizio che la rinserra, nel 1715; s'innalzarono nel 1704 due gran portoni del tutto simili al primo a settentrione ed a mezzodì, fregiando quello di due vasi di pietra contenenti imitate in rame due piante dell'*Ananas*, a que' giorni rarissime. Nel 1706 si sovrapposero eguali vasi con altre piante agli altri portoni, e si costruì il quarto rivolto a levante, che ancora mancava, e che cominciato sin dal 1696, non apparisce terminato che nel 1707. Si eressero statue ai botanici dell'antichità Salomone e Teofrasto, e busti a Fabio Colonna e Gianantonio Saraceno, ponendoli sull'elegante balaustrata che corona la sommità del muro che cinge l'Orto, e che cominciata già nel 1707, fu addotta a tre quarti del muro stesso sino al 1718 (27). Nè ciò bastando, piantato un bosco, procacciate piante dall'India, tutto rinvaguito, ampliato, il Viali lasciò l'Orto di Padova a' suoi successori in tale stato di floridezza da togliere a quanti lo seguirono la speranza non che di vincerlo, pur di emularlo. Peritissimo nella cognizione delle piante, come at-

testano gli encomii di che l'onorarono il Riva, il Pontedera ed il celebre Tournesfort, nulla egli pubblicò che sia fino a noi pervenuto. Durò nell'ufficio sino al mese di Marzo del 1719, nel qual mese con ducale di Giovanni Cornaro del giorno 17 al venerabile e benemerito vecchio, fiaccato dagli anni e dalle infermità, fu concesso onorato riposo, sostituendogli l'illustre Giulio Pontedera, d'origine Pisano, ma nato in Lonigo nella provincia di Vicenza, che i Padri anteposero al veneziano Lodovico da Riva ed al celebre svizzero Giovanni Scheuchzero, i quali a gara si disputavano questo incarico. Morì il Viali nel 1722.

Nè della fama che già godeva moltissima, nè della destata aspettazione, nè dell'accordata preferenza minore mostrossi poi il Pontedera, sia per opere pubblicate a pro della scienza, sia per cose fatte in vantaggio dell'Orto. Continuò egli i lavori lasciati imperfetti dal Viali; ma oltre ciò riparò efficacemente alla povertà di piante, ed alla negligenza estrema della coltura, in che a quel tempo era l'Orto caduto. Avvenuta nel 1694 la morte del primo giardiniere Gio. Macchion, era stato posto nelle sue veci il secondo giardiniere Tommaso Andreola, e in quelle di lui anzichè collocare quel Tita cui già era stato promesso, ma che sdegnava di stare agli ordini dell'Andreola, fu allogato un figlio di quest'ultimo, di nome Santo. Restato così in casa gli Andreola il governo e quasi la possessione dell'Orto, essi lo neglessero di tal guisa, che molte e rare piante se ne perdevano alla giornata, e di tutte era abbandonata la coltivazione; onde che, mentre per opera del Tita, passato a custode dell'Orto Morosini, che allora fioriva nella contrada di S. Massimo in questa città, quest'ultimo cresceva sempre in beltà e rinomanza, l'Orto pubblico cadde in sì basso stato, che il Viali fu costretto a farne lamentanza pubblica al Magistrato. Ma non cavandosene verun frutto, e protetti gli Andreola da troppo validi patrocinii, non ebbe forza il buon vecchio di affrontarne coraggiosamente il potere; per lo che paurosamente accomodandosi ai tempi, si diede

invece ed al tutto a curare la parte degli ornamenti, abbandonandone la coltura e le piante all'arbitrio di que' due tristi. I quali mandando un di più che l'altro in dileguo le ricchezze vegetabili accumulate dai precessori, lo avrebbero certamente condotto di corto allo stremo della miseria, se non veniva fortunatamente a ricattarlo dalle infedeli mani la operosa sollecitudine del Pontedera. Nominato alla prefettura ed alla ostensione de' semplici con ducale dei 16 Marzo 1719 del doge Giovanni Corner, senza mettere tempo in mezzo si fece a ristorar l'Orto dalle sue perdite, a ritornarlo alla buona coltura, ad animarne e in uno ad ammonirne i coltivatori. Ma e le cure e le esortazioni erano gittate; chè un bel dì, mentre egli viaggia pei monti ad oggetto di raccorre altre specie per arricchirnelo, gli Andreola ne sprecano per denaro e gli utensili e le piante: il che conosciutosi dal Pontedera, ed avvisando infruttuoso ogni più mite provvedimento, chiese e, malgrado il mal locato favore, ottenne lettere dei Riformatori del 5 Dicembre 1721, che ordinavano la espulsione di que' malvagi dall'Orto pubblico. Vi fu sostituito nel giorno stesso un operaio nella persona di Santo Migliorini, e li 3 Marzo 1722 fu nominato a giardiniere Silvestro Latini di Siena, a ciò proposto dal Pontedera. Da una informazione sull'Orto nostro, che leggesi nel volume vigesimo primo degli Atti degli Artisti, ritraesi che al Pontedera erano state consegnate dal suo predecessore soltanto quattrocento piante e centotrenta vasi; locchè basta a far conoscere a che stato fosse ridotto l'Orto. In pochi anni però per cura del suo Prefetto ve n'erano ben 7000 individui, oltre 5000 e più coltivati nei vasi (28). Per opera del medesimo vi si eressero due stufe maggiori e due minori, tutte e quattro riparate da vetri; si costruirono due forni sotterranei per riscaldare le conserve mobili, fabbricandone una nuova lunga 96 piedi, ed ampliando l'altra che già esisteva; e fra la casa del Prefetto e le stufe si edificò una terrazza a volta, sotto cui riparare nel verno di molte piante. Oltre ciò, sotto la prefettura del medesimo fu continuata e compiuta la balau-

strata che ancor rimaneva a farsi sulla quarta parte del muro che cinge l'Orto, e sta a dritta di chi entra in questo per la porta occidentale, la quale ripresa nel 1726, venne condotta a termine l'anno 1829. Furono ristorati gli altri edifizii dell'Orto stesso, ed assicurato il lato settentrionale del medesimo con fondamenta e con muro dalle corrosioni e dagli straripamenti del fiume. Di molte delle benemerenze del Pontedera resta memoria in una lapide murata nel fianco interno del gran portone esteriore alla dritta di chi entra, che così leggesi:

DANIEL . I . DELPHINVS
 SENATOR . PRAESTANTISSIMVS
 VRBIS . PRAEFECTVS . ET . PROPRAETOR
 AEDES . PVBLICAS . AC . STIRPIVM . HYPOCAVSTA
 REFECIT . SVBSTRVCTIONIBVS . ET . PARIETE
 PERPETVO . CONTRA . FLVMINIS . VIM . MVNIVIT
 SVMMO . BOTANICES . FAVTORI
 JVLIVS . PONTEDERA . HORTI . PRAESES . B . M . P .
 ANN . CIOCCCLIX .

Da molto tempo era costume di assegnare all'Orto per suoi bisogni ordinarii cencinquanta ducati veneti; ma al Pontedera vennero fatti assegni più generosi, e perciò trovasi ch'egli nel 1751 vi spese lire venete 2893:16; nel 1752 lire venete 3455:3; nel 1753 lire venete 3153:17; che a lui vennero compensate, aggiungendovi quel tanto che oltrepassava l'assegno ordinario dei ducati centocinquanta. L'utile suo servizio fu in più occasioni rimeritato di onorevoli encomii dal suo Governo, e gli valse sempre maggiori aumenti dello stipendio, sino a che nel 1752 con ducale 20 Maggio di Francesco Loredan fu portato sino a ducati 1400. Però, oltre la prefettura dell'Orto e la ostensione dei semplici, il Pontedera teneva ancor la lettura, come raccogliesi dalla ducale 7 Agosto 1721 di Gio. Corner, quantunque contemporaneamente avesse tal cattedra il prof. Gio. Maria Rossi; per cui è da credere che il pri-

mo dichiarasse soltanto i semplici vegetali, l'altro gli animali ed i minerali. Soppressa però definitivamente con decreto 27 Novembre 1738 dal Senato Veneto questa cattedra, fu incaricato il Pontedera della formale dichiarazione delle facoltà e degli usi medici delle piante, chiamandosi allora la cattedra di Botanica del doppio titolo di lettura ed ostensione dei semplici; e fu in pari tempo istituita altra scuola col nome di Lettura ed ostensione degli altri semplici, al professore della quale, che era allora Antonio Vallisnieri, restò appoggiata la soprantendenza e custodia del Museo di Storia Naturale (29). Durò l'egregio uomo nell'incarico sino a che bastògli la vita, cessando dall'uno e dall'altra nel 1757. Botanico spertissimo, ed insieme letterato ed erudito insigne, scrisse e di Botanica e di Letteratura e di Archeologia. Le opere pubblicate sono queste:

Compendium Tabularum Botanicarum. Patav. 1718, 4.º

Anthologia et Dissertationes XI de re herbaria et medica. Patav. 1720, 4.º

Antiquitatum latinarum graecarumque enarrationes. Patav. 1740, 4.º

Lasciò inedite Lettere e Dissertazioni di assai vario argomento, che il mio predecessore Giuseppe Ant. Bonato pubblicò poscia col titolo:

Jul. Pontederæ Epistolæ ac Dissertationes. Tom. II. Patav. 1791, 4.º

Fra queste stanno le tre Dissertazioni da lui dirette all'Accademia reale di Parigi d'Iscrizioni e Belle Lettere, mercè le quali egli discute i tre argomenti dalla stessa in tre tempi proposti: 1.º *Quibus anni temporibus mensibus diebusque in Romana Republica Consules inire honorem solebant.* — 2.º *Quodnam fuerit et quale romanae religionis institutum, graecumne, aut proprium ac patrium.* — 3.º *De graecorum πολιτεία.* Tutte e tre le quali furono riputate degne di premio dalla medesima. Lasciò inoltre una collezione di documenti da lui raccolti per la storia dell'Orto nostro, ch'ei

s'era offerto di scrivere, e per cui aveva ricevuto lettere e remunerazioni onorevoli dai Riformatori dello Studio in data dei 13 Settembre 1741, dei 20 Marzo 1744, e dei 27 Gennaio del 1747. Questo suo manoscritto, che ora conservasi nella biblioteca dell'Orto stesso, è composto di sette volumi di varia mole, nel primo dei quali n'è incominciata la storia la quale però non arriva che alla morte del Guilandino, e vi sono poi i cataloghi delle piante coltivatevi sotto ai varii Prefetti, co' sinonimi aggiuntivi dal Pontedera; negli altri vi stanno osservazioni botaniche da lui fatte, figure che a queste si riferiscono, e notizie storiche da lui raccolte relative all'Orto ed ai professori.

Malgrado l'avversione sua alle innovazioni allora fresche dell'immortale Linneo, e specialmente al sistema sessuale, e malgrado il poco conto in cui il Linneo sembrava avere le opere del Pontedera; pure fu riverito e lodato dai primi botanici del suo tempo, l'Eistero, il Monti, il Tilli, il Ludwig, l'Haller; ed il Linneo stesso trovò giusto di intitolargli un genere che portasse il nome del professore di Padova. Fu onorato della estimazione di quanti lo conobbero di persona, fu amato qual fratello dall'illustre Poleni, qual figlio dall'immortale Morgagni. Dopo la morte sua decretò il Senato che gli venisse eretto marmoreo busto in quell'Orto ch'egli aveva del nome e dell'opera sua mirabilmente nobilitato.

Sotto la prefettura del Pontedera a Santo Migliorini, che aveva abbandonato il servizio dell'Orto, fu sostituito con lettera dei 23 Dicembre 1727 dei Riformatori il fratello di lui Antonio Migliorini, che da qualche tempo lavorava nell'Orto stesso; ed a Silvestro Latini, che da diciassette anni teneva il posto di primo giardiniere, fu aggiunta con lettera 5 Giugno 1738 l'opera del di lui figlio Giovanni, il quale avendo in appresso assai negletta la coltura dell'Orto, e cagionata la perdita di due rare piante, fu cacciato dal servizio con lettera 4 Marzo 1748 dei Riformatori. Incaricato allora il Prefetto di proporre persona a ciò idonea, lo fece egli profferendo un An-

drea Candiano, che aveva incominciato il servizio sin dal 20 febbrajo del 1748. Ma questi pure lasciò il Giardino nel 1753; per cui con lettera 30 Maggio dell'anno stesso fu eletto a primo giardiniere, cominciando dal nono giorno del mese stesso, quel Pietro Arduino veronese, che distintosi poscia come botanico, ottenne di essere nominato a professore di Agricoltura in questa stessa Università.

Alla morte del Pontedera la custodia dell'Orto fu affidata alla perizia e diligenza dell'Arduino, e ciò sino alla nomina di Giovanni Marsili di Venezia, che reduce da viaggi fatti all'oggetto di arricchirsi ognor più di cognizioni scientifiche e letterarie, ma particolarmente botaniche, fu eletto a professore di lettura ed ostensione de' semplici ed a prefetto dell'Orto con ducale 24 Gennajo 1760 di Francesco Loredan. Adoperossi tosto il Marsili a rifornir l'Orto di piante, ed a ristorarne i pregiudicati edifizii. Fra le opere da lui fatte merita particolare menzione l'innalzamento considerevole di tutta l'area interna ed esterna dell'Orto, onde preservarlo dalle frequenti inondazioni del vicino fiume; nella quale occasione fece rialzarne gli argini, ripararne il ponte e la porta. Pubblicò egli le seguenti Memorie:

Fungi Carrariensis Historia. Patav. 1766, fol.

Descrizione della Firmiana, stampata nel primo volume dei *Saggi scientifici e letterarii dell'Accademia di Padova* 1786, pag. 106.

Del genere e di una nuova specie di Phytolacca, stampata nei *Saggi* stessi, tomo III. Parte I. pag. 104, anno 1794.

Lasciò inedite alcune *Notizie del pubblico Giardino dei semplici di Padova*, che furono pubblicate per le stampe nel 1840; nonchè un'altra operetta *Dei Patrizii Veneti dotti nella cognizione delle erbe, e dei loro Orti botanici più rinomati*, che si stampò l'anno stesso; gli autografi delle quali si custodiscono nella biblioteca dell'Orto. Erudito, letterato e botanico, il Marsili coltivando più studii mise insieme una bella raccolta di libri di vario genere, in cui però prevale la parte botanica: la quale acquistata poi dal suo successore il Cav.

Bonato, e da questo accresciuta, fu dal medesimo liberalmente donata all'Orto, di cui forma utilissimo e singolare ornamento. Sotto la prefettura sua l'Arduino, che aveva ottenuto il titolo di primo custode, onde distinguerlo come di merito così di nome dai giardinieri ordinarii, fu eletto a professore di Agraria nel 1763, e perciò nel 1768 fu nominato in suo luogo Andrea Vecchiato, ed al Vecchiato sostituito nel 1791 Antonio Lodi di Rovigo.

Giunto l'anno 1793, nel Settembre di questo con lettera dei Riformatori, attesa la molta età e le infralite forze del Marsili, era stato incaricato Giuseppe Antonio Bonato di Padova, allora bibliotecario della Università, a supplire al professore suddetto nella ispezione e soprantendenza dell'Orto. Ma giubilato quest'ultimo nell'anno appresso con ducale 27 Agosto del doge Lodovico Manin, fu colla stessa promosso il Bonato alla lettura ed ostensione de' semplici con tutti gli emolumenti annessi alla cattedra, meno l'alloggio nella casa dell'Orto, che fu riservato al Marsili sino alla morte. Molti meriti vanta quest'uomo egregio verso l'Orto botanico. Prefetto il Bonato, fu incominciato e bene avviato l'erbario del medesimo, fu ristaurata la metà del muro che lo cinge, furono riparati i muri ed i tetti de' suoi edifizii, furono fabbricate due conserve nuove in sostituzione alle vecchie; e più che tutto per munifica disposizione del principe Eugenio di Beauharnais, allora Vicerè d'Italia, comunicata con lettera 23 Maggio 1807 del Consigliere Moscati, direttore della pubblica istruzione, fu decretata la costruzione delle grandi serre, le quali compiute appena nel 1816, illustrano ora ed adornano questo antico stabilimento. Due cataloghi delle sue piante ne avea pubblicati il Bonato, dai quali apparisce qual ne fosse di quei giorni la ricchezza; mentre il primo, stampato nel 1812, ne nomina 4500 specie; l'altro, pubblicato nel 1820, ne porta il novero a 5500 all'incirca.

Ma era scritto lassù, che le fatiche e le cure dell'uom benemerito dovessero essere indarno, e che un solo istante dovesse

annientare il frutto di molti anni. Piombò difatti sulla città di Padova, e particolarmente sull'Orto, nel dì 26 Agosto del 1834 una grandine di mole sì sterminata, che malconcie, ferite o morte le piante che a quel tempo erano tutte all'aperto, e rotti i tetti degli edifizii, e fracassati i vetri delle sue serre, ridusse in brev'ora dalla floridezza passata le sue piante ad un ingombro di foglie lacere, di frondi spezzate, di tronchi ignudi; i suoi coperti, i suoi vasi ad un cumulo di macerie. A tanta sciagura venne meno e scorossi l'animo del buon vecchio. Il Governo però, ben consapevole degli utili servigi da lui prestati, per che altre volte allo stipendio ordinario al suo posto di fiorini mille aveva aggiunto alla sua persona altri 300 fiorini, nel concedergli quel riposo che ben meritavasi la più che ottuagenaria sua età, gli ottenne dalla clemenza del Principe le insegne dell'Ordine cavalleresco della Corona di ferro. Poco dopo la toccata calamità, le cui vestigia resteranno per molti anni visibili nell'Orto nostro, il Bonato, che l'amava di tenerezza, quasi volesse sopperire in alcun modo alle ricchezze perdute per la spaventosa meteora, lo volle fregiare d'un suo preziosissimo dono, per cui con lettera del 1835 offerì al Governo per l'Orto botanico di Padova il cospicuo presente della sua nobile biblioteca, la quale acquistata già dal Marsili, aveva egli arricchito di molte opere nuove e di gran valore. E questa conservasi nell'Orto nostro a perenne e cara testimonianza dell'affetto suo per un luogo ove egli, uomo integerrimo, botanico coscienzioso, professore zelante, medico celeberrimo, avea passato quarantadue anni di una vita utile ed operosa. Pubblicò, oltre le Epistole e Dissertazioni inedite del Pontedera, di cui premise la vita, e che illustrò con annotazioni, ed oltre i due cataloghi dell'Orto nostro sopra citati, le seguenti operette:

Pisaura automorpha et Coreopsis formosa, piante nuove. Padova 1793, 4.º

Epistola ad J. A. Cavanilles. Ib.

Metodo di curare la tenia. Padova 1775.

Osservazioni sopra i funghi mangerecci. Pad. 1815, in unione ai professori Dalla Decima e Brera.

Fu giubilato nel 1835, e cessò di vivere l'anno 1837. La scuola botanica, che insegnava prima la parte teorica della scienza, la pratica e l'applicata, e che in appresso fu limitata a quest'ultima, si teneva dal Bonato sino all'anno 1820 nell'Orto stesso; e solo allora cresciuto il numero degli accorrenti a tale da non poter capire nell'angusto e meschino luogo in cui si facevano le lezioni, s'incominciò a tenere alla Università. Nell'anno 1818 fu dato a questa cattedra, come ad altre, un assistente biennale, che dal professore dev'essere istruito nella scienza botanica, e pel qual posto si sceglie alcuno fra' giovani laureati di fresco che mostri più propensione a siffatto studio. Il primo nominato si fu il dott. Alessandro Sandi, al quale, confermato in tale ufficio per altri due anni, successe nel 1822 chi scrive queste notizie; a questo seguì il dott. Paolo Menegazzi; al Menegazzi nel 1830 il dott. Francesco Beggato; a lui nel 1832 il dott. Giuseppe Ruchinger, ora professore di Patologia e Farmacologia nella Università di Praga; a questo nel 1834 il dott. Francesco Pegoretti; al Pegoretti, morto poco dopo la nomina, il dott. Giuseppe Meneghini nel 1835, il quale ora professa le scienze preparatorie pei chirurghi in questa stessa Università; al Meneghini nel 1839 l'attuale assistente dott. Giuseppe Clementi. Continuò nella custodia e cultura dell'Orto sotto il Bonato il giardiniere Antonio Lodi; e qual primo operaio a Sebastiano Migliorini, morto nel 1849, sottentrò l'attuale Giacomo Raimondi.

Giubilato il Bonato, fu nominato a supplirgli temporariamente nella cattedra di Botanica e nella prefettura dell'Orto l'autore di questo scritto con decreto del Governo de' 14 Gennaio 1835, e poscia con Risoluzione Sovrana di S. M. FERDINANDO I. dei 9 Marzo 1837 fu stabilmente confermato nel doppio incarico. D'allora sino ad oggidì si fecero, per le zelanti sollecitudini del Governo, per la generosa protezione di S. A. I. l'Arciduca Vicerè RAINIERI, e per la Sovrana munificenza,

di grandi spese nell'Orto nostro. Si ristorò e quasi rifabbricò la metà meridionale del muro di cinta; si rifece presso che per intero la stufa che dicesi delle Palme; si costruì una stufa sotterranea lungo il muro meridionale dell'abitazione del professore; si ripararono infine tutti gli edifizii, le cordone, i cancelli, le fontane, le vasche dell'Orto stesso; e si eresse una grande e bella macchina idraulica in sostituzione dell'antica infracidita e inoperosa. Oltre a ciò, si piantò un boschetto di pini, ed uno assai più grande d'altri alberi forastieri nel terreno adiacente all'Orto; si allogò e dispose in regolari scompartimenti dinanzi alle grandi serre una ricca collezione di arbusti; si fornì stabilmente di piante esotiche la grande ajuola della Conserva mobile posta a levante, che sino allora non serviva che di ricovero ai vasi durante il verno; si cinse l'Orto di fossa e siepe; se ne numerarono e denominarono novellamente le piante. In uno degli stanzini intermedi alle serre si distribuì una bella collezione di frutta e semi; nel pian terreno della casa del professore si fe raccolta di tutte le sostanze che le piante esotiche naturalmente forniscono alla Medicina, di molti legni stranieri e nostrali, di funghi modellati in cera, di piante fossili, di preparati di notomia vegetale; e fu arricchito d'assai l'erbario cominciato già dal Bonato. Finalmente fu ordinato e già ben avviato il completamento delle opere di Botanica ch'esistevano imperfette nella biblioteca lasciata all'Orto dal Bonato medesimo. Restava, a compimento di tanti benefizii vòlti a ritornare l'Orto nostro al suo antico splendore, che la Sovrana munificenza accordasse a questo l'implorata costruzione di due nuove conserve per raccogliervi le ognor crescenti sue piante, e di un anfiteatro per le lezioni di Botanica, onde i numerosi studenti di questa cattedra trovassero nel luogo stesso anche qui, siccome in tutte le altre Università, l'insegnamento teorico e la ostensione materiale dei vegetabili di che servesi la Medicina. Ed anche questo nuovo ornamento dell'Orto nostro fu concesso dalla Sovrana liberalità con Risoluzione dei 3

Maggio dell'anno in cui siamo, e nel venturo anno sarà compiuto.

Toccata così rapidamente la storia dell'Orto di Padova e de' suoi Prefetti, stimiamo ora acconcio di porgerne una descrizione assai breve, però fatta di guisa che nulla ometta di ciò che vuol esser notato, e che ajutata dalla veduta panoramica dell'Orto stesso, che precede queste notizie, basti a rappresentarlo fedelmente a chi no 'l conosce, a rammentarlo a chi 'l vide. Posto fra le due insigni basiliche di S. Antonio e di S. Giustina, occupa una superficie di 20664,37 metri quadrati, serbando ancora inviolati i suoi antichi ed originarii confini. Era cinto in passato da un ramo del fiume Brenta, che bagnavalo da tutti i lati; e solo da pochi anni, per cessare il pericolo delle inondazioni fattesi assai frequenti, s'impedì con arginatura il corso all'acqua lungo i lati di mezzodi e levante; talchè questa ne lambe ora soltanto il lato occidentale e settentrionale. Rimpetto al primo, ed al di là della strada, sorge in acconcio edificio una bella, grande e solida ruota idraulica, che innalzando l'acqua suddetta, la manda poscia per sotterranei tubi di piombo a risalire e zampillare in diciassette fontane, ed a riempiere vasti serbatoi di piante acquajuole. Mette all'Orto un portone di rustica architettura, al sommo del quale stanno scolpite sin dalla fondazione le leggi imposte dai Riformatori dello Studio a coloro che movessero a visitarlo, l'austera latinità delle quali si attribuisce al celebre Daniele Barbaro, e mostrano quanto amore ponessero i Veneti a questo loro nuovo e pellegrino ritrovamento.

TRIVMVI RI LITTERARI I.

- I. PORTAM HANC DECVMANAM NE PVLSATO ANTE DIEM
MARCI EVANGELISTAE NEC ANTE HORAM XXII.
- II. PER DECVMANAM INGRESSVS EXTRA DECVMANVM
NE DECLINATO.
- III. IN VIRIDARIO SCAPIVM NE CONFRINGITO NEVE
FLOREM DECERPITO NE SEMEN FRVCTVMVE
SYSTOLLITO RADICEM NE EFFODITO.

IV. STIRPEM PVSILLIAM SVCCRESCENTEMQVE NE ATTRE
CTATO NEVE AREOLAS CONCVLCATO
TRANSILITOYE.

V. VIRIDARII INIVRIA NON AFFICIVNTOR.

VI. NIHIL INVITO PRAEFECTO ATTENTATO.

VII. QVI SECVS FAXIT AERE CARCERE EXSILIO MVLTATOR.

Nell'ingresso si fanno innanzi i vivai dell'Orto, riserbati agli alberi ed agli arbusti; a sinistra l'abitazione del Prefetto, appiè di cui stendesi a mezzodì una stufa sotterranea destinata a moltiplicare di talea le piante rare, a riaver le malate, a forzare la germogliazione dei semi de' tropici, a coltivare in ambiente assai caldo ed umido le Orchidee; e sul dinanzi un giardinetto a spartimenti simmetrici, sui quali schieransi in bell'ordine presso a 3000 vasi, che si seminano a primavera di ciò che ogni anno ritraesi dagli orti corrispondenti. A destra v'ha la casa de' giardinieri, e presso a questa l'antico bosco dell'Orto, folto di eccelsi alberi per la più parte stranieri, fra cui torreggiano giganteschi una *Gleditschia horrida* di ventotto metri, un *Carpinus Betulus* e un *Liriodendron Tulipifera* di ventinove, un *Ailanthus glandulosa* di trenta, una *Juglans regia* di trentatré; ma più che tutti si ammira un *Platanus orientalis* che tiensi contemporaneo alla fondazione dell'Orto, e che certamente colla enorme grossezza d'oltre due metri, e colla strana irregolarità del suo tronco, tutto nodi e bozze e bernoccoli, in guisa da far sembianza più di macigno che d'albero, sembra giustificare la tradizione, che gli attribuisce quasi tre secoli. Dal bosco vecchio si passa ad un novello di pini, di là ad un terzo di pari età (che posti furono entrambi l'anno 1836), ricco d'alberi dell'America boreale, oltre il quale s'innalza il lungo edificio delle serre. A questo fa specchio un largo spiano ad ajuole, di figura semi-rotonda, che contiene una numerosa collezione di arbusti appartenenti alle famiglie dei Gelsomini, dei Caprifogli, dei Ramni, delle Berberidee, e sopra tutto delle Leguminose e delle Rosacee. Le serre, costruite con molta intelligenza dal-

l'architetto Antonio Noale sopra disegno del professore Alessandro Barca sin dalla fine del 1807, formano un fabbricato lungo cinquantacinque metri, vólto a mezzodi, e diviso in sette stanzoni di varia ampiezza, che per opera di sotterranei fornelli si scaldano a diverse temperature. Vi si distingue una ricca serie di piante grasse, e vi albergano in notevoli dimensioni i rappresentanti della vegetazione di tutti i climi. Vogliono esservi ammirate o per rarità di specie o per mole alcune *Acacie*, alcuni *Cacti*, un' *Hura crepitans*, una *Coccoloba pubescens*, una *Carolinea insignis*, la *Vanilla planifolia* fruttifera già da due anni, la *Urania speciosa*, la *Cinchona floribunda*, l'*Artocarpus integrifolia*, la *Nepenthes distillatoria*, e le singolari *Tillandsia dianthoidea* e *T. Duratii*, che, di poca acqua contente, vivono, crescono e fioriscono senza terra e senza radici, sospese all'aria in canestrino metallico. Ma più presto che ogni altra muovono la piacevole meraviglia de' risguardanti i maestosi Banani (*Musa sapientum*, *rosacea*, *rubra*, *discolor*), che piantati in terra nella penultima stanza serbata a dar saggio della magnifica vegetazione dell'Asia, e parata tutta a verzura co' tronchi appiccatucci e lunghissimi del *Ficus stipulata* e di più Passiflore, gareggiano di beltà e di grandezza colle Palme fra cui s'innalzano, ma che per la celerità del crescere ricoprono e vincono colla sterminata ampiezza il verde e gajo di lor fogliame. De' quattro stanzini intermedii alle tre serre maggiori, ne' due primi e nel quarto stanno le piante della Nuova Olanda, ed altre che dicono di aranciera, fra cui vuol essere specialmente osservata una numerosa collezione di *Acacie*, e le superbe *Araucarie* (*A. excelsa*, *brasiliensis*, *imbricata*). Nel terzo stanzino ritrovasi invece una ordinata collezione di frutta e semi. Dalle serre si passa all'Orto centrale, cinto circolarmente da un muro, sul quale corre una elegante balaustrata di pietra, fregiata di qua e di là dal portone orientale dei busti de' botanici Fabio Colonna e Giannantonio Sarraceno, e dei prefetti di quest'Orto Prospero Alpino, Giulio Pontedera e Giovanni

Marsili. Vi conducono quattro grandi portoni, ornati al di fuori di una fontana con ampia vasca; ed oltre a ciò, quello a settentrione è decorato della statua di Teofrasto, erettavi dal podestà di Padova Federico Venier; quello a levante di una simile di Salomone, innalzata dal podestà Domenico Tiepolo; ed il terzo o meridionale dovea portare la statua di Dioscoride, che però non vi fu mai collocata. Colossali pilastri in pietra, chiusi da robusti cancelli di ferro e bronzo, compongono i portoni suddetti. La superficie dell'Orto, per viali maggiori e minori, retti e curvi, è divisa in più spartimenti di varia forma, guardati presso che tutti da cancelletti di ferro: gli spartimenti stessi sono, oltre ciò, ripartiti ancora in ajuole disposte in varia e regolare figura, contornate tutte di cordonata di pietra, la quale separando l'una pianta dall'altra, serve a tenerle ognor divise e distinte. Qui fermano l'attenzione due Magnolie d'insigne altezza, che si contano fra le prime introdotte in Italia; una *Ginkgo biloba*, una *Quercus coccifera* di mole straordinaria, e due scelte piantagioni di vegetabili della Nuova Olanda, del Perù, dell'Africa boreale, e d'altri climi più miti, che crescono in piena terra lunghesso il muro di cinta, ov'esso guarda fra levante e ponente, e sono divise in due parti; la occidentale delle quali chiamasi *Conserva delle lastre*, la orientale *Conserva verde*. Ambedue vengono riparate nel verno coll'applicare in autunno alla balaustrata del muro stesso un tetto mobile ed un'invetriata al dinanzi, che poi si tolgono a primavera. Egli è a questo provvedimento che dee l'Orto di Padova la bellezza e la mole di quelle piante, che altrove allevate in vaso, appena vivono rappiccolite e stentate; fra le quali vuol essere veduto un bell'albero d'*Hibiscus mutabilis*, e grandi individui di *Clerodendron fragrans*, *Brugmansia candida*, *Ficus elustica*, *Acacia vera*, *Garuga pinnata*; più specie di *Eucalpti*, di *Lauri*, di *Metrosideri*, di *Melaleuche*, di *Leptospermi*; e sopra tutti una maestosa Palma a ventaglio (*Chamaerops humilis* var. *arborescens*), che da un folto cespuglio di otto tron-

chi innalza sugli altri il maggiore di questi a più che sei metri di elevazione.

La distribuzione delle piante nell'Orto tutto è per ordini naturali, tranne una sola parte del medesimo, ove stanno raccolte tutte le piante medicinali che vivono in piena terra, ed una porzione di quelle che crescono lungo il muro di cinta, e si coprono nell'inverno. Vi si coltivano presso a diecimila specie, che riuscì di raccorvi dopo la spaventosa gragnuola, che nel dì 26 Agosto 1834 l'avea disertato, e ristretto appena a tremila. Tiene operosa corrispondenza con cinquantadue Orti botanici dei più cospicui d'Europa, quali sono quelli di Mosca, Pietroburgo, Dorpat, Kiew e Varsavia nell'Impero Russo; di Vienna, Gratz, Lipsia, Dresda, Pillnitz, Gottinga, Amburgo, Cracovia, Erlangen, Monaco, Berlino, Grifswald, Erfurt, Bonn, Königsberg ed Halle negli Stati Germanici; di Trieste nell'Illirico; di Pesth nell'Ungheria; di Ginevra e Zurigo nella Svizzera; di Montpellier, Dijon, Strasburgo, Lione e Parigi nella Francia; quello di Lovanio nel Belgio, di Copenaghen nella Danimarca, della Società di Orticoltura in Londra; nonchè con tutti gli Orti botanici d'Italia, quali sono quelli di Venezia, Bassano, Milano, Monza, Lainate, Pavia, Genova, Torino, Rivoli, Pisa, Siena, Firenze, Bologna, Modena, Parma, Ferrara, Roma, Napoli e Palermo. Vegliato da un direttore o prefetto dell'Orto, ch'è pure il professore di Botanica, ajutato da un assistente che dura in posto due o al più quattro anni, coltivato da un giardiniere o custode, un sottogiardiniere, tre operai fissi e tre allievi, ha un assegno ordinario per le sue spese di manutenzione e cultura di austriache lire 2900 (2522 fr.), in cui però sono compresi gli stipendii degli operai. Oltre questi, la Sovrana munificenza provvede ogni anno con assegni speciali ai bisogni straordinarii dell'Orto; talchè puossi affermare che in questi ultimi sette anni a redimerlo da quello stato di povertà e di disordine a cui l'aveano condotto i patiti disastri, e la età sua che già tocca i tre secoli, vi si profusero nulla meno che venti-

mila fiorini, ai quali resta ancora da aggiungere il costo della nuova fabbrica dell'anfiteatro per le lezioni e delle conserve, decretata di fresco dalla splendida liberalità del Monarca FERDINANDO I.

Della casa destinata a comoda e decente abitazione del Prefetto dell'Orto pubblico il pian terreno è riservato alla custodia di alcune collezioni botaniche. Nella prima stanza del medesimo v'ha una raccolta di tutte le sostanze medicinali che le piante somministrano naturalmente, quali sono radici, tronchi, cortecce, legni, foglie, fiori, frutta e semi, gomme e resine; una seconda di legni puliti e greggi spettanti ad alberi forastieri e nostrali; una terza di piante fossili; una quarta di funghi modellati in cera; una quinta in fine di preparazioni diverse di organografia vegetale. La stanza successiva e la terza contengono la preziosa libreria lasciata all'Orto nel 1835 dal benemerito suo direttore il Prof. Cav. G. A. Bonato, ricca d'oltre 5000 volumi, de' quali la massima parte di argomento botanico o di scienze affini, la minima di letteratura. Fra quelli sonovi pressochè tutte le opere botaniche anteriori e contemporanee al Linneo, molte eziandio delle posteriori; e sì nelle une che nelle altre ve n'hanno di assai costose e assai rare. Nelle letterarie si trovano non poche preziose edizioni del secolo XV. Tiene ancora questa biblioteca parecchi autografi ragguardevoli del celebre Prospero Alpino, di Federico Cesi fondatore dell'Accademia de' Lincei, di Gaspare Gabrieli insigne letterato padovano, dell'immortale Malpighi, di Giulio Pontedera, e lettere originali di Andrea Cesalpino, del Linneo, del Seguiet, dell'Haller, dello Spallanzani, di Gio. Arduino, dell'Allioni, del Roemer, del Willdenow, oltre quelle de' più celebri botanici viventi che corrispondono coll'Orto nostro. Nell'ultima stanza è collocato in eleganti buste un erbario di circa quattordicimila piante nostrali ed esotiche, coltivate e spontanee, il quale si va accrescendo continuamente; nonchè l'erbario originale su cui si lavora e si pubblica una Flora della Dalmazia dal professore attuale.

Quest'Orto per la vaghezza, convenienza ed estensione degli edificii, per l'acconcia e leggiadra distribuzione delle sue parti, per la copia delle acque, per le stupende vedute di che l'attorniano le circostanti basiliche, e per essere il solo Orto botanico che possenga apposita biblioteca, sarebbe già tale da vincer molti e pareggiar tutti gli Orti pubblici delle altre Università, anche se la origine sua nobilissima avendo segnato un'epoca luminosa nei fasti della scienza, cui si consacra, no 'l rendesse per ciò solo sopra tutti rispettabile e venerando.

ANNOTAZIONI

(1) Veggasi *Della origine ed anzianità dell'Orto botanico di Padova, Memoria di R. de Visiani*, Venez. 1839, nella quale la quistione si della fondazione che dell' anteriorità dell'Orto nostro sopra quello di Pisa e di Bologna, e quindi su tutti gli altri di Europa, è posta in quella maggior luce che la lontananza dei tempi ed il difetto di pubblici documenti intorno alla vera epoca, cui riferire la fondazione di quello di Pisa, poteano permettere. Ivi medesimo stanno anco le prove di quanto relativamente alla storia dell'Orto nostro si verrà sponendo in appresso: perchè ad essa rimandiamo il lettore che bramasse conoscerle per disteso.

(2) Questo architetto nella lettera degli 11 Agosto del 1547 dei Riformatori, che serbasi nel nostro archivio, viene semplicemente nominato *M. Andrea Proto di S. Giustina*; ciocchè indusse il Facciolati (*Fasti Gymn. Pat.* pag. 400) a credere essere egli il celebre Andrea Riccio. Però a torto, sì perchè il Riccio di quel tempo era morto, sì perchè dalla storia del monastero di S. Giustina, scritta dal Cavaccio, ritraesi che in allora Proto di questa chiesa si era il Moroni.

(3) Pierre Belon, *Observ. de plus. singul., et chos. mémorabl.* Paris 1588, pag. 460. — Marco Guazzo, *Historia di tutti i fatti degni di memoria nel mondo successi dall'anno 1524 sin a questo presente.* Vinegia appresso Gabriele Giolito de Ferràri 1546, pag. 371 tergo.

(4) Ap. Zeno, *Note alla Biblioteca della Eloquenza italiana di M. Giusto Fontanini.* Tom. II. pag. 332.

(5) Alb. Haller, *Biblioth. Bot.* 1. pag. 329. — Spreng., *Hist. rei herb.* 1. pag. 334.

(6) Cominciò lo stipendio dell'Anguillara dal dì 20 Agosto 1546, come raccogliesi da lettera 28 Settembre dell'anno stesso, esistente

nell'archivio di questa Università, e crebbe a cento ducati per altra dei Riformatori del 25 febbrajo 1551.

(7) La lettera 11 Agosto 1547 dei Riformatori così ne scrive: *E perchè importa sommamente per molte cause, ch'esso Herbario habiti nel luogo dell'Horto predetto, havemo ordinato che li sia acconciata una casa vecchia, la quale si ritrova sopra quel terreno.*

(8) Spreng. *Hist. rei herb.* 1. pag. 334. Ivi lo Sprengel commette altro errore, accusando l'Anguillara di essere stato l'unico che poco pregiasse il Ghini, mentre in più luoghi del suo libro intitolato *I semplici* l'Anguillara ne parla con lode, e ne cita l'autorità.

(9) Veggasi la lettera 11 Agosto 1547 sopra citata.

(10) Lettera dei Riformatori del 25 febbrajo 1551 su nominata.

(11) Ciò ricavasi dall'antico *Bollettario* dell'Università dall'ultimo Gennajo 1553 a tutto il Gennajo 1565, che serbasi nell'archivio. Non è però a credere che sino allora l'Orto botanico non avesse avuto chi 'l coltivasse, giacchè nella sopraddetta lettera de' 25 febbrajo 1551 ordinandosi la destinazione di un ortolano, vi si soggiunge: *come ancho altra fiata è stato fatto*; ma Jacopo forse fu il primo ortolano stabile, e pagato con annuale e determinato stipendio dalla cassa della Università, mentre gli anteriori erano operai giornalieri.

(12) Matth. Lobelii *Stirp. advers.* pag. 439, et *Observ. Stirp.* pag. 605. In quest'ultimo luogo il Lobelio dà eziandio la figura del *Guajacum Patavinum* del Falloppio, dalla quale ritraesi a non dubitarne, che la pianta coltivata da questo nell'Orto nostro non era già il vero Guajaco, che non è albero da provare all'aperto, si invece la *Guajacana*, o *Diospyros Lotus*.

(13) P. Belon, *Les remonstrances sur le def. de lab. et cult. des plantes.* Paris 1558, pag. 71.

(14) Conr. Gesneri *De raris et admirandis herbis Commentarius.* Tigur. 1555, pag. 40. Questo autore così scrive dell'Anguillara e dell'Orto: *Qui vir (Aloysius Romanus) exquisita harum rerum cognitione clarus, Patavii instructissimo medicorum Horto praefectus est.*

(15) Dal *Bollettario* su mentovato apparisce aver egli assunto l'incarico col giorno 21 Settembre 1561.

(16) Giovanni Fantuzzi nelle sue *Memorie della vita di Ulisse Aldrovandi*, Bologna 1774, pag. 19. not. 10, su questo argomento pubblicò quanto segue: *La cattedra de' semplici fu istituita in Bologna come straordinaria l'anno 1534, ad imitazione di Padova, che l'anno avanti, cioè nel 1533, ne avea dato il primo esempio. A Padova pertanto resta l'onore della più antica cattedra di Materia medicinale, e quello pure della prima cattedra di Botanica, essendo provato che questa non fu aperta nè a Bologna nè a Pisa se non molto dopo che qui l'apri il Guilandino, giacchè Luca Ghini non insegnò, pria nell'una e poscia nell'altra Università, se non la dottrina de' semplici, ossia la Materia medica.*

(17) Questa macchina, ristorata ed anche ricostruita in più tempi, fu nel corrente anno rinnovata del tutto sopra un sistema idraulico più conveniente; ed ora merita osservazione per la esattezza e solidità della costruzione, nonchè per la copia d'acqua che manda all'Orto, d'assai maggiore di quella che vi portavano le macchine precedenti.

(18) Veggasi la ducale dei 16 Dicembre 1567 di Pietro Loredan, che sopprime la lettura de' semplici alla Università, e conferisce al Guilandino la facoltà d'insegnarla nell'Orto. Fu ripristinata tal cattedra solo nel 1594 con ducale di Pasquale Cicogna 19 Aprile, e fidata a Prospero Alpino.

(19) Sino dall'anno 1574 con ducale dei 28 Dicembre di Alvise Mocenigo era stato cresciuto lo stipendio del Guilandino fino a ducati trecentosettanta, però coll'obbligo di pagare ei medesimo due lavoranti per l'Orto. Questo assegno per la ducale di Nicolò da Ponte dei 24 Maggio 1578 crebbe poscia a ducati seicento.

(20) *Hortus Patavinus, cui accessere V. Cl. Melchioris Guilandini medici botanici cluentiss. (sic) conjectanea synonymica plantarum eruditissima, publicante Jo. Georg. Schenckio. Francof. MDC, 12.*

(21) Ved. Lettera dei Riformatori dello Studio dei 23 Dicembre 1590 nel Tomo XXI. carte 138 degli Atti degli artisti.

(22) Ved. Lettera dei Riformatori dei 9 Settembre 1592 nel Tomo XXI. carte 141.

(23) Ved. Lett. dei Rif. dei 2 Ottob. 1624, e dei 19 Novemb. 1625.

- (24) Può leggersi nel Tom. XXIII. degli Atti degli artisti, a car. 43.
 (25) Vedi Tommasini, *Gymn. Patav.* pag. 89.
 (26) Ved. Lettera dei Riformatori 29 Agosto 1681.
 (27) Di tutti i miglioramenti procacciati nell'Orto nostro dal Viali resta memoria in una lapide da lui posta nella facciata interna del portone d'ingresso, ove può leggersi come segue:

SILVESTRO . VALERIO . PRINCIPE
 III VIR . LITER . SC . IVBENTIB .
 ALEXANDRO . MOLINO . PRAEFECTO
 APOLLINEAE . INSYLAE . DECYS . ADDITVM
 HORTVS . DVPLE . AVCTVS . CLAVSTRISQ . FERREIS . MVNITVS
 PLANTAE . EX . VTRAQVE . INDIA . INVECTAE
 PERENNES . EXCITATI . FONTES
 LVCYS . CONSITVS
 OMNIA . VETERI . SQUALORE . DETERSO . NITIDIORA
 CVRANTE
 FELICE . VIALI . PVB . PROFESS . LOCIQ . PRAESIDE
 A . CHRISTO . NATO . SECVLI . XVII . ANNO . VIC
 A . CONDITA . REPVBICA . SECVLI . XIII . ANNO . LXXIII .

- (28) Ved. Lettera dei Riformatori 5 Giugno 1738.
 (29) Ved. Marsili, *Notizie del pubblico Giardino de' semplici di Padova*, 1840, pag. 18.

CATALOGO
DELLE
PIANTE CHE SI COLTIVANO
NELL'ORTO BOTANICO
DI PADOVA

SPIEGAZIONE DELLE ABBREVIATURE

ann.	<i>annua.</i>	Pianta erbacea annuale.
bien.	<i>biennis.</i>	Pianta erbacea che dura due anni.
cal.	<i>calidarium.</i>	Pianta che si tiene in istufa calda.
frig.	<i>frigidarium.</i>	Pianta che si tiene in aranciera.
lign.	<i>lignosa.</i>	Pianta suffruticosa, o fruticosa, od arborea.
per.	<i>perennis.</i>	Pianta erbacea che dura molti anni.
s. d.	<i>sub diu.</i>	Pianta che vive all'aperto.
sp.	<i>spontanea.</i>	Pianta indigena della Provincia di Padova.
tep.	<i>tepidarium.</i>	Pianta che si tiene in istufa temperata.

CATALOGO DELLE PIANTE

NELL'ANNO MDCCCXLII

<i>Abroma augusta</i>	<i>L. fil.</i>	lign.	cal.	<i>Acacia</i>	<i>latisiliqua</i>	<i>W.</i>	lign.	frig.
<i>Abrus precatorius</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.	—	<i>Lebbeck</i>	<i>W.</i>	lign.	cal.
<i>Acacia acanthophora</i>	<i>W.</i>	lign.	frig.	—	<i>leucocephala</i>	<i>Brter.</i>	lign.	tep.
— <i>alata</i>	<i>R. Br.</i>	lign.	frig.	—	<i>longifolia</i>	<i>W.</i>	lign.	frig.
— <i>amoena</i>	<i>Wendl.</i>	lign.	frig.	—	<i>lophantha</i>	<i>W.</i>	lign.	frig.
— <i>angustifolia</i>	<i>Wendl.</i>	lign.	frig.	—	— <i>speciosa</i>	<i>Hort.</i>	lign.	frig.
— <i>biflora</i>	<i>R. Br.</i>	lign.	tep.	—	<i>lunata</i>	<i>Sieb.</i>	lign.	frig.
— <i>brasiliensis</i>	<i>Spr.</i>	lign.	frig.	—	— <i>minor</i>	<i>H. Hügel</i>	lign.	frig.
— <i>brevifolia</i>	<i>Loddig.</i>	lign.	frig.	—	<i>marginata</i>	<i>R. Br.</i>	lign.	frig.
— <i>calamifolia</i>	<i>Lindl.</i>	lign.	frig.	—	— <i>obovata</i>	<i>H. Hügel</i>	lign.	frig.
— <i>Cavenia</i>	<i>Berter.</i>	lign.	frig.	—	<i>Melanoxylon</i>	<i>R. Br.</i>	lign.	frig.
— <i>ciliata</i>	<i>Humb.</i>	lign.	frig.	—	<i>mollissima</i>	<i>W.</i>	lign.	frig.
— <i>cordata</i>	<i>Sweet.</i>	lign.	frig.	—	<i>mucronata</i>	<i>W.</i>	lign.	frig.
— <i>cornigera</i>	<i>W.</i>	lign.	cal.	—	<i>nigricans</i>	<i>Ait.</i>	lign.	tep.
— <i>cuneata</i>	<i>Benth.</i>	lign.	frig.	—	<i>oleifolia</i>	<i>Cunningh.</i>	lign.	frig.
— <i>major</i>	<i>H. Hügel</i>	lign.	frig.	—	<i>paradoxa</i>	<i>DC.</i>	lign.	tep.
— <i>cyanophylla</i>	<i>Reuth.</i>	lign.	frig.	—	<i>pentadenia</i>	<i>Lindl.</i>	lign.	frig.
— <i>Cyclopis</i>	<i>Cunningh.</i>	lign.	frig.	—	<i>peregrina</i>	<i>W.</i>	lign.	tep.
— <i>daviesiaefolia</i>	<i>Cunn.</i>	lign.	frig.	—	<i>portoricensis</i>	<i>W.</i>	lign.	cal.
— <i>dealbata</i>	<i>Lk.</i>	lign.	frig.	—	<i>pubescens</i>	<i>Ait.</i>	lign.	frig.
— <i>decipiens</i>	<i>R. Br.</i>	lign.	frig.	—	<i>pulchella</i>	<i>R. Br.</i>	lign.	frig.
— <i>decora</i>	<i>H. Hügel</i>	lign.	frig.	—	<i>riparia</i>	<i>Humb.</i>	lign.	cal.
— <i>decussata</i>	<i>H. Neap.</i>	lign.	frig.	—	<i>ruscifolia</i>	<i>Cunning.</i>	lign.	frig.
— <i>diffusa</i>	<i>Ker.</i>	lign.	frig.	—	<i>Sophorae</i>	<i>Desf.</i>	lign.	frig.
— <i>discolor</i>	<i>W.</i>	lign.	frig.	—	<i>Spini</i>	<i>Balb.</i>	lign.	frig.
— <i>dodonaefolia</i>	<i>Desf.</i>	lign.	frig.	—	<i>stricta</i>	<i>W.</i>	lign.	frig.
— <i>dolabriformis</i>	<i>Wdl.f.</i>	lign.	frig.	—	<i>strombulifera</i>	<i>W.</i>	lign.	tep.
— <i>elongata</i>	<i>Sieb.</i>	lign.	frig.	—	<i>tetragona</i>	<i>W.</i>	lign.	tep.
— <i>elucescens</i>	<i>H. Hügel</i>	lign.	frig.	—	<i>tomentosa</i>	<i>W.</i>	lign.	frig.
— <i>excelsa</i>	<i>H. Hügel</i>	lign.	frig.	—	<i>undulata</i>	<i>W.</i>	lign.	frig.
— <i>Farnesiana</i>	<i>W.</i>	lign.	tep.	—	— <i>longispina</i>	<i>H. Pat.</i>	lign.	frig.
— <i>filicina</i>	<i>W.</i>	lign.	tep.	—	<i>venusta</i>	<i>W.</i>	lign.	cal.
— <i>floribunda</i>	<i>W.</i>	lign.	frig.	—	<i>vera</i>	<i>W.</i>	lign.	frig.
— <i>frondosa</i>	<i>W.</i>	lign.	cal.	—	<i>verniciiflua</i>	<i>Cunnin.</i>	lign.	frig.
— <i>glauca</i>	<i>W.</i>	lign.	tep.	—	<i>verticillata</i>	<i>W.</i>	lign.	frig.
— <i>glaucescens</i>	<i>W.</i>	lign.	frig.	<i>Acaena</i>	<i>adscendens</i>	<i>Vahl.</i>	per.	frig.
— <i>heterophylla</i>	<i>W.</i>	lign.	frig.	—	<i>ovalifolia</i>	<i>R. et P.</i>	per.	frig.
— <i>homomalla</i>	<i>Wndl.f.</i>	lign.	frig.	—	<i>Sanguisorbae</i>	<i>Vahl.</i>	per.	frig.
— <i>horrida</i>	<i>W.</i>	lign.	cal.	—	<i>sericea</i>	<i>Jacq. fil.</i>	per.	frig.
— <i>Humei</i>	<i>H. Madoet.</i>	lign.	cal.	<i>Acalypha</i>	<i>cordata</i>	<i>Thunb.</i>	lign.	tep.
— <i>Julibrissin</i>	<i>W.</i>	lign.	s. d.	—	<i>hispidia</i>	<i>W.</i>	ann.	s. d.
— <i>juniperina</i>	<i>W.</i>	lign.	frig.	—	<i>indica</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.

<i>Acalypha rubra</i> <i>W.</i>	per.	frig.	<i>Achyrophorus apargioides</i>			
— <i>virgata</i> <i>L.</i>	lign.	cal.	— <i>helveticus</i> <i>DC.</i>	per.	s. d.	
<i>Acanthophyllum versicolor</i>			— <i>oxydantus</i> <i>DC.</i>	per.	s. d.	
<i>Fisch. et M.</i>	lign.	tep.	<i>Aconitum Anthora</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	
<i>Acanthospermum hispidum</i>	<i>DC.</i>	ann. s. d.	— <i>barbatum</i> <i>Patrin.</i>	per.	s. d.	
<i>Acanthus mollis</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>dissectum</i> <i>Don</i>	per.	s. d.	
— <i>spinus</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>excelsum</i> <i>Reichb.</i>	per.	s. d.	
<i>Acer barbatum</i> <i>Michx.</i>	lign.	s. d.	— <i>Gmelini</i> <i>Reichb.</i>	per.	s. d.	
— <i>campestre</i> <i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>Lycototum</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	
— <i>dasyarpum</i> <i>Ehrh.</i>	lign.	s. d.	— <i>Cynoctotum</i> <i>Rhb.</i>	per.	s. d.	
— <i>ibericum</i> <i>Bieb.</i>	lign.	s. d.	— <i>Lamarckii</i> <i>Rchb.</i>	per.	s. d.	
— <i>monspessulanum</i> <i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>Tragoctotum</i> <i>Rhb.</i>	per.	s. d.	
— <i>Negundo</i> <i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>Napellus</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	
— <i>oblongum</i> <i>Vahl.</i>	lign.	frig.	— <i>eminens</i> <i>Koch.</i>	per.	s. d.	
— <i>obtusifolium</i> <i>Sm.</i>	lign.	s. d.	— <i>ochranthum</i> <i>C.A.M.</i>	per.	s. d.	
— <i>opulifolium</i> <i>Vill.</i>	lign.	s. d.	— <i>Stoerkianum</i> <i>Rchb.</i>	per.	s. d.	
— <i>palmatum</i> <i>Thunb.</i>	lign.	s. d.	— <i>variegatum</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	
— <i>pensylvanicum</i> <i>L.</i>	lign.	s. d.	<i>Acorus Calamus</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	
— <i>platanoides</i> <i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>gramineus</i> <i>Ait.</i>	per.	s. d.	
— <i>Pseudoplatanus</i> <i>L.</i>	lign.	s. d.	<i>Acroglorinchepodoides</i>			
— <i>saccharinum</i> <i>L.</i>	lign.	s. d.	<i>Schrad.</i>	ann.	s. d.	
— <i>tataricum</i> <i>L.</i>	lign.	s. d.	<i>Acrostichum alcicorne</i> <i>Sw.</i>	per.	cal.	
<i>Achillea acuminata</i> <i>Ledeb.</i>	per.	s. d.	— <i>Marantae</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	
— <i>Ageratum</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Actaea Cimicifuga</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	
— <i>anthemoides</i> <i>W.</i>	per.	s. d.	— <i>palmata</i> <i>DC.</i>	per.	frig.	
— <i>brevifolia</i> <i>H. Prag.</i>	per.	s. d.	— <i>spicata</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	
— <i>coronopifolia</i> <i>W.</i>	per.	s. d.	<i>Actinomeris alternifolia</i> <i>DC.</i>	per.	s. d.	
— <i>crithmifolia</i> <i>W. et K.</i>	per.	s. d.	— <i>helianthoides</i> <i>DC.</i>	per.	s. d.	
— <i>decumbens</i> <i>Lam.</i>	per.	s. d.	— <i>tetraptera</i> <i>DC.</i>	per.	s. d.	
— <i>dentifera</i> <i>DC.</i>	per.	s. d.	— <i>oppositifolia</i> <i>Fresen.</i>	per.	s. d.	
— <i>filipendulina</i> <i>Lam.</i>	per.	s. d.	<i>Adamia cyanea</i> <i>Wall.</i>	lign.	cal.	
— <i>filicifolia</i> <i>Bieb.</i>	per.	s. d.	<i>Adansonia digitata</i> <i>L.</i>	lign.	cal.	
— <i>Gerberi</i> <i>W.</i>	per.	s. d.	<i>Adelia Acidoton</i> <i>L.</i>	lign.	s. d.	
— <i>ligustica</i> <i>All.</i>	per.	sp.	— <i>citrifolia</i> <i>Hort.</i>	lign.	s. d.	
— <i>magna</i> <i>L.</i>	per.	sp.	— <i>myrtifolia</i> <i>Vent.</i>	lign.	s. d.	
— <i>marginata</i> <i>Tausch.</i>	per.	s. d.	— <i>ovata</i> <i>Desf.</i>	lign.	frig.	
— <i>Millefolium</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Adenantha Pavinina</i> <i>L.</i>	lign.	cal.	
— <i>nobilis</i> <i>L.</i>	per.	sp.	<i>Adenocarpus cebennensis</i>			
— <i>ochroleuca</i> <i>Ehrh.</i>	per.	s. d.	— <i>foliolosus</i> <i>DC.</i>	lign.	cal.	
— <i>pectinata</i> <i>W.</i>	per.	s. d.	— <i>foliolosus</i> <i>DC.</i>	lign.	frig.	
— <i>Santolina</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Adenophora Lamarckii</i> <i>Fi-</i>			
— <i>setacea</i> <i>W. et K.</i>	per.	s. d.	<i>sch.</i>	per.	s. d.	
— <i>tanacetifolia</i> <i>All.</i>	per.	sp.	— <i>latifolia</i> <i>Fisch.</i>	per.	s. d.	
— <i>tomentosa</i> <i>L.</i>	per.	sp.	— <i>lilifolia</i> <i>Ledeb.</i>	per.	s. d.	
— <i>versicolor</i> <i>H. Prag.</i>	per.	s. d.	— <i>reticulata</i> <i>Don</i>	per.	s. d.	
<i>Achimenes coccinea</i> <i>Pers.</i>	per.	cal.	<i>Adenoropium panduraefol-</i>			
<i>Achnodouton Bellardi</i> <i>Pal.</i>	ann.	s. d.	<i>lium</i> <i>Pohl</i>	lign.	cal.	
<i>Achras orientalis</i> <i>Hort.</i>	lign.	cal.	<i>Adenostyles glabra</i> <i>DC.</i>	per.	s. d.	
— <i>Sapota</i> <i>L.</i>	lign.	cal.	— <i>Petasites</i> <i>Bluff. et F.</i>	per.	s. d.	
<i>Achyrachaena mollis</i>			<i>Adesmia muricata</i> <i>DC.</i>	ann.	s. d.	
<i>Schaug.</i>	ann.	s. d.	<i>Adiantum Capillus Veneris</i>			
<i>Achyranthes alba</i> <i>Eckl.</i>	per.	tep.	— <i>L.</i>	per.	sp.	
— <i>argentea</i> <i>Lam.</i>	per.	tep.	— <i>pedatum</i> <i>L.</i>	per.	frig.	
— <i>aspera</i> <i>L.</i>	lign.	tep.	<i>Adonis aestivalis</i> <i>L.</i>	ann.	sp.	
— <i>uncinulata</i> <i>Schrad.</i>	per.	tep.	— <i>autumnalis</i> <i>L.</i>	ann.	sp.	

<i>Adoxa Moschatellina</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Agave yuccaeifolia</i>	<i>Red.</i>	per.	tep.
<i>Aegilops caudata</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	<i>Ageratum conyzoides</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>cylindrica</i>	<i>Host</i>	ann.	s. d.	— — <i>coeruleum</i>	<i>Desf.</i>	ann.	s. d.
— <i>ovata</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	— — <i>mexicanum</i>	<i>Swt.</i>	ann.	s. d.
— <i>triariata</i>	<i>W.</i>	ann.	s. d.	— <i>corymbosum</i>	<i>Zucc.</i>	lign.	frig.
— <i>triticoideis</i>	<i>Reg.</i>	ann.	s. d.	— <i>Houstonianum</i>	<i>Mill.</i>	ann.	s. d.
— <i>truncialis</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	<i>Agrimonia castra</i>	<i>Eckl.</i>	per.	s. d.
<i>Aegiphyla martinicensis</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.	— <i>daburica</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.
<i>Aegle sepiaria</i>	<i>DC.</i>	lign.	frig.	— <i>Eupatorium</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
<i>Aegopodium Podagraria</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>leucantha</i>	<i>Ker.</i>	per.	s. d.
<i>Aeollanthus suavis</i>	<i>Mart.</i>	ann.	s. d.	— <i>odorata</i>	<i>Mill.</i>	per.	s. d.
<i>Aeonium balsamiferum</i>				— <i>pilosa</i>	<i>Ledeb.</i>	per.	s. d.
— <i>Webb. et Berth.</i>		per.	tep.	— <i>repens</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>caespitosum</i>	<i>W. B.</i>	per.	tep.	— <i>suaveolens</i>	<i>Pursh.</i>	per.	s. d.
— <i>cruentum</i>	<i>W. et B.</i>	per.	tep.	<i>Agrostis alba</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>holochrysum</i>	<i>W. B.</i>	per.	tep.	— <i>sylvatica</i>	<i>Host</i>	per.	s. d.
— <i>strepsicladum</i>	<i>W. B.</i>	per.	tep.	— <i>canina</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
<i>Aerva brachiata</i>	<i>Mart.</i>	ann.	s. d.	— <i>frondosa</i>	<i>Tenor.</i>	per.	s. d.
— <i>sanguinolenta</i>	<i>Blum.</i>	lign.	tep.	— <i>interrupta</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
<i>Aeschinome americana</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>spica venti</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
<i>Aesculus carnea</i>	<i>W.</i>	lign.	s. d.	— <i>verticillata</i>	<i>Vill.</i>	per.	s. d.
— <i>flava</i>	<i>Ait.</i>	lign.	s. d.	— <i>vulgaris</i>	<i>With.</i>	per.	sp.
— <i>Hippocastanum</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	<i>Ailanthus glandulosa</i>	<i>Desf.</i>	lign.	s. d.
— <i>hybrida</i>	<i>DC.</i>	lign.	s. d.	<i>Aira atropurpurea</i>	<i>Wahnb.</i>	per.	s. d.
— <i>incisa</i>	<i>Hort.</i>	lign.	s. d.	— <i>capillaris</i>	<i>Host</i>	ann.	sp.
— <i>macrostachya</i>	<i>Mchx.</i>	lign.	s. d.	— <i>caryophyllea</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>neglecta</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>flexuosa</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>ohioensis</i>	<i>Michx.</i>	lign.	s. d.	— <i>montana</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>Pavia</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	<i>Ajuga Chamaeypitis</i>	<i>Schreb.</i>	ann.	sp.
— <i>rubicunda</i>	<i>Lodd.</i>	lign.	s. d.	— <i>genevensis</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>tortuosa</i>	<i>Hort.</i>	lign.	s. d.	— <i>pyramidalis</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>Welschiana</i>	<i>Hort.</i>	lign.	s. d.	— <i>reptans</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
<i>Aescynanthus grandiflorus</i>				<i>Aizoon canariense</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>Roxburghii</i>	<i>Spr.</i>	per.	tep.	— <i>rigidum</i>	<i>L. fil.</i>	lign.	frig.
<i>Aetheorrhiza bulbosa</i>	<i>Cass.</i>	per.	s. d.	<i>Albuca altissima</i>	<i>Jacq.</i>	per.	frig.
<i>Aethionema Buxbaumii</i>	<i>DC.</i>	ann.	s. d.	— <i>fastigiata</i>	<i>Dryand.</i>	per.	frig.
— <i>clandestinum</i>	<i>Delil.</i>	ann.	s. d.	— <i>longifolia</i>	<i>Fisch.</i>	per.	frig.
— <i>coridifolium</i>	<i>DC.</i>	lign.	s. d.	— <i>minor</i>	<i>L.</i>	per.	frig.
— <i>cristatum</i>	<i>DC.</i>	ann.	s. d.	<i>Alchemilla Aphanes</i>	<i>Leers.</i>	ann.	sp.
— <i>saxatile</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.	— <i>hybrida</i>	<i>Mill.</i>	per.	s. d.
<i>Aethusa Cynapium</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>vulgaris</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
<i>Agapanthus medius</i>	<i>Lodd.</i>	per.	frig.	<i>Alisma parnassifolia</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>undulatus</i>	<i>Hort.</i>	per.	frig.	— <i>Plantago</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>praecox</i>	<i>W.</i>	per.	frig.	— <i>angustifolia</i>	<i>Hopp.</i>	per.	sp.
— <i>umbellatus</i>	<i>Herit.</i>	per.	frig.	— <i>ranunculoides</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>variegatus</i>	<i>Hort.</i>	per.	frig.	<i>Allamanda Aubletii</i>	<i>Pohl.</i>	lign.	cal.
<i>Agasyllis caucasica</i>	<i>Spr.</i>	per.	s. d.	— <i>verticillata</i>	<i>Desf.</i>	lign.	cal.
<i>Agathaea amelloides</i>	<i>DC.</i>	lign.	frig.	<i>Allionia albidia</i>	<i>Walt.</i>	ann.	s. d.
<i>Agathosma ciliata</i>	<i>Lk.</i>	lign.	frig.	— <i>glomerata</i>	<i>Hort.</i>	per.	s. d.
<i>Agave americana</i>	<i>L.</i>	per.	frig.	— <i>incarnata</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>variegata</i>	<i>Hort.</i>	per.	frig.	— <i>ovata</i>	<i>Pursh.</i>	per.	s. d.
— <i>brachystachys</i>	<i>Cav.</i>	per.	tep.	<i>Allium acre</i>	<i>Presl.</i>	per.	s. d.
— <i>geminiflora</i>	<i>Brand.</i>	per.	tep.	— <i>acutangulum</i>	<i>Schrd.</i>	per.	s. d.
— <i>lurida</i>	<i>Ait.</i>	per.	tep.	— <i>albidum</i>	<i>Fisch.</i>	per.	s. d.
— <i>vivipara</i>	<i>L.</i>	per.	tep.	— <i>Ampeloprasmus</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
				— <i>asealonium</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.

<i>Allium atropurpureum</i> <i>W.</i>	per.	s. d.	<i>Allium subhirsutum</i> <i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>et K.</i>	per.	sp.	— <i>tataricum</i> <i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>carinatum</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>tenuiflorum</i> <i>Ten.</i>	per.	s. d.
— <i>carolinianum</i> <i>Red.</i>	per.	s. d.	— <i>triquetrum</i> <i>L.</i>	per.	sp.
— <i>Cepa</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>ursinum</i> <i>L.</i>	per.	sp.
— <i>ciliatum</i> <i>Cyrill.</i>	per.	s. d.	— <i>vineale</i> <i>L.</i>	per.	sp.
— <i>cinereum</i> <i>Lehm.</i>	per.	s. d.	— <i>compactum</i> <i>Thil.</i>	per.	s. d.
— <i>coerulescens</i> <i>Don</i>	per.	s. d.	— <i>violaceum</i> <i>W.</i>	per.	s. d.
— <i>controversum</i> <i>Ser</i>	per.	s. d.	<i>Alnus autumnalis</i> <i>Lodd.</i>	lign.	s. d.
— <i>cornutum</i> <i>Clement</i>	per.	sp.	— <i>barbata</i> <i>C. A. Mey.</i>	lign.	sp.
— <i>fallax</i> <i>Schult.</i>	per.	s. d.	— <i>glutinosa</i> <i>W.</i>	lign.	sp.
— <i>— senescens</i> <i>Hort.</i>	per.	s. d.	— <i>incana</i> <i>W.</i>	lign.	s. d.
— <i>fistulosum</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>intermedia</i> <i>Hort.</i>	lign.	s. d.
— <i>altaicum</i> <i>Pall.</i>	per.	s. d.	— <i>serrulata</i> <i>W.</i>	lign.	s. d.
— <i>ceratophyllum</i>	per.	s. d.	— <i>viridis</i> <i>DC.</i>	lign.	tep.
— <i>Ledeb.</i>	per.	s. d.	<i>Aloe abyssinica</i> <i>Lam.</i>	lign.	tep.
— <i>flavum</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>acinacifolia</i> <i>Jacq.</i>	per.	tep.
— <i>flexum</i> <i>W et K.</i>	per.	s. d.	— <i>acuminata</i> <i>Haw.</i>	per.	tep.
— <i>foliosum</i> <i>Clark.</i>	per.	s. d.	— <i>africana</i> <i>Mill.</i>	lign.	tep.
— <i>fragrans</i> <i>Vent.</i>	per.	s. d.	— <i>variegata</i> <i>Haw.</i>	lign.	tep.
— <i>fuscum</i> <i>W et K.</i>	per.	s. d.	— <i>albicans</i> <i>Haw.</i>	per.	tep.
— <i>glaucum</i> <i>Schrad.</i>	per.	s. d.	— <i>altilinea</i> <i>Schult.</i>	per.	tep.
— <i>— baicalense</i> <i>W.</i>	per.	s. d.	— <i>angulata</i> <i>W.</i>	per.	tep.
— <i>globosum</i> <i>Bieb.</i>	per.	s. d.	— <i>angustifolia</i> <i>Haw.</i>	per.	tep.
— <i>guttatum</i> <i>Stev.</i>	per.	s. d.	— <i>arachnoidea</i> <i>Mill.</i>	per.	tep.
— <i>illyricum</i> <i>Jacq.</i>	per.	s. d.	— <i>arborescens</i> <i>Mill.</i>	lign.	tep.
— <i>intermedium</i> <i>Lam.</i>	per.	s. d.	— <i>atrovirens</i> <i>DC.</i>	per.	tep.
— <i>Ledebourianum</i>	per.	s. d.	— <i>attenuata</i> <i>Haw.</i>	per.	tep.
— <i>Schult.</i>	per.	s. d.	— <i>clariperla</i> <i>Schl.</i>	per.	tep.
— <i>lineare</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>barbadensis</i> <i>Mill.</i>	lign.	tep.
— <i>longicaule</i> <i>Horn.</i>	per.	s. d.	— <i>Bowiea</i> <i>Schult.</i>	per.	tep.
— <i>lusitanicum</i> <i>Lam.</i>	per.	s. d.	— <i>caesia</i> <i>Salm.</i>	lign.	tep.
— <i>magicum</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>candicans</i> <i>Schult.</i>	per.	tep.
— <i>moschatum</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>carinata</i> <i>Mill.</i>	per.	tep.
— <i>narcissiflorum</i> <i>Vill.</i>	per.	s. d.	— <i>chinensis</i> <i>Haw.</i>	per.	tep.
— <i>neapolitanum</i> <i>Cyrill.</i>	per.	s. d.	— <i>Commelini</i> <i>W.</i>	lign.	tep.
— <i>nutans</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>conspurcata</i> <i>Salm.</i>	per.	tep.
— <i>odorum</i> <i>L.</i>	per.	sp.	— <i>sparsipunctata</i> <i>H.</i>	per.	tep.
— <i>oleraceum</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>Schoenbr.</i>	per.	tep.
— <i>Pallasii</i> <i>Murr.</i>	per.	sp.	— <i>cymbifolia</i> <i>Schrad.</i>	per.	tep.
— <i>pallens</i> <i>L.</i>	per.	sp.	— <i>depressa</i> <i>Haw.</i>	per.	tep.
— <i>paniculatum</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>distans</i> <i>Haw.</i>	per.	tep.
— <i>pendulinum</i> <i>Tenor.</i>	per.	s. d.	— <i>disticha</i> <i>L.</i>	per.	tep.
— <i>Porrum</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>— major</i> <i>Haw.</i>	per.	tep.
— <i>proliferum</i> <i>Schrad.</i>	per.	s. d.	— <i>echinata</i> <i>W.</i>	per.	tep.
— <i>prostratum</i> <i>Trevir.</i>	per.	s. d.	— <i>elongata</i> <i>Mill.</i>	lign.	tep.
— <i>Purshii</i> <i>Don</i>	per.	s. d.	— <i>excavata</i> <i>W.</i>	per.	tep.
— <i>rubens</i> <i>Schrad.</i>	per.	s. d.	— <i>fasciata</i> <i>Salm.</i>	per.	tep.
— <i>rupestre</i> <i>Bieb.</i>	per.	s. d.	— <i>ferox</i> <i>Lam.</i>	per.	tep.
— <i>sativum</i> <i>L.</i>	per.	sp.	— <i>foliolosa</i> <i>Haw.</i>	lign.	tep.
— <i>Schoenoprasum</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>frutescens</i> <i>Salm.</i>	lign.	tep.
— <i>sibiricum</i> <i>L.</i>	per.	sp.	— <i>glabra</i> <i>Haw.</i>	per.	tep.
— <i>sphaerocephalum</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>glauca</i> <i>Mill.</i>	lign.	tep.
— <i>Stellerianum</i> <i>W.</i>	per.	s. d.	— <i>— elatior</i> <i>Salm.</i>	lign.	tep.
— <i>striatum</i> <i>Jacq.</i>	per.	s. d.	— <i>— humilior</i> <i>Salm.</i>	lign.	tep.
— <i>strictum</i> <i>Schrad.</i>	per.	s. d.	— <i>— spinosior</i> <i>Haw.</i>	lign.	tep.

<i>Aloe gracilis</i>	<i>Haw.</i>	lign.	tep.	<i>Aloe tessellata</i>	<i>Schult.</i>	per.	tep.
— <i>granata</i>	<i>Schult.</i>	per.	tep.	— <i>torquata</i>	<i>Schult.</i>	per.	tep.
— <i>grandidentata</i>	<i>Salm.</i>	lign.	tep.	— <i>tortuosa</i>	<i>Haw.</i>	lign.	tep.
— <i>imbricata</i>	<i>Haw.</i>	lign.	tep.	— <i>tuberculata</i>	<i>Haw.</i>	per.	tep.
— <i>incurva</i>	<i>Haw.</i>	per.	tep.	— <i>turgida</i>	<i>Schult.</i>	per.	tep.
— <i>intermedia</i>	<i>Haw.</i>	per.	tep.	— <i>variegata</i>	<i>L.</i>	per.	tep.
— <i>latifolia</i>	<i>Haw.</i>	per.	tep.	— <i>verrucosa</i>	<i>Ait.</i>	per.	tep.
— <i>mirabilis</i>	<i>Haw.</i>	per.	tep.	— <i>virens</i>	<i>Haw.</i>	per.	tep.
— <i>mitraeformis</i>	<i>W.</i>	lign.	tep.	— <i>viscosa</i>	<i>L.</i>	lign.	tep.
— — <i>elatior</i>	<i>Salm.</i>	lign.	tep.	— <i>xanthacantha</i>	<i>W.</i>	lign.	tep.
— <i>mucronata</i>	<i>Schult.</i>	lign.	tep.	<i>Alonsoa linearis</i>	<i>Ait.</i>	lign.	tep.
— <i>nigricans</i>	<i>Haw.</i>	per.	tep.	— <i>Mutisii</i>	<i>Steud.</i>	per.	tep.
— <i>crassifolia</i>	<i>Salm.</i>	per.	tep.	— <i>parviflora</i>	<i>Steud.</i>	per.	tep.
— <i>obscura</i>	<i>Mill.</i>	per.	tep.	— <i>urticaefolia</i>	<i>Steud.</i>	lign.	tep.
— <i>obscurevirens</i>	<i>Mart.</i>	per.	tep.	— — <i>grandiflora</i>	<i>Hort.</i>	ling.	sp.
— <i>obtusifolia</i>	<i>Salm.</i>	per.	tep.	<i>Alopecurus agrestis</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>paniculata</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	tep.	— <i>creticus</i>	<i>Trin.</i>	ann.	sp.
— <i>papillosa</i>	<i>Salm.</i>	per.	tep.	— <i>geniculatus</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>parva</i>	<i>Schult.</i>	per.	tep.	— <i>Michellii</i>	<i>H. Genev.</i>	ann.	s. d.
— <i>plicatilis</i>	<i>Mill.</i>	lign.	tep.	— <i>nigricans</i>	<i>Horn.</i>	per.	sp.
— <i>prolifera</i>	<i>Haw.</i>	per.	tep.	— <i>pratensis</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>punctata</i>	<i>Martin.</i>	per.	tep.	— <i>utriculatus</i>	<i>Schrad.</i>	ann.	cal.
— <i>pulchra</i>	<i>Haw.</i>	per.	tep.	<i>Alpinia calcarata</i>	<i>Rosc.</i>	per.	cal.
— <i>purpurascens</i>	<i>Haw.</i>	lign.	tep.	— <i>Cardamomum</i>	<i>Rxb.</i>	per.	cal.
— <i>quinquangularis</i>	<i>Sch.</i>	lign.	tep.	— <i>Galanga</i>	<i>Sw.</i>	per.	cal.
— <i>Radula</i>	<i>Jacq.</i>	per.	tep.	— <i>nutans</i>	<i>Rosc.</i>	per.	frig.
— <i>recurva</i>	<i>Haw.</i>	per.	tep.	<i>Astroemeria formosissima</i>	<i>R. et Pav.</i>	per.	frig.
— <i>Reinwardti</i>	<i>Salm.</i>	lign.	tep.	— <i>Ligtu</i>	<i>L.</i>	per.	frig.
— <i>reticulata</i>	<i>Haw.</i>	per.	tep.	— <i>ovata</i>	<i>Cav.</i>	per.	frig.
— <i>retusa</i>	<i>L.</i>	per.	tep.	— <i>Pelegria</i>	<i>L.</i>	per.	frig.
— <i>rigida</i>	<i>DC.</i>	lign.	tep.	— <i>psittacina</i>	<i>Lehm.</i>	per.	frig.
— — <i>expansa</i>	<i>Salm.</i>	lign.	tep.	— <i>pulchra</i>	<i>Sims.</i>	per.	frig.
— <i>rugosa</i>	<i>Salm.</i>	per.	tep.	— <i>rosea</i>	<i>R. et Pav.</i>	per.	frig.
— <i>Saponaria</i>	<i>Haw.</i>	per.	tep.	— <i>Simsii</i>	<i>Spr.</i>	per.	s. d.
— <i>scaberrima</i>	<i>Salm.</i>	per.	tep.	<i>Althernanthera Achyrantha</i>	<i>R. Br.</i>	ann.	tep.
— <i>scabra</i>	<i>Schult.</i>	per.	tep.	— <i>ficoides</i>	<i>R. Br.</i>	per.	s. d.
— <i>semimargaritifera</i>	<i>Salm.</i>	per.	tep.	— <i>filiformis</i>	<i>Schrad.</i>	ann.	tep.
— — <i>major</i>	<i>Salm.</i>	per.	tep.	— <i>polygonoides</i>	<i>R. Br.</i>	per.	tep.
— — <i>media</i>	<i>H. Vind.</i>	per.	tep.	— <i>sessilis</i>	<i>R. Br.</i>	per.	sp.
— <i>Serra</i>	<i>DC.</i>	per.	tep.	<i>Althaea cannabina</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>soccotrina</i>	<i>Lam.</i>	lign.	tep.	— <i>ficifolia</i>	<i>Cav.</i>	per.	s. d.
— <i>spiralis</i>	<i>L.</i>	lign.	tep.	— <i>Froloviana</i>	<i>Fisch.</i>	ann.	s. d.
— — <i>trigona</i>		lign.	tep.	— <i>hirsuta</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>spirella</i>	<i>Salm.</i>	lign.	tep.	— <i>leucantha</i>	<i>Ehrenb.</i>	bien.	s. d.
— <i>subattenuata</i>	<i>Salm.</i>	per.	tep.	— <i>narbonensis</i>	<i>Pourr.</i>	per.	sp.
— <i>subcarinata</i>	<i>Salm.</i>	per.	tep.	— <i>officinalis</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— — <i>picta</i>	<i>Salm.</i>	per.	tep.	— <i>pallida</i>	<i>W. et Kit.</i>	per.	s. d.
— <i>subfasciata</i>	<i>Salm.</i>	per.	tep.	— <i>rosea</i>	<i>Cav.</i>	bien.	s. d.
— <i>subnigricans</i>	<i>Spr.</i>	per.	tep.	— <i>Sieberi</i>	<i>Link.</i>	bien.	s. d.
— <i>subrigida</i>	<i>Schult.</i>	lign.	tep.	— <i>speciosa</i>	<i>Hort.</i>	per.	s. d.
— <i>subverrucosa</i>	<i>Salm.</i>	per.	tep.	<i>Alyssum argenteum</i>	<i>Vitm.</i>	per.	sp.
— — <i>parvipunctata</i>	<i>S.</i>	per.	tep.	— <i>calycinum</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>sulcata</i>	<i>Salm.</i>	per.	tep.	— <i>confertum</i>	<i>Lk.</i>	per.	s. d.
— <i>tenuifolia</i>	<i>Lam.</i>	lign.	tep.	— <i>edentulum</i>	<i>W. et Kit.</i>	bien.	s. d.

<i>Alyssum gemonense</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Amaryllis vittata</i>	<i>Ait.</i>	per.	tep.
— <i>hirsutum</i>	<i>Bieb.</i>	ann.	s. d.	<i>Amberboa Lippii</i>	<i>DC.</i>	ann.	s. d.
— <i>montanum</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>moschata</i>	<i>DC.</i>	ann.	s. d.
— <i>orientale</i>	<i>Arduin.</i>	lign.	s. d.	— <i>muricata</i>	<i>DC.</i>	ann.	s. d.
— <i>rostratum</i>	<i>Stev.</i>	ann.	s. d.	<i>Amblyocarpum inuloides</i>			
— <i>saxatile</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>Fisch. et Mey.</i>		bien.	s. d.
— <i>sibiricum</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.	<i>Ambrosia bipinnata</i>	<i>Cervt.</i>	ann.	s. d.
— <i>Wierabickii</i>	<i>Heuff.</i>	ann.	s. d.	— <i>elatior</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
<i>Amaranthus angustifolius</i>				— <i>maritima</i>	<i>L.</i>	per.	frig.
— <i>Bieb.</i>	ann.	s. d.		<i>Ambrosinia Bassii</i>	<i>L.</i>	per.	frig.
— <i>aureus</i>	<i>Dietr.</i>	ann.	s. d.	<i>Amelanchier ovalis</i>	<i>Lindl.</i>	lign.	s. d.
— <i>babienis</i>	<i>Schrad.</i>	ann.	s. d.	— <i>vulgaris</i>	<i>Moench</i>	lign.	s. d.
— <i>bicolor</i>	<i>Nocc.</i>	ann.	s. d.	<i>Amethystea coerulea</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>Blitum</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	<i>Amirola nitida</i>	<i>Pers.</i>	lign.	tep.
— — <i>ascendens</i>	<i>Lois.</i>	ann.	sp.	<i>Ammannia verticillata</i>	<i>Lam.</i>	ann.	sp.
— <i>bullatus</i>	<i>Bess.</i>	ann.	s. d.	<i>Ammi majus</i>	<i>L.</i>	bien.	s. d.
— <i>Cararn</i>	<i>Zuccagn.</i>	ann.	s. d.	— <i>Visnaga</i>	<i>Lam.</i>	bien.	s. d.
— <i>caudatus</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	<i>Ammobium alatum</i>	<i>R. Br.</i>	ann.	s. d.
— <i>curvifolius</i>	<i>Spr.</i>	ann.	s. d.	<i>Ammodendrum Sieversii</i>			
— <i>esculentus</i>	<i>Humb.</i>	ann.	s. d.	— <i>DC.</i>		lign.	s. d.
— <i>gangeticus</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	<i>Ammophila arenaria</i>	<i>Lin.</i>	per.	s. d.
— — <i>cuspidatus</i>		ann.	s. d.	<i>Amorpha fruticosa</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>graecizans</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>glabra</i>	<i>Desf.</i>	lign.	s. d.
— <i>hybridus</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>herbacea</i>	<i>Walt.</i>	per.	s. d.
— <i>paniculatus</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>Lewisii</i>	<i>Lodd.</i>	lign.	s. d.
— <i>pendulus</i>	<i>Hort.</i>	ann.	s. d.	<i>Ampelopsis cordata</i>	<i>Michx.</i>	lign.	s. d.
— <i>prostratus</i>	<i>Balb.</i>	per? sp.		— <i>hederacea</i>	<i>DC.</i>	lign.	s. d.
— <i>retroflexus</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	<i>Amphycarpea monoica</i>			
— <i>scandens</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>Nutt.</i>		ann.	s. d.
— <i>speciosus</i>	<i>Don.</i>	ann.	s. d.	<i>Amphilophium paniculatum</i>			
— <i>spicatus</i>	<i>Lam.</i>	ann.	s. d.	— <i>Humb.</i>		lign.	cal.
— <i>spinosus</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	<i>Amsinckia angustifolia</i>	<i>Lhm.</i>	ann.	s. d.
— <i>sylvestris</i>	<i>Desf.</i>	ann.	s. d.	— <i>intermedia</i>	<i>F. et M.</i>	ann.	s. d.
— <i>tortuosus</i>	<i>Horn.</i>	ann.	s. d.	— <i>lycopsioides</i>	<i>Lehm.</i>	ann.	s. d.
— <i>tricolor</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>spectabilis</i>	<i>F. et M.</i>	ann.	s. d.
<i>Amaryllis Atamasco</i>	<i>L.</i>	per.	tep.	<i>Amsonia angustifolia</i>	<i>Michx.</i>	per.	s. d.
— <i>aurea</i>	<i>Ait.</i>	per.	tep.	— <i>latifolia</i>	<i>Michx.</i>	per.	s. d.
— <i>Belladonna</i>	<i>L.</i>	per.	tep.	— <i>salicifolia</i>	<i>Pursh.</i>	per.	s. d.
— <i>brasilensis</i>	<i>Trattin.</i>	per.	tep.	<i>Amygdalus communis</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>carnea</i>	<i>Schult.</i>	per.	tep.	— <i>amara</i>		lign.	s. d.
— <i>chloroleuca</i>	<i>Ker.</i>	per.	tep.	— <i>nana</i>	<i>L.</i>		
— <i>curvifolia</i>	<i>Jacq.</i>	per.	tep.	— <i>campestris</i>	<i>Bess.</i>	lign.	s. d.
— <i>equestris</i>	<i>Ait.</i>	per.	tep.	— <i>persica</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>formosissima</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>fl. pleno</i>		lign.	s. d.
— <i>haemanthoides</i>	<i>Hort.</i>	per.	tep.	<i>Amyris maritima</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.
— <i>Lindleyana</i>	<i>Schult.</i>	per.	tep.	<i>Anacampteros arachnoides</i>			
— <i>miniata</i>	<i>R. et Pav.</i>	per.	tep.	— <i>Sims.</i>		lign.	tep.
— <i>nivea</i>	<i>Schult.</i>	per.	tep.	— <i>filamentosa</i>	<i>Sims.</i>	lign.	tep.
— <i>princeps</i>	<i>Sweet.</i>	per.	tep.	— <i>lanceolata</i>	<i>DC.</i>	per.	tep.
— <i>pulverulenta</i>	<i>Herb.</i>	per.	cal.	— <i>rufescens</i>	<i>DC.</i>	lign.	tep.
— <i>purpurea</i>	<i>Ait.</i>	per.	cal.	— <i>Telephiastrum</i>	<i>DC.</i>	lign.	tep.
— <i>Reginae</i>	<i>L.</i>	per.	tep.	<i>Anacyclus clavatus</i>	<i>Pers.</i>	ann.	s. d.
— — <i>Elisabethae</i>	<i>H.</i>			— <i>pulcher</i>	<i>Bess.</i>	ann.	s. d.
— <i>Modoet.</i>		per.	tep.	— <i>Pyrethrum</i>	<i>Cassin.</i>	per.	s. d.
— <i>tubispatha</i>	<i>Herit.</i>	per.	tep.	— <i>radiatus</i>	<i>Lois.</i>	ann.	s. d.
— <i>undulata</i>	<i>L.</i>	per.	tep.	— <i>tomentosus</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.

<i>Anacyclus valentinus</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	<i>Andromeda racemosa</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>purpurascens</i>	<i>Pers.</i>	per.	s. d.	— <i>speciosa</i>	<i>Michx.</i>	per.	s. d.
<i>Anagallis arvensis</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	<i>Andropogon angustifolius</i>			
— <i>coerulea</i>	<i>All.</i>	ann.	sp.	— <i>Humb. Bonpl.</i>		per.	s. d.
— <i>collina</i>	<i>Schousb.</i>	lign.	tep.	— <i>argenteus</i>	<i>DC.</i>	per.	frig.
— <i>indica</i>	<i>Wight.</i>	ann.	s. d.	— <i>aristatus</i>	<i>Poir.</i>	per.	frig.
— <i>latifolia</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>giganteus</i>	<i>Lk.</i>	per.	s. d.
— <i>tenella</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>Ischaemum</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
<i>Anagyris foetida</i>	<i>L.</i>	ligno.	s. d.	— <i>laguroides</i>	<i>DC.</i>	per.	tep.
<i>Anamenia laserpitifolia</i>				— <i>muricatus</i>	<i>Retz.</i>	per.	cal.
— <i>Vent.</i>		per.	s. d.	— <i>Schoenanthus</i>	<i>L.</i>	per.	cal.
<i>Ananas sativus</i>	<i>Mill.</i>	per.	cal.	<i>Androsace elongata</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>giganteus</i>		per.	cal.	— <i>filiformis</i>	<i>Retz.</i>	ann.	s. d.
— <i>Mont-Serratianus</i>		per.	cal.	— <i>lactea</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>niger</i>		per.	cal.	— <i>lactiflora</i>	<i>Fisch.</i>	per.	s. d.
— <i>ovatus</i>		per.	cal.	— <i>maxima</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>pyramidalis</i>		per.	cal.	— <i>septentrionalis</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>viridis</i>		per.	cal.	<i>Androsace officinale</i>	<i>All.</i>	per.	s. d.
— <i>semiserratus</i>	<i>Schult.</i>	per.	cal.	<i>Andryala nigricans</i>	<i>Poir.</i>	bien.	frig.
<i>Anandria Bellidiasrum</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.	— <i>pinnatifida</i>	<i>Ait.</i>	bien.	frig.
— <i>discoidea</i>	<i>Less.</i>			— <i>ragusina</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
<i>Anarrhinum Bellidiasrum</i>				— <i>varia</i>	<i>Low.</i>	per.	frig.
— <i>crassifolium</i>	<i>W.</i>	bien.	s. d.	<i>Anemone acanthifolia</i>	<i>Ri-</i>		
— <i>pubescens</i>	<i>Fresen.</i>	ann.	s. d.	— <i>alba</i>	<i>chards.</i>	per.	s. d.
<i>Anastasia senegalensis</i>	<i>Fi-</i>			— <i>apennina</i>	<i>Juss.</i>	per.	s. d.
— <i>sch. et Mey.</i>		ann.	s. d.	— <i>baldensis</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
<i>Anastatica hierochuntica</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>coronaria</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
<i>Anchusa Agardhii</i>	<i>Lehm.</i>	per.	s. d.	— <i>dichotoma</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>angustifolia</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>Hudsoniana</i>	<i>Richds.</i>	per.	s. d.
— <i>Barelliceri</i>	<i>Vitm.</i>	per.	s. d.	— <i>narcissiflora</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>capensis</i>	<i>Thunb.</i>	bien.	frig.	— <i>nemorosa</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>ciliata</i>	<i>Chamiss.</i>	per.	frig.	— <i>Pavonina</i>	<i>Lam.</i>	per.	s. d.
— <i>circinata</i>	<i>H. Dresd.</i>	per.	s. d.	— <i>ranunculoides</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>hybrida</i>	<i>Tenor.</i>	per.	s. d.	— <i>stellata</i>	<i>Lam.</i>	per.	s. d.
— <i>leptophylla</i>	<i>R. S.</i>	per.	s. d.	— <i>sylvestris</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>Milleri</i>	<i>W.</i>	ann.	s. d.	— <i>trifolia</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>obliqua</i>	<i>Vis.</i>	ann.	s. d.	— <i>virginiana</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>ochroleuca</i>	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.	— <i>vitifolia</i>	<i>Buchan.</i>	per.	s. d.
— <i>officinalis</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Anethum graveolens</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>incarnata</i>	<i>Schrd.</i>	per.	s. d.	— <i>Sowa</i>	<i>Roxb.</i>	ann.	s. d.
— <i>ovata</i>	<i>Lehm.</i>	ann.	s. d.	<i>Angelica sylvestris</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>paniculata</i>	<i>Ait.</i>	bien.	sp.	<i>Angophora cordata</i>	<i>H. Hüg.</i>	lign.	frig.
— <i>procera</i>	<i>Bess.</i>	per.	s. d.	<i>Anigozanthos flavida</i>	<i>Red.</i>	per.	frig.
— <i>sempervirens</i>	<i>L.</i>	bien.	sp.	<i>Anisolotus anthylloides</i>	<i>Bh.</i>	ann.	s. d.
— <i>undulata</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>Wrangeliana</i>	<i>Brnh.</i>	ann.	s. d.
— <i>variegata</i>	<i>Lehm.</i>	ann.	s. d.	<i>Anoda cristata</i>	<i>Schlecht.</i>	ann.	s. d.
<i>Andrachne telephioides</i>	<i>L.</i>	bien.	s. d.	— <i>hastata</i>	<i>Cav.</i>	ann.	s. d.
<i>Andrographis paniculata</i>				— <i>triangularis</i>	<i>DC.</i>	ann.	s. d.
— <i>Wall.</i>		ann.	s. d.	— <i>brachyantha</i>	<i>Rhb.</i>	ann.	s. d.
<i>Andromeda arborea</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	<i>Anomatheca cruenta</i>	<i>Lindl.</i>	per.	tep.
— <i>axillaris</i>	<i>Ait.</i>	lign.	s. d.	— <i>junceae</i>	<i>Ker.</i>	per.	tep.
— <i>mariana</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	<i>Anomostephium bupthal-</i>			
— <i>membranacea</i>	<i>H. Cls.</i>	lign.	s. d.	— <i>moides</i>	<i>DC.</i>	per.	tep.
— <i>polifolia</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	<i>Anona Cherimolia</i>	<i>Mill.</i>	lign.	cal.
— <i>oleifolia</i>	<i>Hort.</i>	per.	s. d.	— <i>muricata</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.

Antennaria dioica	Gaertn.	per.	s. d.	Aphelaxis spectabilis	Hüg.	lign.	tep.
Anthemidis altissima	L.	ann.	s. d.	Aphyllanthes monspeliensis	L.	per.	s. d.
— — ibérica	L.	ann.	s. d.	Apios tuberosa	Moench	per.	s. d.
— arvensis	L.	ann.	sp.	Apium graveolens	L.	bien.	sp.
— aurea	Broter.	per.	s. d.	— scabrum	Kunz.	bien.	s. d.
— Kitabelii	Spr.	per.	s. d.	Apocynum cannabinum	L.	per.	s. d.
— Marshalliana	W.	per.	frig.	— hypericifolium	Ait.	per.	s. d.
— Micheliana	Bertol.	per.	s. d.	— sibiricum	Pall.	per.	s. d.
— montana	L.	per.	sp.	— venetum	L.	per.	sp.
— petraea	Tenor.	per.	s. d.	— viridiflorum	Tausch	per.	s. d.
— rigescens	W.	per.	s. d.	Apopseris foetida	Lap.	per.	s. d.
— ruthenica	Bieb.	ann.	s. d.	Aquilegia alpina	L.	per.	s. d.
— secundiramea	Biv.	ann.	s. d.	— — grandiflora	Patr.	per.	s. d.
— tinctoria	L.	per.	sp.	— amoena	Hort.	per.	s. d.
Anthericum Liliago	L.	per.	sp.	— atrata	Koch	por.	s. d.
— ramosum	L.	per.	sp.	— atropurpurea	W.	per.	s. d.
Anthocercis littorea	Labill.	lign.	tep.	— daurica	Patrin.	per.	s. d.
Antholyza aethiopica	L.	per.	frig.	— canadensis	L.	per.	s. d.
— bicolor	Gasparrin.	per.	frig.	— elata	Ledeb.	per.	s. d.
— Cunonia	L.	per.	frig.	— formosa	Fisch.	per.	s. d.
— praecalta	DC.	per.	frig.	— Gebleri	Bess.	per.	s. d.
— praecox	Hort.	per.	frig.	— glandulosa	Fisch.	per.	s. d.
— splendens	Steud.	per.	frig.	— hybrida	Sims	per.	s. d.
Anthospermum aetiopicum	L.	lign.	frig.	— leptoceras	F. et M.	per.	s. d.
Anthoxanthum amarum	Broter.	per.	s. d.	— nigricans	Baumg.	per.	s. d.
— gracile	Bivon.	ann.	s. d.	— nivea	Baumg.	per.	s. d.
— odoratum	L.	ann.	sp.	— sibirica	Lam.	per.	s. d.
Anthriscus Cerefolium	Hoffm.	ann.	s. d.	— viridiflora	Pall.	per.	s. d.
— fumarioides	Spr.	bien.	s. d.	— vulgaris	L.	per.	sp.
— sylvestris	Hoffm.	per.	sp.	— — corniculata	Vill.	per.	s. d.
— vulgaris	Pers.	ann.	sp.	— — stellata	Hort.	per.	s. d.
Anthyllis Barba Jovis	L.	lign.	frig.	Arabis alpina	L.	per.	s. d.
— cornicina	L.	ann.	s. d.	— crispata	W.	per.	s. d.
— cytisoides	L.	lign.	frig.	— coerulea	Wulf.	per.	s. d.
— Hermanniae	L.	lign.	frig.	— collina	Tenor.	per.	s. d.
— montana	L.	lign.	s. d.	— heteromalla	Schrad.	per.	s. d.
— polycephala	Desf.	per.	s. d.	— hirsuta	Scop.	bien.	sp.
— tetraphylla	L.	ann.	s. d.	— lilacina	Schrad.	per.	s. d.
— Vulheraria	L.	per.	s. d.	— muralis	Bertol.	per.	s. d.
— — coccinea	Hort.	per.	s. d.	— oblongifolia	Estreih.	bien.	s. d.
Antidesma alexiteria	L.	lign.	cal.	— ovirensis	Wulf.	per.	s. d.
Antirrhinum calycinum	Vent.	ann.	s. d.	— petraea	Crantz	per.	s. d.
— majus	L.	per.	sp.	— rosea	DC.	bien.	s. d.
— meonantherum	Lk.	bien.	s. d.	— sagittata	DC.	bien.	s. d.
— montevidense	Mart.	per.	s. d.	— Thaliana	L.	ann.	sp.
— Orontium	L.	ann.	sp.	— Turrata	L.	bien.	sp.
— sempervirens	Lpeyr.	lign.	s. d.	Arachis hypogaea	L.	ann.	s. d.
Anychia dichotoma	Michx.	bien.	frig.	Aralia japonica	Thunb.	lign.	s. d.
— capillacea	DC.	ann.	s. d.	— racemosa	L.	per.	s. d.
Aotus ferruginea	Labill.	lign.	tep.	— spinosa	L.	lign.	s. d.
Apalochlamys Kerrii	DC.	lign.	tep.	Araucaria brasiliensis	Radd.	lign.	frig.
Aphelandra cristata	R. Br.	lign.	cal.	— excelsa	Ait.	lign.	frig.
				— imbricata	Pavon.	lign.	frig.
				Araujia albens	G. Don	lign.	tep.
				— undulata	H. Pat.	lign.	tep.

<i>Arbutus Andrachne</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	<i>Aristolochia longa</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>serratifolia</i>	<i>Hort.</i>	lign.	s. d.	— <i>sempervirens</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.
— <i>canariensis</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.	— <i>Siphio</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>Unedo</i>	<i>L.</i>	lign.	sp.	— <i>tomentosa</i>	<i>Sims</i>	lign.	frig.
<i>Archangelica decurrens</i>				— <i>trilobata</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.
— <i>Ledeb.</i>		per.	s. d.	<i>Aristotelea Macqui</i>	<i>Herit.</i>	lign.	frig.
— <i>officinalis</i>	<i>Hoffm.</i>	bien.	s. d.	<i>Armeria alliacea</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.
<i>Archostaphylos Uva Ursi</i>				— <i>alpina</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.
— <i>Spr.</i>		lign.	s. d.	— <i>denticulata</i>	<i>Bertol.</i>	per.	s. d.
<i>Arctotheca repens</i>	<i>Wendl.</i>	per.	frig.	— <i>dianthoides</i>	<i>Horn.</i>	per.	s. d.
<i>Arctotis arborescens</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	frig.	— <i>fasciculata</i>	<i>W.</i>	lign.	frig.
— <i>auriculata</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	frig.	— <i>latifolia</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.
— <i>laciniata</i>	<i>Lam.</i>	per.	frig.	— <i>littoralis</i>	<i>Lk.</i>	per.	s. d.
<i>Ardisia crenulata</i>	<i>Vent.</i>	lign.	tep.	— <i>purpurea</i>	<i>Koch</i>	per.	s. d.
— <i>humilis</i>	<i>Vahl</i>	lign.	cal.	— <i>vulgaris</i>	<i>W.</i>	per.	sp.
— <i>littoralis</i>	<i>Nois.</i>	lign.	cal.	<i>Arnica montana</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>paniculata</i>	<i>Roxb.</i>	lign.	cal.	<i>Aronicum Clusii</i>	<i>Koch</i>	per.	s. d.
— <i>colorata</i>	<i>Lk.</i>	lign.	cal.	— <i>scorpioides</i>	<i>Koch</i>	per.	s. d.
<i>Arduina bispinosa</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.	<i>Arrenatherum avenaceum</i>			
<i>Aremonia agrimonoides</i>				— <i>bulbosum</i>	<i>Beauv.</i>	per.	sp.
<i>Arenaria arctica</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.	— <i>Absinthium</i>	<i>Presl</i>	per.	sp.
— <i>ciliata</i>	<i>Stev.</i>	per.	s. d.	<i>Artemisia Abrotanum</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>dianthoides</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>arborescens</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>graminifolia</i>	<i>Sm.</i>	per.	frig.	— <i>argentea</i>	<i>Herit.</i>	lign.	frig.
— <i>junceae</i>	<i>Schrd.</i>	per.	s. d.	— <i>armeniaca</i>	<i>Lam.</i>	per.	frig.
— <i>linifolia</i>	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.	— <i>borealis</i>	<i>Pall.</i>	per.	frig.
— <i>longifolia</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>campestris</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>media</i>	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.	— <i>camphorata</i>	<i>Vill.</i>	lign.	sp.
— <i>mucronata</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>saxatilis</i>	<i>W. Kit.</i>	lign.	sp.
— <i>pungens</i>	<i>Clem.</i>	per.	s. d.	— <i>subcanescens</i>	<i>W.</i>	lign.	s. d.
— <i>purpurascens</i>	<i>Ram.</i>	per.	s. d.	— <i>coarctata</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.
— <i>ramosissima</i>	<i>Schrd.</i>	per.	s. d.	— <i>coerulescens</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>rostrata</i>	<i>Pers.</i>	per.	s. d.	— <i>commutata</i>	<i>Bess.</i>	per.	s. d.
— <i>rubra</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>desertorum</i>	<i>Spr.</i>	per.	s. d.
— <i>serpyllifolia</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>Dracunculus</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>tenuifolia</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>inodora</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.
— <i>trinervia</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>glauca</i>	<i>Pall.</i>	per.	s. d.
— <i>verna</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>herbacea</i>	<i>Ehrh.</i>	per.	s. d.
<i>Argemone Barclayana</i>				— <i>indica</i>	<i>W.</i>	per.	tep.
— <i>Penny</i>		ann.	s. d.	— <i>lednicensis</i>	<i>Rochel</i>	lign.	s. d.
— <i>grandiflora</i>	<i>Sweet</i>	ann.	s. d.	— <i>Mertensiana</i>	<i>Wall.</i>	per.	s. d.
— <i>mexicana</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>naromitana</i>	<i>Vis.</i>	lign.	s. d.
— <i>sulphurea</i>	<i>Sweet</i>	ann.	s. d.	— <i>pontica</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
<i>Argyrobium Andrewsianum</i>	<i>Stead.</i>	lign.	tep.	— <i>rupestris</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>Linnaeanum</i>	<i>Walp.</i>	lign.	frig.	— <i>vallesiana</i>	<i>Lam.</i>	per.	s. d.
<i>Aristea cyanea</i>	<i>Ait.</i>	per.	frig.	— <i>vulgaris</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
<i>Aristolochia altissima</i>	<i>Desf.</i>	lign.	tep.	— <i>violacea</i>	<i>H. Paris.</i>	per.	s. d.
— <i>brasiliensis</i>	<i>Mart.</i>	lign.	tep.	<i>Arthropodium cirratum</i>	<i>R.</i>		
— <i>caudata</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.	— <i>minus</i>	<i>Br.</i>	per.	frig.
— <i>Clematidis</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>paniculatum</i>	<i>R. Br.</i>	per.	frig.
— <i>glauca</i>	<i>Desf.</i>	lign.	frig.	— <i>pendulum</i>	<i>Spr.</i>	per.	frig.
— <i>grandiflora</i>	<i>Sw.</i>	per.	cal.	<i>Artocarpus integrifolia</i>	<i>L. f.</i>	lign.	cal.
— <i>labiosa</i>	<i>Ker.</i>	per.	s. d.	<i>Arum Arisarum</i>	<i>L.</i>	per.	frig.
— <i>rotunda</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>Colocasia</i>	<i>L.</i>	per.	tep.

Arum <i>corsicum</i> <i>Deslong.</i>	per.	frig.	Asphodelus <i>intermedius</i>	bien.	s. d.
— <i>divaricatum</i> <i>L.</i>	per.	tep.	— <i>luteus</i> <i>L.</i>	bien.	s. d.
— <i>Dracunculus</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	Aspidium <i>aculeatum</i> <i>Sw.</i>	per.	sp.
— <i>italicum</i> <i>Lam.</i>	per.	sp.	— <i>filix foemina</i> <i>Sw.</i>	per.	sp.
— <i>macrorrhizon</i> <i>L.</i>	per.	cal.	— <i>filix mas</i> <i>Sw.</i>	per.	sp.
— <i>maculatum</i> <i>L.</i>	per.	sp.	— <i>fontanum</i> <i>W.</i>	per.	s. d.
— <i>orientale</i> <i>Bieb.</i>	per.	s. d.	— <i>fragile</i> <i>Sw.</i>	per.	sp.
— <i>pictum</i> <i>L. fil.</i>	per.	tep.	— <i>pubescens</i> <i>Sw.</i>	per.	s. d.
— <i>tenuifolium</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>tenerum</i> <i>Schleich.</i>	per.	s. d.
— <i>ternatum</i> <i>Thunb.</i>	per.	s. d.	— <i>Thelypteris</i> <i>Sw.</i>	per.	sp.
— <i>trilobatum</i> <i>L.</i>	per.	tep.	— <i>trifoliatum</i> <i>Sw.</i>	per.	frig.
Arundinaria <i>glaucescens</i>	lign.	s. d.	— <i>violascens</i> <i>Lk.</i>	per.	frig.
Arundo <i>Donax</i> <i>L.</i>	lign.	s. d.	Asplenium <i>acutum</i> <i>W.</i>	per.	sp.
— <i>versicolor</i> <i>Mill.</i>	lign.	s. d.	— <i>Adiantum nigrum</i> <i>L.</i>	per.	sp.
— <i>Pliniana</i> <i>Turra</i>	per.	s. d.	— <i>Ruta muraria</i> <i>L.</i>	per.	sp.
Asarum <i>europaeum</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>Trichomanes</i> <i>L.</i>	per.	sp.
Asclepias <i>curassavica</i> <i>L.</i>	lign.	tep.	Astelia <i>Banksii</i> <i>H. Cels.</i>	per.	cal.
— <i>incarnata</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	Aster <i>adulterinus</i> <i>W.</i>	per.	s. d.
— <i>pulchra</i> <i>Ehrh.</i>	per.	s. d.	— <i>alpinus</i> <i>L.</i>	per.	sp.
— <i>linifolia</i> <i>Lagasc.</i>	lign.	frig.	— <i>amabilis</i> <i>Wender.</i>	per.	s. d.
— <i>mexicana</i> <i>Cav.</i>	per.	frig.	— <i>amelloides</i> <i>Bess.</i>	per.	s. d.
— <i>nivea</i> <i>L.</i>	per.	frig.	— <i>Amellus</i> <i>L.</i>	per.	sp.
— <i>obtusifolia</i> <i>Michx.</i>	per.	frig.	— <i>antirrhinifolius</i> <i>H.</i>	per.	s. d.
— <i>princeps</i> <i>Bartl.</i>	lign.	tep.	— <i>argunensis</i> <i>DC.</i>	per.	s. d.
— <i>salicifolia</i> <i>Lodd.</i>	per.	frig.	— <i>argutus</i> <i>Nees</i>	per.	s. d.
— <i>syriaca</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>asper</i> <i>Nees</i>	per.	s. d.
Asimina <i>triloba</i> <i>Dun.</i>	lign.	s. d.	— <i>azureus</i> <i>Lindl.</i>	per.	s. d.
Asparagus <i>acutifolius</i> <i>L.</i>	lign.	sp.	— <i>calendulaefolius</i> <i>Hrt.</i>	lign.	frig.
— <i>amarus</i> <i>DC.</i>	per.	s. d.	— <i>concinus</i> <i>W.</i>	lign.	s. d.
— <i>Broussonetii</i> <i>Jacq.</i>	lign.	frig.	— <i>cordifolius</i> <i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>davuricus</i> <i>Fisch.</i>	per.	s. d.	— <i>cyaneus</i> <i>Hoffm.</i>	lign.	s. d.
— <i>longifolius</i> <i>Fisch.</i>	per.	s. d.	— <i>densus</i> <i>H. Prag.</i>	lign.	s. d.
— <i>officinalis</i> <i>L.</i>	per.	sp.	— <i>ericoides</i> <i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>altus</i> <i>W.</i>	per.	s. d.	— <i>firmus</i> <i>Nees</i>	lign.	s. d.
— <i>maritimus</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>formosissimus</i> <i>Hort.</i>	lign.	s. d.
— <i>scandens</i> <i>Thunb.</i>	per.	tep.	— <i>fragilis</i> <i>W.</i>	lign.	s. d.
— <i>tenuifolius</i> <i>Lam.</i>	per.	sp.	— <i>grandiflorus</i> <i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>verticillatus</i> <i>L.</i>	per.	frig.	— <i>hirsutus</i> <i>Host</i>	lign.	s. d.
Asperula <i>aristata</i> <i>L. fil.</i>	per.	frig.	— <i>laevigatus</i> <i>W.</i>	lign.	s. d.
— <i>arvensis</i> <i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>lanceolatus</i> <i>W.</i>	lign.	s. d.
— <i>ciliata</i> <i>Roch.</i>	per.	s. d.	— <i>laxifolius</i> <i>Nees</i>	lign.	s. d.
— <i>cynanchica</i> <i>L.</i>	per.	sp.	— <i>laxus</i> <i>W.</i>	lign.	s. d.
— <i>galioides</i> <i>Bieb.</i>	per.	s. d.	— <i>longifolius</i> <i>Lam.</i>	lign.	s. d.
— <i>tyraica</i> <i>Bess.</i>	per.	s. d.	— <i>laevigatus</i> <i>Pursh</i>	lign.	s. d.
— <i>hirta</i> <i>Ramond</i>	per.	s. d.	— <i>luxurians</i> <i>Spr.</i>	lign.	s. d.
— <i>humifusa</i> <i>Bess.</i>	per.	s. d.	— <i>Novae Angliae</i> <i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>montana</i> <i>W. et K.</i>	per.	s. d.	— <i>Novi Belgii</i> <i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>odorata</i> <i>L.</i>	per.	sp.	— <i>pallens</i> <i>W.</i>	per.	s. d.
— <i>rivalis</i> <i>Sibth. Sm.</i>	per.	s. d.	— <i>parviflorus</i> <i>Nees</i>	per.	s. d.
— <i>scutellaris</i> <i>Vis.</i>	lign.	s. d.	— <i>patulus</i> <i>Lam.</i>	per.	s. d.
— <i>taurina</i> <i>L.</i>	per.	sp.	— <i>politus</i> <i>Nees</i>	per.	s. d.
— <i>tinctoria</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>praecaltus</i> <i>Poir.</i>	per.	s. d.
Asphodelus <i>aestivus</i> <i>Brot.</i>	bien.	s. d.	— <i>puniceus</i> <i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>creticus</i> <i>Lam.</i>	bien.	frig.	— <i>pyrenaicus</i> <i>Desf.</i>	per.	s. d.
— <i>fistulosus</i> <i>L.</i>	bien.	s. d.			

<i>Aster rubricaulis</i>	<i>Lam.</i>	per.	s. d.	<i>Astragalus mexicanus</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.
— <i>sagittaeifolius</i>	<i>Wdm.</i>	per.	s. d.	— <i>monspessulanus</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>salignus</i>	<i>W.</i>	per.	sp.	— <i>multicaulis</i>	<i>Ledeb.</i>	per.	s. d.
— <i>sericeus</i>	<i>Vent.</i>	per.	frig.	— <i>odoratus</i>	<i>Lam.</i>	per.	s. d.
— <i>speciosus</i>	<i>Horn.</i>	per.	s. d.	— <i>Onobrychis</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>squarrosulus</i>	<i>Nees</i>	per.	s. d.	— <i>Pattersonii</i>	<i>H. Tng.</i>	per.	s. d.
— <i>strictus</i>	<i>Poir.</i>	per.	s. d.	— <i>pentaglottis</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>Tradescanti</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>prostratus</i>	<i>Fisch.</i>	ann.	s. d.
— <i>vimineus</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.	— <i>reticulatus</i>	<i>Bieb.</i>	ann.	s. d.
<i>Asterocephalus africanus</i>				— <i>rupifragus</i>	<i>Pall.</i>	per.	s. d.
— <i>altissimus</i>	<i>Spr.</i>	lign.	frig.	— <i>sesameus</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>ambiguus</i>	<i>Spr.</i>	lign.	frig.	— <i>Stella</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>— acutiflorus</i>	<i>Reichb.</i>	per.	s. d.	— <i>subulatus</i>	<i>Pall.</i>	per.	s. d.
— <i>atropurpureus</i>	<i>Spr.</i>	ann.	s. d.	— <i>sulcatus</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>— grandiflorus</i>	<i>Hrt.</i>	ann.	s. d.	— <i>Tragacantha</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>canescens</i>	<i>Spr.</i>	per.	s. d.	— <i>tribuloides</i>	<i>Roth.</i>	ann.	s. d.
— <i>Columbaria</i>	<i>Spr.</i>	per.	s. d.	— <i>uliginosus</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>creticus</i>	<i>Spr.</i>	lign.	frig.	— <i>utriger</i>	<i>Pall.</i>	per.	s. d.
— <i>daucoides</i>	<i>Spr.</i>	bien.	s. d.	— <i>versicolor</i>	<i>Pall.</i>	per.	s. d.
— <i>graminifolius</i>	<i>Spr.</i>	per.	sp.	— <i>vicioides</i>	<i>Ledeb.</i>	per.	s. d.
— <i>gramuntinus</i>	<i>Spr.</i>	per.	s. d.	— <i>virgatus</i>	<i>Pall.</i>	per.	s. d.
— <i>Iladnikianus</i>	<i>H. Pat.</i>	per.	s. d.	<i>Astrantia major</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>holosericeus</i>	<i>Spr.</i>	per.	s. d.	<i>Astrapaea Wallichii</i>	<i>Lindl.</i>	lign.	cal.
— <i>pilosus</i>	<i>Lag.</i>	per.	s. d.	<i>Athamantha cretensis</i>	<i>L.</i>	bien.	s. d.
— <i>paucisetus</i>	<i>Loud.</i>	per.	s. d.	— <i>flavescens</i>	<i>Vis.</i>	per.	s. d.
— <i>pyrenaicus</i>	<i>Coll.</i>	per.	s. d.	— <i>Matthioli</i>	<i>Wulf.</i>	per.	s. d.
— <i>Scopolii</i>	<i>Reichb.</i>	per.	s. d.	<i>Atraphaxis spinosa</i>	<i>L.</i>	lign.	tep.
— <i>stellatus</i>	<i>Reichb.</i>	ann.	s. d.	— <i>undulata</i>	<i>W.</i>	lign.	tep.
— <i>ucranicus</i>	<i>Spr.</i>	per.	s. d.	<i>Atriplex angustifolia</i>	<i>Sm.</i>	ann.	sp.
<i>Astragalus aduncus</i>	<i>W.</i>	lign.	s. d.	— <i>hastata</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>Aegiceras</i>	<i>W.</i>	ann.	s. d.	— <i>hortensis</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>alopecuroides</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>— ruberrima</i>	<i>DC.</i>	ann.	s. d.
— <i>baeticus</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>laciniata</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>brachycarpus</i>	<i>Led.</i>	ann.	s. d.	— <i>littoralis</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>brachyceras</i>	<i>Led.</i>	ann.	s. d.	— <i>patula</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>canadensis</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>portulacoides</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>carolinianus</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>rosea</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>caucasicus</i>	<i>Pall.</i>	lign.	s. d.	— <i>triangularis</i>	<i>W.</i>	ann.	sp.
— <i>Cicer</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	<i>Atropa arborescens</i>	<i>L.</i>	per.	tep.
— <i>ciceriformis</i>	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.	— <i>Belladonna</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>epiglottis</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>biflora</i>	<i>R. et P.</i>	lign.	tep.
— <i>excapus</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Aubrietia deltoidea</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.
— <i>falcatus</i>	<i>Lam.</i>	per.	s. d.	— <i>— purpurea</i>	<i>DC.</i>	ann.	s. d.
— <i>falciformis</i>	<i>Desf.</i>	per.	frig.	<i>Aucuba japonica</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>glyciphylloides</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.	<i>Avena fatua</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>Grahami</i>	<i>Steud.</i>	ann.	s. d.	— <i>orientalis</i>	<i>Schreb.</i>	ann.	s. d.
— <i>hamosus</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>planiculmis</i>	<i>Schrad.</i>	per.	s. d.
— <i>hispidulus</i>	<i>DC.</i>	ann.	s. d.	— <i>pilosa</i>	<i>Bieb.</i>	ann.	s. d.
— <i>hypogaeus</i>	<i>Ledeb.</i>	per.	s. d.	— <i>pubescens</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>illyricus</i>	<i>Bernh.</i>	per.	s. d.	— <i>sativa</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>juvenalis</i>	<i>Delil.</i>	ann.	s. d.	<i>Averrhoa Bilimbi</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.
— <i>Laxmanni</i>	<i>Jacq.</i>	per.	s. d.	<i>Axyris amaranthoides</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>leucophaeus</i>	<i>Sm.</i>	per.	s. d.	<i>Ayenia magna</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.
— <i>maximus</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.	— <i>pusilla</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>melilotoides</i>	<i>Pall.</i>	per.	s. d.	<i>Azalea calendulacea</i>	<i>Michx.</i>	lign.	frig.
				— <i>glauca</i>	<i>Lam.</i>	lign.	frig.

<i>Azalea pontica</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	<i>Barleria flava</i>	<i>Jacq. fil.</i>	lign.	cal.
— plur. var.	<i>Hort.</i>	lign.	s. d.	— longifolia	<i>L.</i>	lign.	cal.
— procumbens	<i>L.</i>	lign.	s. d.	<i>Bartsia Odontites</i>	<i>Huds.</i>	ann.	sp.
— viscosa	<i>L.</i>	lign.	frig.	— serotina	<i>Bertol.</i>	ann.	sp.
				— viscosa	<i>L.</i>	ann.	s. d.
<i>Babiana plicata</i>	<i>Ker.</i>	per.	frig.	<i>Basella alba</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— tubiflora	<i>Ker.</i>	per.	frig.	— ramosa	<i>Jacq.</i>	ann.	s. d.
— villosa	<i>Ker.</i>	per.	frig.	— rubra	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— purpurea	<i>Ker.</i>	per.	frig.	— vesicaria	<i>Hort.</i>	per.	frig.
<i>Baccharis halimifolia</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	<i>Batatas edulis</i>	<i>Chois.</i>	per.	cal.
<i>Bactris setosa</i>	<i>Mart.</i>	lign.	cal.	— insignis	<i>Chois.</i>	per.	cal.
<i>Backea camphorata</i>	<i>R. Br.</i>	lign.	cal.	— paniculata	<i>Chois.</i>	per.	cal.
— virgata	<i>Andr.</i>	lign.	frig.	— Willdenowii	<i>G. Don</i>	per.	cal.
<i>Baeobotrys indica</i>	<i>Roxb.</i>	lign.	tep.	<i>Bathmum trifoliatum</i>	<i>Sw.</i>	per.	tep.
<i>Baeria chrysostoma</i>	<i>F. et M.</i>	ann.	s. d.	<i>Bauhinia aculeata</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.
<i>Bahia lanata</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.	— acuminata	<i>L.</i>	lign.	cal.
<i>Ballota acetabulosa</i>	<i>Benth.</i>	per.	s. d.	<i>Beaufortia decussata</i>	<i>R. Br.</i>	lign.	frig.
— africana	<i>Benth.</i>	per.	s. d.	— rotundifolia	<i>H. Hug.</i>	lign.	frig.
— hispanica	<i>Benth.</i>	per.	s. d.	<i>Beaumontia grandiflora</i>	<i>Wall.</i>	lign.	cal.
— nigra	<i>L.</i>	per.	sp.				
— spinosa	<i>Link.</i>	lign.	s. d.	<i>Beckmannia erucaeformis</i>	<i>Host</i>	per.	s. d.
<i>Balsamita ageratifolia</i>	<i>Desf.</i>	lign.	frig.				
<i>Bambusa arundinacea</i>	<i>Retz.</i>	lign.	cal.	<i>Begonia acerifolia</i>	<i>Humb.</i>	lign.	cal.
<i>Banisteria emarginata</i>	<i>Cav.</i>	lign.	cal.	— bulbillifera	<i>Link.</i>	per.	cal.
— laurifolia	<i>L.</i>	lign.	cal.	— castra	<i>Meisn.</i>	per.	cal.
— periplocifolia	<i>Desf.</i>	lign.	cal.	— castaneaefolia	<i>Fisch.</i>	lign.	cal.
— splendens	<i>DC.</i>	lign.	cal.	— cucullata	<i>W.</i>	lign.	cal.
<i>Banksia dentata</i>	<i>L. fil.</i>	lign.	frig.	— dichotoma	<i>Jacq.</i>	lign.	cal.
— latifolia	<i>R. Br.</i>	lign.	frig.	— dipetala	<i>Grah.</i>	lign.	cal.
— marcescens	<i>R. Br.</i>	lign.	frig.	— disticha	<i>Link.</i>	lign.	cal.
— spinulosa	<i>Sm.</i>	lign.	frig.	— diversifolia	<i>Grah.</i>	lign.	cal.
<i>Baptisia australis</i>	<i>R. Br.</i>	per.	s. d.	— Dregei	<i>Ott.</i>	lign.	cal.
— exaltata	<i>Sweet.</i>	per.	s. d.	— eriocaulis	<i>H. Lavan.</i>	lign.	cal.
— minor	<i>Lehm.</i>	per.	s. d.	— Evansiana	<i>Andr.</i>	per.	s. d.
<i>Barbarea tinctoria</i>	<i>R. Br.</i>	per.	s. d.	— heracleifolia	<i>Chmiss.</i>	per.	cal.
— altaica	<i>Andrz.</i>	per.	s. d.	— hirsuta	<i>Aubl.</i>	ann.	s. d.
— iberica	<i>DC.</i>	per.	s. d.	— hirtella	<i>Link.</i>	per.	cal.
— orthoceras	<i>Ledeb.</i>	per.	s. d.	— insignis	<i>Grah.</i>	per.	cal.
— plantaginica	<i>DC.</i>	per.	s. d.	— macrophylla	<i>Drynd.</i>	lign.	cal.
— prostrata	<i>Gay.</i>	per.	s. d.	— maculata	<i>Radd.</i>	lign.	cal.
— vulgaris	<i>R. Br.</i>	per.	s. d.	— manicata	<i>H. Cels.</i>	per.	cal.
<i>Barkhausia alpina</i>	<i>DC.</i>	ann.	s. d.	— Martiana	<i>Link.</i>	per.	cal.
— cernua	<i>Reichb.</i>	per.	s. d.	— nitida	<i>Ait.</i>	lign.	cal.
— foetida	<i>DC.</i>	ann.	s. d.	— peltata	<i>H. Lavan.</i>	per.	cal.
— glandulosa	<i>Prest.</i>	ann.	s. d.	— platanifolia	<i>Schott.</i>	lign.	cal.
— graveolens	<i>Lk.</i>	ann.	s. d.	— sanguinea	<i>Radd.</i>	lign.	cal.
— juvenalis	<i>Delil.</i>	ann.	s. d.	— Sellowii	<i>Link.</i>	lign.	cal.
— leontodontoides	<i>Spr.</i>	bien.	s. d.	— semperflorens	<i>Link.</i>	per.	cal.
— rhoeadifolia	<i>Bieb.</i>	aun.	s. d.	— tenuifolia	<i>Dryand.</i>	per.	cal.
— rubra	<i>Moench.</i>	ann.	s. d.	— ulmifolia	<i>W.</i>	lign.	cal.
— scariosa	<i>Reichb.</i>	ann.	s. d.	<i>Bellidistrum Michellii</i>	<i>Cass.</i>	per.	cal.
— senecioides	<i>Spr.</i>	ann.	s. d.	<i>Bellis hybrida</i>	<i>Tenor.</i>	per.	s. d.
— setosa	<i>DC.</i>	ann.	s. d.	— perennis	<i>L.</i>	per.	sp.
— taraxacifolia	<i>DC.</i>	bien.	s. d.	— sylvestris	<i>Cyrill.</i>	per.	s. d.
<i>Barleria coccinea</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.	<i>Beloperone oblongata</i>	<i>Lindl.</i>	lign.	cal.
— cristata	<i>L.</i>	lign.	cal.	<i>Benincasa cerifera</i>	<i>Sav.</i>	ann.	s. d.

Benzoin odoriferum	Nees	lign.	s. d.	Bidens parviflora	W.	ann.	s. d.
Berberis asiatica	Roxb.	lign.	s. d.	— tripartita	L.	ann.	sp.
— chinensis	Desf.	lign.	s. d.	Bifora flosculosa	Bieb.	ann.	sp.
— cuneata	Banks	lign.	tep.	— radians	L.	ann.	sp.
— emarginata	W.	lign.	s. d.	Bignonia aequinoctialis	L.	lign.	cal.
— Jacquinii	Schrad.	lign.	s. d.	— capreolata	L.	lign.	s. d.
— iberica	Stev.	lign.	s. d.	— grandiflora	Jacq.	lign.	s. d.
— laxiflora	Schrad.	lign.	s. d.	— grandifolia	G. Don	lign.	cal.
— lucida	Schrad.	lign.	s. d.	— triphylla	L.	lign.	cal.
— macracantha	Schrd.	lign.	s. d.	— Unguis	L.	lign.	cal.
— macrocarpa	Schrd.	lign.	s. d.	— venusta	Ker	lign.	cal.
— mitis	Schrad.	lign.	s. d.	Billardiera fusiformis	Lbill.	lign.	frig.
— nepalensis	Spr.	lign.	s. d.	— mutabilis	Salisb.	lign.	frig.
— provincialis	Audib.	lign.	s. d.	— scandens	Sm.	lign.	frig.
— purpurea	H. Lai-	lign.	s. d.	Billbergia amoena	Lindl.	per.	cal.
— nat.		lign.	s. d.	— iridifolia	Lindl.	per.	cal.
— sanguinolenta	Schd.	lign.	s. d.	— pyramidalis	Lindl.	per.	cal.
— sibirica	Pall.	lign.	s. d.	— speciosa	Thunb.	per.	cal.
— spatulata	Schrad.	lign.	s. d.	— zebrina	Lindl.	per.	cal.
— virgata	R. et Pav.	lign.	frig.	Binzia ericoides	H. Hügel	lign.	frig.
— vulgaris	L.	lign.	sp.	Biotia commixta	DC.	per.	s. d.
Berchemia volubilis	DC.	bien.	s. d.	— corymbosa	DC.	per.	s. d.
Berkheya incana	W.	lign.	frig.	— macrophylla	DC.	per.	s. d.
Berteroa incana	DC.	bien.	sp.	— Schreberi	DC.	per.	s. d.
— mutabilis	DC.	per.	s. d.	Biscutella apula	L.	ann.	s. d.
— obliqua	DC.	lign.	s. d.	— auriculata	L.	ann.	s. d.
— orbiculata	DC.	lign.	s. d.	— ciliata	DC.	ann.	s. d.
Berzelia lanuginosa	Brong.	lign.	frig.	— Columnae	Tenor.	ann.	s. d.
— superba	Eckl.	lign.	frig.	— coronopifolia	All.	per.	s. d.
Besleria serrulata	Jacq.	lign.	cal.	— depressa	W.	ann.	s. d.
Beta brasiliensis	H. Kijov.	bien.	s. d.	— erigerifolia	DC.	ann.	s. d.
— macrocarpa	Gussone	ann.	s. d.	— hispida	DC.	ann.	s. d.
— maritima	L.	ann.	sp.	— leiocarpa	DC.	ann.	s. d.
— orientalis	Heyn.	per.	s. d.	— maritima	Tenor.	ann.	s. d.
— trigyna	W. et K.	per.	s. d.	— raphanifolia	Poir.	ann.	s. d.
— vulgaris	L.	bien.	s. d.	Biserrula Pelecinus	L.	ann.	s. d.
Betkea major	Fisch. Mey.	ann.	s. d.	Bixa Orellana	L.	lign.	cal.
Betonica grandiflora	Stev.	per.	s. d.	Blackwellia spiralis	Wall.	lign.	cal.
— hirsuta	L.	per.	s. d.	Blainvillea latifolia	Cassin.	ann.	s. d.
— incana	Mill.	per.	s. d.	Blechnum occidentale	L.	per.	frig.
— officinalis	L.	per.	s. d.	Bletia florida	R. Br.	per.	cal.
— orientalis	L.	per.	s. d.	— hyacinthina	R. Br.	per.	cal.
Betula alba	L.	lign.	sp.	— verecunda	R. Br.	per.	cal.
— excelsa	Ait.	lign.	s. d.	Blitum Bonus Henricus	C.	per.	sp.
— papyracea	Ait.	lign.	s. d.	— A. Mey.		per.	sp.
— pumila	L.	lign.	s. d.	— capitatum	L.	ann.	s. d.
— undulata	H. Madoet.	lign.	s. d.	— chenopodioides	Lm.	ann.	s. d.
Beureria succulenta	Jacq.	lign.	tep.	— polymorphum	Mey.	ann.	s. d.
Bidens bipinnata	L.	ann.	sp.	— rubrum	Reichb.	ann.	sp.
— bullata	L.	ann.	sp.	— virgatum	L.	ann.	s. d.
— chrysanthia	DC.	ann.	s. d.	Blumenbachia insignis	Schrad.	per.	frig.
— scrulaefolia	DC.	per.	s. d.	Bocconia frutescens	L.	lign.	tep.
— frondosa	L.	ann.	s. d.	Boerhaavia arborea	Lagasc.	lign.	cal.
— heterophylla	Orteg.	ann.	s. d.	— diffusa	L.	ann.	s. d.
— leucantha	W.	ann.	s. d.	— hirsuta	L.	lign.	cal.
— paleacea	Fis.	ann.	s. d.				

<i>Boerhaavia scandens</i>	<i>L.</i>	ligu.	cal.	<i>Bromus mollis</i>	<i>L.</i>	bien.	sp.
— <i>viscosa</i>	<i>Lagasc.</i>	per.	cal.	— <i>mollissimus</i>	<i>Ledeb.</i>	bien.	s. d.
<i>Boissiera bromoides</i>	<i>Hochst.</i>	ann.	s. d.	— <i>patulus</i>	<i>M. K.</i>	bien.	s. d.
<i>Boltonia asteroides</i>	<i>Herit.</i>	per.	s. d.	— <i>purgans</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>glastifolia</i>	<i>Herit.</i>	per.	s. d.	— <i>pubescens</i>	<i>Muhlenb.</i>	per.	s. d.
<i>Bombax Ceiba</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.	— <i>racemosus</i>	<i>L.</i>	bien.	s. d.
<i>Bouplandia geminiflora</i>	<i>Cav.</i>	per.	cal.	— <i>rigidus</i>	<i>Roth</i>	ann.	s. d.
<i>Bontia daphnoides</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.	— <i>Schraderi</i>	<i>Kunth</i>	per.	frig.
<i>Borago laxiflora</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.	— <i>secalinus</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>officinalis</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>squarrosus</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>orientalis</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>sterilis</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
<i>Borassus flabelliformis</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.	— <i>tectorum</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
<i>Borreria crassifolia</i>	<i>C. A. M.</i>	ann.	s. d.	— <i>wolgensis</i>	<i>Spr.</i>	ann.	s. d.
— <i>Kobautiana</i>	<i>Chmiss.</i>	lign.	cal.	<i>Broussonetia papyrifera</i>	<i>Vnt</i>	lign.	s. d.
— <i>parviflora</i>	<i>Mey.</i>	ann.	s. d.	— — <i>cucullata</i>	<i>Hrt.</i>	lign.	s. d.
— <i>stricta</i>	<i>Mey.</i>	ann.	s. d.	<i>Browallia elata</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
<i>Borrchia frutescens</i>	<i>DC.</i>	lign.	frig.	<i>Brucea ferruginea</i>	<i>Herit.</i>	lign.	cal.
<i>Bosea Yervamora</i>	<i>L.</i>	lign.	tep.	<i>Brugmansia bicolor</i>	<i>Pers.</i>	lign.	tep.
<i>Bossiaea rufa</i>	<i>R Br.</i>	lign.	frig.	— <i>candida</i>	<i>Pers.</i>	lign.	tep.
— <i>Scolopendrium</i>	<i>R. B.</i>	lign.	frig.	— <i>suaveolens</i>	<i>W.</i>	lign.	tep.
<i>Bouvardia chlorantha</i>	<i>Bertl.</i>	lign.	tep.	<i>Brunnichia cirrhosa</i>	<i>Gaertn.</i>	lign.	s. d.
— <i>triphylla</i>	<i>Salisb.</i>	lign.	tep.	<i>Brunfelsia americana</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.
<i>Bowlesia palmata</i>	<i>R. et Pv.</i>	ann.	s. d.	— <i>violacea</i>	<i>Loddig.</i>	lign.	cal.
<i>Brachycome diversifolia</i>	<i>Fischer</i>	ann.	s. d.	<i>Brunswigia falcata</i>	<i>Ker.</i>	per.	tep.
<i>Brachycoris parviflora</i>	<i>Serd.</i>	ann.	s. d.	<i>Bryonia africana</i>	<i>Thunb.</i>	per.	frig.
<i>Brandesia porrigens</i>	<i>Mart.</i>	lign.	tep.	— <i>dioica</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
<i>Brasia spinosa</i>	<i>H. Lainat.</i>	lign.	cal.	— <i>palmata</i>	<i>L.</i>	per.	frig.
<i>Brassica balearica</i>	<i>Rich.</i>	per.	s. d.	<i>Bubroma Guazuma</i>	<i>W.</i>	lign.	cal.
— <i>campestris</i>	<i>L.</i>	bien.	s. d.	<i>Buddleja americana</i>	<i>L.</i>	lign.	tep.
— <i>Cheiranthus</i>	<i>Vill.</i>	bien.	s. d.	— <i>brasiliensis</i>	<i>Jacq. f.</i>	lign.	frig.
— <i>incana</i>	<i>Tenor</i>	lign.	s. d.	— <i>globosa</i>	<i>Lam.</i>	lign.	frig.
— <i>macrocarpa</i>	<i>Gusson.</i>	lign.	frig.	— <i>madagascariensis</i>	<i>Vahl</i>	lign.	frig.
— <i>Napus</i>	<i>L.</i>	bien.	s. d.	— <i>nepalensis</i>	<i>Hort.</i>	lign.	cal.
— <i>oleracea</i>	<i>L.</i>	bien.	s. d.	— <i>saligna</i>	<i>W.</i>	lign.	frig.
— <i>praecox</i>	<i>Wldst. et K.</i>	bien.	s. d.	— <i>salvifolia</i>	<i>Lam.</i>	lign.	frig.
— <i>Rapa</i>	<i>L.</i>	bien.	s. d.	— <i>spicata</i>	<i>R. et Pav.</i>	lign.	frig.
<i>Brexia spinosa</i>	<i>Lindl.</i>	lign.	cal.	<i>Buffonia annua</i>	<i>DC.</i>	ann.	s. d.
<i>Briza geniculata</i>	<i>Thunb.</i>	ann.	s. d.	<i>Buginvillea rubicunda</i>	<i>Hrt.</i>	lign.	tep.
— <i>maxima</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	<i>Bulbine annua</i>	<i>W.</i>	ann.	s. d.
— <i>media</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>floribunda</i>	<i>Schrad.</i>	ann.	s. d.
— <i>minor</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>frutescens</i>	<i>W.</i>	per.	frig.
<i>Brodiaea grandiflora</i>	<i>Sm.</i>	per.	cal.	— <i>longiscapa</i>	<i>W.</i>	per.	frig.
<i>Bromelia Karatas</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.	— <i>semibarbata</i>	<i>Spr.</i>	per.	frig.
<i>Bromus Alopecuroides</i>	<i>Vahl</i>	ann.	s. d.	<i>Bulbocodium vernum</i>	<i>L.</i>	per.	frig.
— <i>angustifolius</i>	<i>Horn.</i>	per.	s. d.	<i>Bumelia lycioides</i>	<i>W.</i>	lign.	s. d.
— <i>arvensis</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>tenax</i>	<i>W.</i>	lign.	s. d.
— <i>brachystachys</i>	<i>Fsch.</i>	ann.	s. d.	<i>Bunchosia glandulifera</i>	<i>Hmb.</i>	lign.	cal.
— <i>caucasicus</i>	<i>Fisch.</i>	per.	s. d.	<i>Bunias aspera</i>	<i>Retz.</i>	ann.	s. d.
— <i>confertus</i>	<i>Bieb.</i>	ann.	s. d.	— <i>cristata</i>	<i>Desv.</i>	ann.	s. d.
— <i>divaricatus</i>	<i>Rhode</i>	per.	s. d.	— <i>Erucago</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>erectus</i>	<i>Huds.</i>	per.	sp.	— <i>macroptera</i>	<i>Reichb.</i>	ann.	s. d.
— <i>hirsutissimus</i>	<i>Cyrrill.</i>	per.	s. d.	— <i>orientalis</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>lanceolatus</i>	<i>Roth</i>	ann.	s. d.	<i>Bunium acaule</i>	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.
— <i>madritensis</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>virescens</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.
				<i>Buphtalmum salicifolium</i>	<i>L.</i>	per.	sp.

<i>Bupleurum aristatum</i> <i>Bartl.</i>	per.	sp.	<i>Calandrinia curvifolia</i> <i>H. Kil.</i>	ann.	s. d.
— <i>aureum</i> <i>Fisch.</i>	bien.	s. d.	— <i>discolor</i> <i>Schrad.</i>	lign.	tep.
— <i>coriaceum</i> <i>Ait.</i>	lign.	frig.	— <i>elegans</i> <i>Lindl.</i>	ann.	s. d.
— <i>falcatum</i> <i>L.</i>	per.	sp.	— <i>glauca</i> <i>Schrad.</i>	lign.	tep.
— <i>Gerardi</i> <i>Jacq.</i>	ann.	sp.	— <i>grandiflora</i> <i>Lindl.</i>	lign.	tep.
— <i>gracile</i> <i>Bieb.</i>	ann.	s. d.	— <i>micrantha</i> <i>Schlecht.</i>	ann.	s. d.
— <i>heterophyllum</i> <i>Link.</i>	ann.	s. d.	— <i>monandra</i> <i>Lindl.</i>	ann.	s. d.
— <i>rotundifolium</i> <i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>pilosiuscula</i> <i>DC.</i>	ann.	s. d.
— <i>sibiricum</i> <i>Fisch.</i>	ann.	s. d.	— <i>procumbens</i> <i>Moris</i>	ann.	s. d.
— <i>stellatum</i> <i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>sericea</i> <i>Hook.</i>	per.	tep.
— <i>subovatum</i> <i>Link.</i>	ann.	s. d.	— <i>speciosa</i> <i>Lindl.</i>	lign.	tep.
— <i>tenuissimum</i> <i>L.</i>	ann.	sp.	<i>Calathea bicolor</i> <i>Steud.</i>	per.	cal.
— <i>trifidum</i> <i>Tenor.</i>	per.	s. d.	— <i>Cassupito</i> <i>Mey.</i>	per.	cal.
<i>Burchellia capensis</i> <i>R. Br.</i>	lign.	frig.	— <i>zebrina</i> <i>Lindl.</i>	per.	cal.
<i>Butomus umbellatus</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Calceolaria arachnoidea</i>		
<i>Buttneria pannosa</i> <i>DC.</i>	lign.	frig.	— <i>Grah.</i>	per.	tep.
<i>Buxus balearica</i> <i>Lam.</i>	lign.	s. d.	— <i>bicolor</i> <i>R. et Pav.</i>	lign.	tep.
— <i>sempervirens</i> <i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>crenatiflora</i> <i>Cav.</i>	per.	tep.
— <i>arborescens</i> <i>Lam.</i>	lign.	s. d.	— <i>excelsa</i> <i>Grah.</i>	lign.	tep.
<i>Cacalia atriplicifolia</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>pinnata</i> <i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>gigantea</i> <i>Jacq. f.</i>	per.	s. d.	— <i>rugosa</i> <i>R. et Pav.</i>	lign.	tep.
— <i>suaveolens</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>sanguinea</i> <i>Hort.</i>	lign.	tep.
<i>Caccinia glauca</i> <i>Savi.</i>	per.	s. d.	— <i>scabiosaefolia</i> <i>Sims</i>	bien.	
<i>Cachrys Libanotis</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Calendula aegyptiaca</i> <i>Desf.</i>	ann.	s. d.
— <i>odontalgica</i> <i>Pall.</i>	per.	s. d.	— <i>arragonica</i> <i>Fisch.</i>	ann.	s. d.
<i>Cadia purpurea</i> <i>Forsk.</i>	lign.	cal.	— <i>arvensis</i> <i>L.</i>	ann.	sp.
<i>Caesalpinia brasiliensis</i> <i>L.</i>	lign.	tep.	— <i>gracilis</i> <i>DC.</i>	ann.	s. d.
— <i>Crista</i> <i>L.</i>	lign.	tep.	— <i>incana</i> <i>W.</i>	ann.	s. d.
— <i>macrantha</i> <i>Delil.</i>	lign.	tep.	— <i>maritima</i> <i>Guss.</i>	ann.	s. d.
— <i>Sappan</i> <i>L.</i>	lign.	cal.	— <i>officinalis</i> <i>L.</i>	per.	s. d.
<i>Cajanus indicus</i> <i>Spr.</i>	lign.	cal.	— <i>sancta</i> <i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>bicolor</i> <i>Wall.</i>	lign.	cal.	— <i>sicula</i> <i>Cyrill.</i>	ann.	s. d.
<i>Cajophora lateritia</i> <i>Klotz</i>	per.	cal.	— <i>speciosa</i> <i>H. Cracov.</i>	ann.	s. d.
<i>Cakile maritima</i> <i>Scop.</i>	ann.	s. d.	— <i>stellata</i> <i>Cav.</i>	ann.	s. d.
<i>Caladium auritum</i> <i>Vent.</i>	lign.	cal.	<i>Calepina Corvini</i> <i>Desv.</i>	ann.	sp.
— <i>bicolor</i> <i>Vent.</i>	per.	cal.	<i>Calimeris altaica</i> <i>Nees</i>	per.	s. d.
— <i>esculentum</i> <i>Vent.</i>	per.	cal.	— <i>incisa</i> <i>DC.</i>	per.	s. d.
— <i>odoratum</i> <i>Roxb.</i>	per.	cal.	<i>Calla Dracontium</i> <i>Mey.</i>	per.	cal.
— <i>peltatum</i> <i>H. Lovan.</i>	per.	cal.	<i>Callicarpa americana</i> <i>L.</i>	lign.	frig.
— <i>sagittaeifolium</i> <i>Vent.</i>	per.	cal.	— <i>cana</i> <i>L.</i>	lign.	frig.
— <i>seguinum</i> <i>Vent.</i>	per.	cal.	<i>Callichroa platyglossa</i> <i>F. M.</i>	ann.	s. d.
— <i>viviparum</i> <i>Roxb.</i>	per.	cal.	<i>Callicoma serratifolia</i> <i>R. Br.</i>	lign.	frig.
— <i>xanthorrhizum</i> <i>W.</i>	lign.	cal.	<i>Calliglossa Douglasii</i> <i>Hook</i>	ann.	s. d.
<i>Calamagrostis Epigejos</i> <i>Rth.</i>	per.	sp.	<i>Calliopsis Atkinsoniana</i> <i>Hk.</i>	per.	s. d.
— <i>lanceolata</i> <i>Roth.</i>	per.	s. d.	— <i>bicolor</i> <i>Reichb.</i>	ann.	s. d.
— <i>purpurea</i> <i>Trin.</i>	per.	s. d.	— <i>atropurpurea</i> <i>Ht.</i>	ann.	s. d.
— <i>— Langsdorffii</i> <i>Spr.</i>	per.	s. d.	— <i>tubulosa</i> <i>Hort.</i>	ann.	s. d.
— <i>varia</i> <i>Trin.</i>	per.	s. d.	<i>Callipeltis Cucullaria</i> <i>Stev.</i>	ann.	s. d.
<i>Calanchoe aegyptiaca</i> <i>DC.</i>	per.	tep.	<i>Callistachys lanceolata</i> <i>Vnt.</i>	lign.	frig.
— <i>coccinea</i> <i>H. Berol.</i>	lign.	cal.	— <i>longifolia</i> <i>H. Hügel</i>	lign.	frig.
— <i>crenata</i> <i>Haw.</i>	lign.	cal.	— <i>ovata</i> <i>Sims</i>	lign.	frig.
— <i>laciniata</i> <i>DC.</i>	lign.	cal.	— <i>retusa</i> <i>Lodd.</i>	lign.	frig.
— <i>pinnata</i> <i>Pers.</i>	lign.	cal.	<i>Callistemon lanceolatum</i>		
<i>Calandrinia angulata</i> <i>H. Lov.</i>	ann.	s. d.	— <i>DC.</i>	lign.	frig.
— <i>compressa</i> <i>Schrad.</i>	ann.	s. d.	— <i>lanuginos.</i> <i>H. Graec.</i>	lign.	frig.
			— <i>lineare</i> <i>DC.</i>	lign.	frig.

Callistemon lophanthum Swt.	lign.	frig.	Campanula rhomboidea L.	per.	s. d.
— rigidum R. Br.	lign.	frig.	— rotundifolia L.	per.	sp.
— — viminalis G. Don	lign.	frig.	— sarmatica Ker	per.	s. d.
— rugulosum DC.	lign.	frig.	— saxifraga Bieb.	per.	s. d.
— salignum DC.	lign.	frig.	— sibirica L.	bien.	sp.
— viridiflorum DC.	lign.	frig.	— — iberica	bien.	s. d.
Calistephus chinensis Nees	ann.	s. d.	— spathulata Sibth.	per.	s. d.
Callitriche autumnalis L.	ann.	sp.	— Steveni Bieb.	per.	s. d.
— verna L.	ann.	sp.	— Trachelium L.	per.	sp.
Callitris australis Sweet	lign.	frig.	— — articaefolia Sch-		
Calluna vulgaris Salisb.	lign.	sp.	midt	per.	s. d.
Calodendrum capense Thunb.	lign.	tep.	— versicolor Sibth.	per.	s. d.
Calothamnus quadrifida R.			Camphora officinalis Nees	lign.	frig.
— — Br.	lign.	frig.	Camphorosma monspeliaca		
— sanguinea Labill.	lign.	frig.	L.	lign.	s. d.
— villosa R. Br.	lign.	frig.	Canarina Campanula L. fil.	per.	frig.
Caltha palustris L.	per.	sp.	Canavalia ensiformis DC.	ann.	s. d.
Calycanthus floridus L.	lign.	s. d.	— virosa Wight	bien.	cal.
— glaucus W.	lign.	s. d.	Candollea cuneiformis Labill.	lign.	frig.
— laevigatus W.	lign.	s. d.	Canna aurantiaca Rosc.	per.	tep.
Calytrix virgata Hook.	lign.	s. d.	— brasiliensis Rosc.	per.	tep.
Camelina dentata Pers.	ann.	s. d.	— coccinea Ait.	per.	tep.
— macrocarpa Wrzb.	ann.	s. d.	— flaccida Rosc.	per.	tep.
— sativa Crantz	ann.	sp.	— gigantea Desf.	per.	tep.
Camellia japonica L.	lign.	fr. et	— glauca L.	per.	tep.
— — variet. plurim.	lign.	s. d.	— heliconiaefolia Lk.	per.	tep.
— Kissi Wall.	lign.	frig.	— humilis Bouch.	per.	tep.
— oleifera Abel.	lign.	frig.	— indica L.	per.	tep.
— reticulata Lindl.	lign.	frig.	— iridiflora R. et Pav.	per.	tep.
— Sasanqua Thunb.	lign.	frig.	— lagunensis Lindl.	per.	tep.
Campanula alpina Jacq.	lign.	frig.	— leptochila Bouch.	per.	tep.
— altaica DC. f.	lign.	frig.	— limbata Rosc.	per.	tep.
— americana L.	lign.	frig.	— lutea Ait.	per.	tep.
— bononiensis L.	lign.	frig.	— occidentalis Rosc.	per.	tep.
— caespitosa Scop.	per.	sp.	— patens Rosc.	per.	tep.
— Cymbalaria Sibth.	per.	s. d.	— pedunculata Sims	per.	tep.
— divergens W.	bien.	s. d.	— Sellowii Lk.	per.	tep.
— Erinus L.	ann.	s. d.	— Smithii Hort.	per.	tep.
— eximia Wender.	per.	s. d.	— speciosa Rosc.	per.	tep.
— foliosa Tenor.	per.	s. d.	— tenuiflora Bouch.	per.	tep.
— glomerata L.	per.	sp.	— variegata Bouch.	per.	tep.
— Grosseckii Heuff.	per.	s. d.	— vittata H. Bervol.	per.	tep.
— illinoensis Fresen.	per.	s. d.	Cannabis sativa L.	ann.	s. d.
— lactiflora Bieb.	per.	s. d.	Capnophyllum africanum		
— lamifolia Bieb.	per.	s. d.	Gärtn.	ann.	s. d.
— latifolia L.	per.	s. d.	Capparis frondosa L.	lign.	cal.
— lingulata Waldst. Kit.	per.	s. d.	— herbacea W.	per.	frig.
— limifolia Lam.	per.	s. d.	— rupestris Sibth.	lign.	sp.
— Locellinii Brot.	ann.	s. d.	— saligna Fahl.	lign.	cal.
— Lorei Pollin.	ann.	s. d.	— spinosa L.	lign.	s. d.
— multiflora W. Kit.	bien.	s. d.	— tenuisiliqua Jacq.	lign.	cal.
— persicifolia L.	per.	sp.	Capraria biflora L.	per.	tep.
— pulcherrima Schrd.	per.	s. d.	— salicifolia Lk.	lign.	frig.
— pyramidalis L.	per.	sp.	Capella Bursa pastoris		
— rapunculoides L.	per.	sp.	Moench	ann.	sp.
— Rapunculus L.	bien.	sp.	— procumbens Fries	ann.	sp.

Capsicum <i>annuum</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	Carex <i>glauca</i>	<i>Scop.</i>	per.	sp.
— <i>baccatum</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.	— <i>hirta</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>dulce</i> <i>H. Monsp.</i>		ann.	s. d.	— — <i>hirtaeformis</i> <i>Pers.</i>		per.	sp.
— <i>frutescens</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.	— <i>lagopodioides</i> <i>Shkr.</i>		per.	s. d.
— <i>pendulum</i>	<i>W.</i>	lign.	cal.	— <i>leiorrhyncha</i> <i>C.A.M.</i>		per.	s. d.
— <i>sinense</i> <i>Jacq.</i>		lign.	cal.	— <i>leporina</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>subcerasiforme</i> <i>H.</i>				— <i>limosa</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— — <i>Monsp.</i>		lign.	cal.	— <i>maxima</i>	<i>Scop.</i>	per.	sp.
— <i>teretiusculum</i> <i>H. Pis.</i>		ann.	s. d.	— <i>Michellii</i>	<i>Host</i>	per.	sp.
— <i>tomatiforme</i> <i>Finger.</i>		bien.	frig.	— <i>montana</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>Tournefortii</i> <i>Bess.</i>		ann.	s. d.	— <i>multiflora</i>	<i>Muhl.</i>	per.	s. d.
— <i>violaceum</i> <i>Humb.</i>		lign.	cal.	— <i>muricata</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>zeylanicum</i> <i>H. Hal.</i>		ann.	s. d.	— <i>nubigena</i>	<i>Don</i>	per.	frig.
Caragana <i>arborescens</i> <i>Lam.</i>		lign.	s. d.	— <i>ornithopoda</i>	<i>W.</i>	per.	sp.
— <i>Chamlagu</i> <i>Lam.</i>		lign.	s. d.	— <i>pallescens</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>frutescens</i>	<i>DC.</i>	lign.	s. d.	— <i>paludosa</i>	<i>Good.</i>	per.	sp.
— <i>jubata</i>	<i>Poir.</i>	lign.	s. d.	— <i>panicea</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>microphylla</i>	<i>DC.</i>	lign.	s. d.	— <i>paniculata</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>mollis</i>	<i>Spr.</i>	lign.	s. d.	— <i>pilulifera</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>pygmaea</i>	<i>DC.</i>	lign.	s. d.	— <i>praecox</i>	<i>Schreb.</i>	per.	sp.
— <i>Redowskii</i> <i>Fisch.</i>		lign.	s. d.	— <i>punctata</i>	<i>Gaud.</i>	per.	s. d.
— <i>spinosa</i>	<i>DC.</i>	lign.	s. d.	— <i>remota</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
Cardamine <i>amara</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>retroflexa</i>	<i>Schkr.</i>	per.	s. d.
— <i>Engelmanniana</i> <i>H.</i>				— <i>riparia</i>	<i>Good.</i>	per.	sp.
— — <i>Berol.</i>		ann.	s. d.	— <i>rostrata</i>	<i>Muhl.</i>	per.	s. d.
— <i>hirsuta</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>stellulata</i>	<i>Good.</i>	per.	sp.
— <i>impatiens</i>	<i>L.</i>	bien.	sp.	— <i>straminea</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.
— <i>pratensis</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>stricta</i>	<i>Good.</i>	per.	sp.
— <i>trifolia</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>tomentosa</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
Cardiospermum <i>Corindum</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>umbrosa</i>	<i>Host</i>	per.	sp.
— <i>Halicacabum</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>verna</i>	<i>Vill.</i>	per.	sp.
— <i>molle</i> <i>Humb.</i>		ann.	s. d.	— <i>vesicaria</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
Carduncellus <i>coeruleus</i> <i>DC.</i>		per.	s. d.	— <i>vulpina</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
Carduus <i>acanthoides</i> <i>L.</i>		ann.	sp.	Carica <i>citrifomis</i> <i>Jacq. fil.</i>		lign.	cal.
— <i>crispus</i>	<i>L.</i>	bien.	sp.	— <i>Papaya</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.
— <i>defloratus</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	Carlina <i>acaulis</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>glaucus</i> <i>Ledeb.</i>		per.	s. d.	— <i>Biebersteiniana</i> <i>Hrn.</i>		per.	s. d.
— <i>nutans</i>	<i>L.</i>	bien.	sp.	— <i>corymbosa</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>tenuiflorus</i>	<i>Curt.</i>	bien.	sp.	— <i>lanata</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>uncinatus</i>	<i>Bieb.</i>	bien.	s. d.	— <i>nebrodensis</i>	<i>Guss.</i>	per.	s. d.
Carex <i>acuta</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>salicifolia</i>	<i>Less.</i>	lign.	tep.
— <i>ampullacea</i> <i>Good.</i>		per.	sp.	— <i>vulgaris</i>	<i>L.</i>	bien.	sp.
— <i>aristata</i> <i>Schwein.</i>		per.	s. d.	Carmichaelia <i>australis</i> <i>R. B.</i>		lign.	frig.
— <i>atrata</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	Carolinea <i>insignis</i> <i>Sw.</i>		lign.	cal.
— <i>brizoides</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	Carpesium <i>cernuum</i> <i>L.</i>		per.	sp.
— <i>caespitosa</i>	<i>Good.</i>	per.	sp.	Carpinus <i>americana</i> <i>Michx.</i>		lign.	s. d.
— <i>cristata</i> <i>Schwein.</i>		per.	s. d.	— <i>Betulus</i>	<i>L.</i>	lign.	sp.
— <i>digitata</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>orientalis</i>	<i>Lam.</i>	lign.	sp.
— <i>distans</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	Carthamus <i>tinctorius</i> <i>L.</i>		ann.	s. d.
— <i>divisa</i> <i>Huds.</i>		per.	sp.	Carum <i>burjacticum</i> <i>Turtsch.</i>		bien.	s. d.
— <i>divulsa</i>	<i>Good.</i>	per.	s. d.	— <i>Carvi</i>	<i>L.</i>	bien.	sp.
— <i>Eckloni</i>	<i>Nees</i>	per.	tep.	Carya <i>alba</i>	<i>Nutt.</i>	lign.	s. d.
— <i>elongata</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>amara</i>	<i>Nutt.</i>	lign.	s. d.
— <i>extensa</i>	<i>Good.</i>	per.	s. d.	— <i>olivaeformis</i>	<i>Nutt.</i>	lign.	s. d.
— <i>flava</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	Cassia <i>Absus</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
				— <i>angustifolia</i> <i>Vahl</i>		lign.	cal.

<i>Cassia Apouconita</i>	<i>Aubl.</i>	lign.	cal.	<i>Celtis occidentalis</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>arborescens</i>	<i>Mill.</i>	lign.	cal.	— <i>Tournefortii</i>	<i>Lam.</i>	lign.	s. d.
— <i>Barclayana</i>	<i>Sweet</i>	lign.	cal.	<i>Cenchrus echinatus</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>bicapsularis</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.	— <i>pungens</i>	<i>Humb.</i>	ann.	s. d.
— <i>biflora</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.	— <i>spinifex</i>	<i>Cav.</i>	ann.	s. d.
— <i>Chamaecrista</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	<i>Cenia discoidea</i>	<i>Less.</i>	ann.	s. d.
— <i>corymbosa</i>	<i>Lam.</i>	lign.	frig.	<i>Centaurea Adami</i>	<i>W.</i>	ann.	s. d.
— <i>Fistula</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.	— <i>africana</i>	<i>Lam.</i>	per.	s. d.
— <i>Flindersii</i>	<i>H. Monsp.</i>	lign.	cal.	— <i>alata</i>	<i>Lam.</i>	per.	s. d.
— <i>floribunda</i>	<i>Cav.</i>	lign.	cal.	— <i>alba</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>glauca</i>	<i>Lam.</i>	lign.	cal.	— <i>alpina</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>laevigata</i>	<i>W.</i>	lign.	cal.	— <i>anara</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>lanceolata</i>	<i>Forsk.</i>	lign.	cal.	— <i>americana</i>	<i>Nutt.</i>	ann.	s. d.
— <i>marylandica</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>amoena</i>	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.
— <i>nictitans</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>apula</i>	<i>Lam.</i>	ann.	s. d.
— <i>occidentalis</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.	— <i>arenaria</i>	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.
— <i>Sophora</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.	— <i>aurea</i>	<i>Ait.</i>	per.	s. d.
— <i>tomentosa</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.	— <i>austriaca</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.
<i>Cassine Maurocenia</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.	— <i>axillaris</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.
<i>Castanea sativa</i>	<i>Mill.</i>	lign.	sp.	— <i>Biebersteinii</i>	<i>DC.</i>	ann.	s. d.
<i>Casuarina equisetifolia</i>	<i>Frst.</i>	lign.	frig.	— <i>caeleolepis</i>	<i>F. et M.</i>	per.	s. d.
— <i>stricta</i>	<i>Ait.</i>	lign.	frig.	— <i>Calcitrapa</i>	<i>L.</i>	bien.	sp.
— <i>torulosa</i>	<i>Ait.</i>	bien.	frig.	— <i>calocephala</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.
<i>Catabrosa scabra</i>	<i>Kunth</i>	per.	s. d.	— <i>capillata</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
<i>Catalpa syringefolia</i>	<i>Sims</i>	lign.	s. d.	— <i>carniolica</i>	<i>Host</i>	per.	s. d.
<i>Catananche coerulea</i>	<i>L.</i>	bien.	frig.	— <i>chinensis</i>	<i>H. Cracov.</i>	per.	s. d.
— <i>bicolor</i>	<i>Hort.</i>	bien.	frig.	— <i>cinerea</i>	<i>Lam.</i>	per.	s. d.
— <i>lutea</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>collina</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
<i>Cattleja Forbesii</i>	<i>Lindl.</i>	per.	cal.	— <i>coronopifolia</i>	<i>Lam.</i>	per.	s. d.
<i>Caucalis daucoides</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>cristata</i>	<i>Bartl.</i>	bien.	s. d.
<i>Ceanothus africanus</i>	<i>L.</i>	lign.	tep.	— <i>Cyanus</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>americanus</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>diluta</i>	<i>Ait.</i>	per.	s. d.
— <i>azureus</i>	<i>Desf.</i>	lign.	frig.	— <i>eriophora</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>intermedius</i>	<i>Pursh</i>	lign.	s. d.	— <i>fuscata</i>	<i>Desf.</i>	per.	s. d.
— <i>ovatus</i>	<i>Desf.</i>	lign.	s. d.	— <i>gymnocarpa</i>	<i>Mor.</i>	per.	s. d.
<i>Cecropia argentea</i>	<i>Vis.</i>	lign.	cal.	— <i>Hosteana</i>	<i>H. Prag.</i>	per.	s. d.
— <i>palmata</i>	<i>W.</i>	lign.	cal.	— <i>Jacea</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
<i>Cedrela odorata</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.	— <i>intybacea</i>	<i>Lam.</i>	per.	s. d.
<i>Celastrus buxifolius</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.	— <i>lappacea</i>	<i>Tenor.</i>	ann.	s. d.
— <i>lucidus</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.	— <i>latisquama</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.
— <i>pyracanthus</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.	— <i>macrocephala</i>	<i>Muss.</i>	per.	s. d.
— <i>scandens</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>maculosa</i>	<i>Lam.</i>	per.	s. d.
<i>Celosia argentea</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>melitensis</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>coccinea</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>montana</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>comosa</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>Morisiana</i>	<i>H. Prag.</i>	per.	s. d.
— <i>cristata</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>napiifolia</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>purpurea</i>	<i>Hort.</i>	ann.	s. d.	— <i>nervosa</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.
— <i>margaritacea</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>nigrescens</i>	<i>W.</i>	per.	sp.
— <i>paniculata</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>nitens</i>	<i>Bieb.</i>	ann.	s. d.
— <i>trigyna</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>orientalis</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
<i>Celsia Arcturus</i>	<i>L.</i>	bien.	s. d.	— <i>ovina</i>	<i>Pall.</i>	per.	s. d.
— <i>orientalis</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>paniculata</i>	<i>L.</i>	bien.	sp.
— <i>sinuata</i>	<i>Tenor.</i>	per.	s. d.	— <i>pectinata</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
<i>Celtis aspera</i>	<i>Desf.</i>	lign.	s. d.	— <i>phrygia</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>australis</i>	<i>L.</i>	lign.	sp.	— <i>bannatica</i>	<i>H. Psth.</i>	per.	s. d.
— <i>grandidentata</i>	<i>H. P.</i>	lign.	s. d.	— <i>pullata</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.

<i>Centaurea ragusina</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	<i>Cerastium Scarani</i>	<i>Tenor.</i>	per.	s. d.
— <i>reflexa</i>	<i>Lam.</i>	per.	s. d.	— <i>semidecandrum</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>rigescens</i>	<i>Horn.</i>	per.	s. d.	— <i>sylvaticum</i>	<i>W. K.</i>	per.	s. d.
— <i>romana</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>tomentosum</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.
— <i>rupestris</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>viscosum</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>adonidifolia</i>	<i>Rhb.</i>	per.	s. d.	— <i>vulgatum</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>salonitana</i>	<i>Vis.</i>	per.	s. d.	— <i>glomeratum</i>	<i>Thl.</i>	ann.	sp.
— <i>Scabiosa</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	<i>Ceratonia Siliqua</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.
— <i>— badensis</i>	<i>Tratt.</i>	per.	s. d.	<i>Ceratophyllum demersum</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>— coriacea</i>	<i>W. K.</i>	per.	s. d.	<i>Cerbera Ahovai</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.
— <i>— italica</i>	<i>Lam.</i>	per.	s. d.	— <i>Odallam</i>	<i>Hamilt.</i>	lign.	cal.
— <i>Seridis</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>Thevetia</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.
— <i>serotina</i>	<i>H. Prag.</i>	per.	s. d.	<i>Cercis canadensis</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>sicula</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>Siliquastrum</i>	<i>L.</i>	lign.	sp.
— <i>solstitialis</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	<i>Cercodia erecta</i>	<i>Murr.</i>	lign.	frig.
— <i>sonchifolia</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Cereus albispinus</i>	<i>Salm.</i>	lign.	tep.
— <i>sordida</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.	— <i>articulatus</i>	<i>Pfeiff.</i>	lign.	tep.
— <i>spinosa</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.	— <i>baxaniensis</i>	<i>Karw.</i>	lign.	tep.
— <i>spinulosa</i>	<i>Roch.</i>	per.	s. d.	— <i>Bonplandii</i>	<i>Prment.</i>	lign.	tep.
— <i>splendens</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>candicans</i>	<i>Gill.</i>	lign.	tep.
— <i>stereophylla</i>	<i>Bess.</i>	per.	s. d.	— <i>chalybaeus</i>	<i>Otto</i>	lign.	tep.
— <i>Stoebe</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>chiloensis</i>	<i>DC.</i>	lign.	tep.
— <i>sulphurea</i>	<i>W.</i>	ann.	s. d.	— <i>cinerascens</i>	<i>DC.</i>	lign.	tep.
— <i>tatarica</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>coccineus</i>	<i>Salm.</i>	lign.	tep.
— <i>tuberosa</i>	<i>Vis.</i>	per.	s. d.	— <i>coerulescens</i>	<i>Salm.</i>	lign.	tep.
— <i>Verutum</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>divaricatus</i>	<i>DC.</i>	lign.	tep.
<i>Centranthus angustifol.</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.	— <i>Dyckii</i>	<i>Mart.</i>	lign.	tep.
— <i>Calcitrapa</i>	<i>Dufr.</i>	ann.	s. d.	— <i>eburneus</i>	<i>Salm.</i>	lign.	tep.
— <i>ruber</i>	<i>DC.</i>	per.	sp.	— <i>Ehrenbergii</i>	<i>Hort.</i>	lign.	tep.
<i>Centratherum intermedium</i>	<i>Less.</i>	ann.	s. d.	— <i>erectus</i>	<i>Karw.</i>	lign.	tep.
<i>Centropogon surinamensis</i>	<i>Presl.</i>	lign.	cal.	— <i>eriphorus</i>	<i>H. Berol.</i>	lign.	tep.
<i>Cephalanthera ensifolia</i>	<i>Rich.</i>	per.	sp.	— <i>extensus</i>	<i>Salm.</i>	lign.	tep.
— <i>pallens</i>	<i>Rich.</i>	per.	sp.	— <i>Eryesii</i>	<i>H. Berol.</i>	lign.	tep.
— <i>rubra</i>	<i>Rich.</i>	per.	sp.	— <i>flagelliformis</i>	<i>Mill.</i>	lign.	tep.
<i>Cephalanthus occidentalis</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>flagriformis</i>	<i>Zuccar.</i>	lign.	tep.
<i>Cephalophora aromatica</i>	<i>Schrad.</i>	ann.	s. d.	— <i>flavispinus</i>	<i>Haw.</i>	lign.	tep.
<i>Cerastium alpinum</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>fulvispinus</i>	<i>Haw.</i>	lign.	tep.
— <i>arvense</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>grandiflorus</i>	<i>Mill.</i>	lign.	tep.
— <i>brachypetalum</i>	<i>Pers.</i>	ann.	s. d.	— <i>grandis</i>	<i>Haw.</i>	lign.	tep.
— <i>campanulatum</i>	<i>Fiv.</i>	ann.	sp.	— <i>Dickianus</i>	<i>Hort.</i>	lign.	tep.
— <i>chloraefolium</i>	<i>F. M.</i>	ann.	s. d.	— <i>Haworthii</i>	<i>DC.</i>	lign.	tep.
— <i>dichotomum</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>hexagonus</i>	<i>Haw.</i>	lign.	tep.
— <i>— glandulosum</i>	<i>Hrt.</i>	ann.	s. d.	— <i>— minor</i>	<i>Hort.</i>	lign.	tep.
— <i>distichum</i>	<i>H. Drpat.</i>	ann.	s. d.	— <i>— octogonus</i>	<i>Hort.</i>	lign.	tep.
— <i>frigidum</i>	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.	— <i>Hookeri</i>	<i>H. Berol.</i>	lign.	tep.
— <i>grandiflorum</i>	<i>W. K.</i>	per.	s. d.	— <i>humilis</i>	<i>DC.</i>	lign.	tep.
— <i>incanum</i>	<i>Ledeb.</i>	per.	s. d.	— <i>— gracilis</i>	<i>Salm.</i>	lign.	tep.
— <i>macrocarpum</i>	<i>Stev.</i>	per.	s. d.	— <i>Hystrix</i>	<i>Salm.</i>	lign.	tep.
— <i>multiflorum</i>	<i>C. A. M.</i>	ann.	s. d.	— <i>Jamacaru</i>	<i>Salm.</i>	lign.	tep.
— <i>pensylvanicum</i>	<i>Hrn.</i>	per.	s. d.	— <i>laetus</i>	<i>DC.</i>	lign.	tep.
— <i>perfoliatum</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>lanuginosus</i>	<i>Haw.</i>	lign.	tep.
				— <i>latifrons</i>	<i>Zuccar.</i>	lign.	tep.
				— <i>leptophis</i>	<i>DC.</i>	lign.	tep.
				— <i>marginatus</i>	<i>DC.</i>	lign.	tep.
				— <i>Martianus</i>	<i>Zuccar.</i>	lign.	tep.

<i>Cereus multangularis</i> <i>Haw.</i>	lign.	tep.	<i>Cereus variabilis</i> <i>Pfeiff.</i>	lign.	tep.
— <i>multiplex</i> <i>H. Berol.</i>	lign.	tep.	<i>Cerinthe Kitaibeli</i> <i>H. Paris</i>	ann.	s. d.
— <i>monstrosus</i>	lign.	tep.	— <i>major</i> <i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>Napoleonis</i> <i>Grah.</i>	lign.	tep.	— <i>minor</i> <i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>niger</i> <i>Salm.</i>	lign.	tep.	<i>Ceropegia dichotoma</i> <i>Haw.</i>	lign.	cal.
— <i>nycticalus</i> <i>Lk.</i>	lign.	tep.	— <i>elegans</i> <i>Hook.</i>	per.	cal.
— <i>obtus</i> <i>Haw.</i>	lign.	tep.	<i>Cestrum cauliflorum</i> <i>Jacq.</i>	lign.	cal.
— <i>Olfersii</i> <i>Salm.</i>	lign.	tep.	— <i>dinrnum</i> <i>L.</i>	lign.	cal.
— <i>ovatus</i> <i>G. Don</i>	lign.	tep.	— <i>fastigiatum</i> <i>Jacq.</i>	lign.	cal.
— <i>oxygonus</i> <i>Lk.</i>	lign.	tep.	— <i>foetidissimum</i> <i>Jacq.</i>	lign.	cal.
— <i>oxypetalus</i> <i>DC.</i>	lign.	tep.	— <i>foetidum</i> <i>Medic.</i>	lign.	cal.
— <i>pellucidus</i> <i>H. Berol.</i>	lign.	tep.	— <i>laurifolium</i> <i>Herit.</i>	lign.	cal.
— <i>pentagonus</i> <i>Haw.</i>	lign.	tep.	— <i>nocturnum</i> <i>L.</i>	lign.	cal.
— <i>pentalophus</i> <i>DC.</i>	lign.	tep.	— <i>Parqui</i> <i>L.</i>	lign.	frig.
— <i>leptacanthus</i> <i>DC.</i>	lign.	tep.	— <i>pendulinum</i> <i>Jacq.</i>	lign.	cal.
— <i>propinquus</i> <i>DC.</i>	lign.	tep.	— <i>salicifolium</i> <i>Jacq.</i>	lign.	cal.
— <i>peruvianus</i> <i>Haw.</i>	lign.	tep.	<i>Chaenostoma hispidum</i>		
— <i>abnormis</i> <i>Sweet</i>	lign.	tep.	— <i>Benth.</i>	lign.	tep.
— <i>phyllanthoides</i> <i>DC.</i>	lign.	tep.	<i>Chaerophyllum aromaticum</i>		
— <i>Phyllanthus</i> <i>DC.</i>	lign.	tep.	— <i>Jacq.</i>	per.	s. d.
— <i>prismaticus</i> <i>Salm.</i>	lign.	tep.	— <i>temulum</i> <i>L.</i>	bien.	sp.
— <i>ramosus</i> <i>Karw.</i>	lign.	tep.	<i>Chaeturus fasciculatus</i> <i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>repandus</i> <i>Haw.</i>	lign.	tep.	<i>Chamaedorea Schiedeana</i>		
— <i>rostratus</i> <i>Lemair.</i>	lign.	tep.	— <i>Mart.</i>	lign.	cal.
— <i>Royeni</i> <i>Haw.</i>	lign.	tep.	<i>Chamaepeuce afra</i> <i>DC.</i>	bien.	frig.
— <i>Salmianus</i> <i>Steud.</i>	lign.	tep.	— <i>Casabonae</i> <i>DC.</i>	bien.	s. d.
— <i>Schelhasii</i> <i>Pfeiff.</i>	lign.	tep.	— <i>diacantha</i> <i>DC.</i>	bien.	frig.
— <i>Schottii</i> <i>Hornem.</i>	lign.	tep.	— <i>stellata</i> <i>DC.</i>	ann.	s. d.
— <i>Schrankii</i> <i>Zuccar.</i>	lign.	tep.	<i>Chamaerops humilis</i> <i>L.</i>	lign.	frig.
— <i>senilis</i> <i>Salm.</i>	lign.	tep.	— <i>arborescens</i> <i>Pers.</i>	lign.	frig.
— <i>serpentinus</i> <i>Lag.</i>	lign.	tep.	— <i>Palmetto</i> <i>Mich.</i>	lign.	cal.
— <i>setaceus</i> <i>Salm.</i>	lign.	tep.	<i>Chamissoa albidia</i> <i>Mart.</i>	ann.	s. d.
— <i>Smithii</i> <i>Pfeiff.</i>	lign.	tep.	<i>Charieis heterophylla</i> <i>Cass.</i>	ann.	s. d.
— <i>speciosissimus</i> <i>DC.</i>	lign.	tep.	— <i>coerulea</i> <i>Cass.</i>	ann.	s. d.
— <i>Boydii</i> <i>Hort.</i>	lign.	tep.	<i>Cheiranthus aurantiacus</i>		
— <i>Casoretti</i> <i>Tglab.</i>	lign.	tep.	— <i>Bunge</i>	per.	s. d.
— <i>coruscans</i> <i>Hort.</i>	lign.	tep.	— <i>Cheiri</i> <i>L.</i>	lign.	frig.
— <i>Eugenia</i> <i>Hort.</i>	lign.	tep.	— <i>mutabilis</i> <i>Herit.</i>	lign.	frig.
— <i>Franciae</i> <i>Csorett.</i>	lign.	tep.	— <i>longifolius</i> <i>Vent.</i>	lign.	frig.
— <i>hybridus</i> <i>H. Ber.</i>	lign.	tep.	— <i>scoparius</i> <i>Brouss.</i>	lign.	s. d.
— <i>ignescens</i> <i>Hort.</i>	lign.	tep.	— <i>viscosus</i> <i>Sieb.</i>	ann.	s. d.
— <i>Mittschinski</i> <i>Hrt.</i>	lign.	tep.	<i>Chelidonium grandiflorum</i>		
— <i>strictus</i> <i>DC.</i>	lign.	tep.	— <i>DC.</i>	per.	s. d.
— <i>strigosus</i> <i>H. Angl.</i>	lign.	tep.	— <i>laciniatum</i> <i>Mill.</i>	per.	s. d.
— <i>sublanatus</i> <i>Salm.</i>	lign.	tep.	— <i>majus</i> <i>L.</i>	per.	sp.
— <i>subrepandus</i> <i>Haw.</i>	lign.	tep.	<i>Chelone barbata</i> <i>Cav.</i>	per.	frig.
— <i>syringacanthus</i> <i>Pff.</i>	lign.	tep.	— <i>glabra</i> <i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>tetragonus</i> <i>Haw.</i>	lign.	tep.	— <i>Lyoni</i> <i>Parsh.</i>	per.	s. d.
— <i>ramosior</i> <i>Hort.</i>	lign.	tep.	— <i>obliqua</i> <i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>triangularis</i> <i>Haw.</i>	lign.	tep.	<i>Chenopodium album</i> <i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>major</i> <i>H. Hamb.</i>	lign.	tep.	— <i>ambrosioides</i> <i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>pictus</i> <i>Hort.</i>	lign.	tep.	— <i>anthelminticum</i> <i>L.</i>	per.	frig.
— <i>triqueter</i> <i>Haw.</i>	lign.	tep.	— <i>aristatum</i> <i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>tubiflorus</i> <i>Pfeiff.</i>	lign.	tep.	— <i>Botrys</i> <i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>turbinatus</i> <i>Pfeiff.</i>	lign.	tep.	— <i>chilense</i> <i>Schrad.</i>	ann.	s. d.
— <i>validus</i> <i>Haw.</i>	lign.	tep.	— <i>foetidum</i> <i>Schrad.</i>	ann.	s. d.

<i>Chenopodium fruticosum</i>				<i>Chrysocoma Coma aurea</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.
— <i>guineense</i>	<i>Jacq.</i>	ann.	s. d.	<i>Chrysophyllum argenteum</i>		lign.	cal.
— <i>hybridum</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>sinense</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	cal.
— <i>multifidum</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.	<i>Chrysopogon Gryllus</i>	<i>Trin.</i>	per.	sp.
— <i>murale</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	<i>Chrysosplenium alternifo-</i>			
— <i>opulifolium</i>	<i>Schrad.</i>	ann.	sp.	— <i>lium</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>polyspermum</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	<i>Chrysostemma Tripteris</i>			
— <i>Quinoa</i>	<i>W.</i>	ann.	s. d.	— <i>Less.</i>		per.	s. d.
— <i>riparium</i>	<i>Bönngh.</i>	ann.	s. d.	<i>Chrysurus cynosuroides</i>			
— <i>urbicum</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>echinatus</i>	<i>Pers.</i>	ann.	s. d.
— <i>Vulvaria</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>Pal.</i>		ann.	sp.
<i>Cherleria sedoides</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Cicer arietinum</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
<i>Chiliophyllum globosum</i>				<i>Cichorium Endivia</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>DC.</i>		per.	frig.	— <i>Intybus</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
<i>Chimonanthus fragrans</i>	<i>Ldl.</i>	lign.	s. d.	— <i>pumilum</i>	<i>Jacq.</i>	ann.	s. d.
— <i>grandiflor.</i>		lign.	s. d.	<i>Cicuta occidentalis</i>	<i>H. Angl.</i>	per.	s. d.
<i>Chiococca racemosa</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.	— <i>virosa</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
<i>Chionanthus virginica</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	<i>Cinchona floribunda</i>	<i>Sw.</i>	lign.	cal.
— <i>maritima</i>	<i>Sw.</i>	lign.	s. d.	<i>Cinna mexicana</i>	<i>Pal.</i>	per.	s. d.
<i>Chironia frutescens</i>	<i>L.</i>	lign.	tep.	— <i>sobolifera</i>	<i>Lk.</i>	per.	s. d.
— <i>linoides</i>	<i>L.</i>	per.	tep.	<i>Cinnamomum Cassia</i>	<i>D. Don</i>	lign.	cal.
— <i>maritima</i>	<i>Eckl.</i>	per.	tep.	— <i>Culilawan</i>	<i>G. Don</i>	lign.	cal.
— <i>peduncularis</i>	<i>Lindl.</i>	lign.	tep.	— <i>zeylanicum</i>	<i>Nees</i>	lign.	cal.
<i>Chlora perfoliata</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	<i>Circaea lutetiana</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>serotina</i>	<i>Koch</i>	ann.	sp.	<i>Cirsium acaule</i>	<i>All.</i>	per.	s. d.
<i>Chloris caribaea</i>	<i>Spr.</i>	ann.	s. d.	— <i>affine</i>	<i>Kostltz.</i>	per.	s. d.
— <i>meccana</i>	<i>Hochst.</i>	ann.	s. d.	— <i>arvense</i>	<i>Scop.</i>	bien.	sp.
— <i>penicillata</i>	<i>Sw.</i>	ann.	s. d.	— <i>canum</i>	<i>All.</i>	per.	s. d.
— <i>submutica</i>	<i>Humb.</i>	ann.	s. d.	— <i>ciliatum</i>	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.
<i>Chlorophytum inornatum</i>				— <i>dealbatum</i>	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.
— <i>Ker</i>		per.	cal.	— <i>incanum</i>	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.
— <i>Orchidastrum</i>	<i>Lndl.</i>	per.	cal.	— <i>lanceolatum</i>	<i>Scop.</i>	bien.	sp.
— <i>Sternbergianum</i>	<i>Std.</i>	per.	tep.	— <i>laniflorum</i>	<i>Bieb.</i>	bien.	s. d.
<i>Chondrilla graminea</i>	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.	— <i>lappaceum</i>	<i>Bieb.</i>	bien.	s. d.
— <i>juncea</i>	<i>L.</i>	bien.	sp.	— <i>lilacinum</i>	<i>Kostltz.</i>	per.	s. d.
— <i>acanthophylla</i>				— <i>ochroleucum</i>	<i>All.</i>	per.	sp.
— <i>Borch.</i>		bien.	s. d.	— <i>oleraceum</i>	<i>All.</i>	per.	sp.
— <i>virgata</i>	<i>Presl.</i>	bien.	s. d.	— <i>paanonicum</i>	<i>Scop.</i>	per.	s. d.
— <i>latifolia</i>	<i>Bieb.</i>	bien.	s. d.	— <i>pungens</i>	<i>Spr.</i>	bien.	s. d.
— <i>prenanthoides</i>	<i>Vill.</i>	per.	s. d.	— <i>strigosum</i>	<i>Bieb.</i>	bien.	s. d.
— <i>ramosissima</i>	<i>Sibth.</i>	per.	frig.	— <i>tuberosum</i>	<i>All.</i>	per.	s. d.
<i>Chorizema elegans</i>	<i>H. Hügel.</i>	lign.	frig.	<i>Cissus acida</i>	<i>L.</i>	lign.	tep.
— <i>ericoides</i>	<i>H. Hügel.</i>	lign.	frig.	— <i>antarctica</i>	<i>Vent.</i>	lign.	frig.
— <i>ilicifolium</i>	<i>Labill.</i>	lign.	frig.	— <i>orientalis</i>	<i>Lam.</i>	lign.	s. d.
— <i>rhombium</i>	<i>R. Br.</i>	lign.	frig.	— <i>vitiginea</i>	<i>L.</i>	per.	cal.
<i>Chrysanthemum Brousson-</i>				<i>Cistus corbariensis</i>	<i>Pourr.</i>	lign.	s. d.
— <i>netii</i>	<i>Balb.</i>	lign.	frig.	— <i>hirsutus</i>	<i>Lam.</i>	lign.	frig.
— <i>carinatum</i>	<i>Schousb.</i>	per.	s. d.	— <i>ladaniferus</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.
— <i>coronarium</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>angustif.</i>	<i>Hort.</i>	lign.	frig.
— <i>foeniculaceum</i>	<i>Stdl.</i>	lign.	frig.	— <i>laxus</i>	<i>Ait.</i>	lign.	frig.
— <i>anethifol.</i>	<i>Steud.</i>	lign.	frig.	— <i>monspeliensis</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.
— <i>crithmifol.</i>	<i>Steud.</i>	lign.	frig.	— <i>Pouzolzii</i>	<i>Del.</i>	lign.	frig.
— <i>grandiflorum</i>	<i>W.</i>	lign.	frig.	— <i>populifolius</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.
— <i>Roxburghii</i>	<i>Desf.</i>	ann.	frig.	— <i>salvifolius</i>	<i>L.</i>	lign.	sp.
— <i>viscosum</i>	<i>Desf.</i>	ann.	frig.	— <i>tauricus</i>	<i>Presl.</i>	lign.	frig.

<i>Cistus undulatus</i>	<i>Lk.</i>	lign.	frig.	<i>Cleome arabica</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>vaginatus</i>	<i>Ait.</i>	lign.	frig.	— <i>dodecandra</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>vulgaris</i>	<i>Spach</i>	lign.	frig.	— <i>gigantea</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.
— — <i>albidus</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.	— <i>pentaphylla</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— — <i>creticus</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.	— <i>rosea</i>	<i>Vahl</i>	ann.	s. d.
— — <i>crispus</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.	— <i>speciosa</i>	<i>Humb.</i>	per.	cal.
— — <i>heterophyllus</i>	<i>Dsf.</i>	lign.	frig.	— <i>spinosa</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— — <i>incanus</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.	— <i>triphylla</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
<i>Citharexylon quadrangulare</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.	— <i>viminea</i>	<i>Schrad.</i>	ann.	s. d.
— <i>subseriatum</i>	<i>Sw.</i>	lign.	cal.	— <i>violacea</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>villosum</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	cal.	— <i>viscosa</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
<i>Citrus Aurantium</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.	<i>Clerodendrum angustifolium</i>	<i>Spr.</i>	lign.	tep.
— — plur. variet.				— <i>buxifolium</i>	<i>Spr.</i>	lign.	tep.
— <i>buxifolia</i>	<i>Poir.</i>	lign.	frig.	— <i>coccineum</i>	<i>Hort.</i>	lign.	tep.
— <i>decumana</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.	— <i>fortunatum</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.
— <i>Hystrix</i>	<i>DC.</i>	lign.	frig.	— <i>fragrans</i>	<i>W.</i>	lign.	frig.
— <i>Limetta</i>	<i>Risso</i>	lign.	frig.	— <i>hastatum</i>	<i>Wall.</i>	lign.	cal.
— — plur. variet.				— <i>inermis</i>	<i>R. Br.</i>	lign.	cal.
— <i>Medica</i>	<i>L.</i>			— <i>ligustrinum</i>	<i>R. Br.</i>	lign.	cal.
— — plur. variet.		lign.	frig.	— <i>triflorum</i>	<i>Vis.</i>	lign.	cal.
— <i>vulgaris</i>	<i>Risso</i>	lign.	frig.	— <i>viscosum</i>	<i>Vent.</i>	lign.	cal.
— — plur. variet.				<i>Clethra alnifolia</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.
<i>Cladanthus proliiferus</i>	<i>DC.</i>	ann.	s. d.	— <i>arborea</i>	<i>Ait.</i>	lign.	frig.
<i>Cladium Mariscus</i>	<i>R. Br.</i>	per.	s. d.	— — <i>variegata</i>	<i>Hort.</i>	lign.	frig.
<i>Cladochaeta candidissima</i>				— <i>Michauxii</i>	<i>Court.</i>	lign.	frig.
	<i>DC.</i>	per.	s. d.	<i>Clianthus puniceus</i>	<i>Soland.</i>	lign.	cal.
<i>Clarkia elegans</i>	<i>Dougl.</i>	ann.	s. d.	<i>Clidemia velutina</i>	<i>Don</i>	lign.	cal.
— <i>pulchella</i>	<i>Pursh</i>	ann.	s. d.	<i>Clifortia ilicifolia</i>	<i>L.</i>	lign.	tep.
— <i>rhomboides</i>	<i>Lindl.</i>	ann.	s. d.	<i>Clintonia elegans</i>	<i>Dougl.</i>	ann.	s. d.
— <i>speciosa</i>	<i>H. Flor.</i>	ann.	s. d.	<i>Clitoria Ternatea</i>	<i>L.</i>	per.	tep.
<i>Claytonia alsinoides</i>	<i>Sims</i>	ann.	s. d.	— <i>tristis</i>	<i>Tenor.</i>	per.	tep.
— <i>perfoliata</i>	<i>Don</i>	ann.	s. d.	<i>Clusia flava</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.
<i>Clematis angustifolia</i>	<i>Jacq.</i>	per.	s. d.	— <i>rosea</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.
— <i>balearica</i>	<i>Rich.</i>	lign.	frig.	<i>Clusia alaternoides</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.
— <i>cirrhuosa</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.	— <i>pulchella</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.
— <i>crispa</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	<i>Clypeola cyclodonteia</i>	<i>Delil.</i>	ann.	s. d.
— <i>cylindrica</i>	<i>Sims</i>	lign.	s. d.	— <i>Jonthaspi</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>erecta</i>	<i>All.</i>	per.	sp.	<i>Cneorum tricocum</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.
— — <i>hispanica</i>	<i>Mill.</i>	per.	s. d.	<i>Cnicus benedictus</i>	<i>Gärtn.</i>	ann.	s. d.
— <i>Flammula</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	<i>Cnidium dahuricum</i>	<i>Fisch.</i>	per.	s. d.
— <i>florida</i>	<i>Thunb.</i>	per.	frig.	— <i>petroselinum</i>	<i>D. C.</i>	per.	s. d.
— — <i>bicolor</i>	<i>Sims</i>	per.	frig.	— <i>venosum</i>	<i>Koch</i>	per.	s. d.
— <i>glauca</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.	<i>Cnidioscolus napaeifolius</i>	<i>Pohl</i>	lign.	cal.
— <i>integrifolia</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Cobaea scandens</i>	<i>Cav.</i>	lign.	frig.
— — <i>elongata</i>	<i>Tratt.</i>	per.	s. d.	<i>Coccoloba exoriata</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.
— <i>lathyriifolia</i>	<i>Bess.</i>	per.	s. d.	— <i>fagifolia</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	cal.
— <i>odora</i>	<i>Wender.</i>	lign.	s. d.	— <i>laurifolia</i>	<i>Hort.</i>	lign.	cal.
— <i>orientalis</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>macrophylla</i>	<i>Desf.</i>	lign.	cal.
— <i>parviflora</i>	<i>DC.</i>	lign.	s. d.	— <i>pubescens</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.
— <i>verticillaris</i>	<i>DC.</i>	lign.	s. d.	— <i>sagittata</i>	<i>Poir.</i>	lign.	frig.
— <i>Viorna</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>uvifera</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.
— <i>virginiana</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	<i>Cocculus laurifolius</i>	<i>DC.</i>	lign.	frig.
— <i>Vitalba</i>	<i>L.</i>	lign.	sp.	<i>Cochlearia Armoracia</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>Viticella</i>	<i>L.</i>	lign.	sp.	— <i>officinalis</i>	<i>L.</i>	bien.	s. d.
— fl. pl.	<i>Hort.</i>	lign.	sp.				

<i>Coffea arabica</i>	L.	lign.	cal.	<i>Convolvulus arvensis</i>	L.	per.	sp.
<i>Coix Lacryma</i>	L.	ann.	s. d.	— canariensis	L.	lign.	cal.
— — gigantea	Hort.	ann.	s. d.	— chinensis	Ker	per.	cal.
<i>Colchicum autumnale</i>	L.	per.	sp.	— ciliatus	Vahl	per.	cal.
— Bertolonii	Stev.	per.	s. d.	— Cneorum	L.	lign.	frig.
— Bivonae	Guss.	per.	s. d.	— elongatus	W.	ann.	s. d.
— latifolium	Sm.	per.	frig.	— erubescens	Sims	ann.	s. d.
— persicum	H. Lovan.	per.	frig.	— farinosus	L.	per.	frig.
— rubrum	H. Lovan.	per.	frig.	— floridus	L. fil.	lign.	tep.
— tessellatum	Tagliab.	per.	s. d.	— italicus	R. S.	per.	s. d.
— variegatum	L.	per.	frig.	— oleifolius	Desv.	lign.	frig.
<i>Coleonema album</i>	Benth.	lign.	frig.	— pentapetaloides	L.	ann.	s. d.
<i>Coleus scutellarioides</i>	Bth.	per.	cal.	— peruvianus	H. Msp.	per.	tep.
<i>Colletia spinosa</i>	Lam.	lign.	tep.	— sabatius	Vivian.	per.	s. d.
<i>Colliguaya odorifera</i>	Molin.	lign.	tep.	— Scammonia	L.	per.	frig.
<i>Collinsia bicolor</i>	Benth.	ann.	s. d.	— scoparius	L. fil.	lign.	tep.
— grandiflora	R. Br.	ann.	s. d.	— sepium	L.	per.	sp.
<i>Collinsonia canadensis</i>	L.	per.	s. d.	— sculus	L.	ann.	s. d.
<i>Collomia coccinea</i>	Lehm.	ann.	s. d.	— Soldanella	L.	per.	s. d.
— gracilis	Dougl.	ann.	s. d.	— verrucipes	Tenor.	ann.	s. d.
— grandiflora	Dougl.	ann.	s. d.	<i>Conyza altaica</i>	DC.	bien.	s. d.
— linearis	Nutt.	ann.	s. d.	— chilensis	Spr.	bien.	s. d.
<i>Cologania Broussonetii</i>	DC.	per.	tep.	<i>Cookia punctata</i>	Retz.	lign.	cal.
<i>Colpodium Steveni</i>	Trin.	per.	s. d.	<i>Corchorus hirtus</i>	L.	ann.	s. d.
<i>Columnea hirsuta</i>	Sw.	lign.	cal.	— olitorius	L.	ann.	s. d.
— Schiedeana	Schldl.	per.	cal.	— trilocularis	L.	ann.	s. d.
<i>Colutea arborescens</i>	L.	lign.	sp.	<i>Cordia bifurcata</i>	Desv.	lign.	cal.
— media	W.	lign.	s. d.	— curassavica	R. S.	lign.	cal.
— orientalis	Lam.	lign.	s. d.	— dentata	Vahl	lign.	cal.
<i>Combretum grandiflorum</i>				— Francisci	H. Casert.	lign.	cal.
	Don	lign.	cal.	— macrophylla	L.	lign.	cal.
<i>Gommeline angustifolia</i>				<i>Cordylone congesta</i>	Steud.	lign.	tep.
— caroliniana	Michx.	per.	frig.	<i>Coreopsis lanceolata</i>	L.	per.	s. d.
— clandestina	Mart.	per.	frig.	— philadelphica	Lodd.	per.	s. d.
— coelestis	W.	per.	frig.	— praecox	Fresen.	per.	s. d.
— elegans	Humb.	per.	tep.	— verticillata	L.	per.	s. d.
— Karwinski	Mart.	per.	tep.	<i>Coriandrum macrocarpum</i>			
— orchioides	Booth	per.	tep.		H. Pilln.	ann.	s. d.
— pallida	Humb.	per.	cal.	— melphitense	H. Nap.	ann.	s. d.
— puberula	H. Berol.	per.	tep.	— sativum	L.	ann.	s. d.
— tuberosa	L.	per.	tep.	<i>Coriaria myrtifolia</i>	L.	lign.	s. d.
— variabilis	Schldl.	per.	tep.	<i>Corispermum hyssopifolium</i>			
<i>Comptonia asplenifolia</i>					L.	ann.	s. d.
	Gärtn.	lign.	s. d.	— squarrosus	L.	ann.	s. d.
<i>Coniandra dissecta</i>	Schrad.	per.	frig.	<i>Cornucopie cucullatum</i>	L.	ann.	s. d.
<i>Conium maculatum</i>	L.	bien.	sp.	<i>Cornus alba</i>	L.	lign.	s. d.
<i>Convallaria bracteata</i>	Thom.	per.	s. d.	— alternifolia	L. fil.	lign.	s. d.
— majalis	L.	per.	sp.	— capitata	Wall.	lign.	frig.
— — flor. pl.		per.	s. d.	— candidissima	Mill.	lign.	s. d.
— — flor. carn.		per.	s. d.	— circinata	Herit.	lign.	s. d.
— multiflora	L.	per.	sp.	— florida	L.	lign.	s. d.
— Polygonatum	L.	per.	sp.	— mascula	L.	lign.	sp.
— verticillata	L.	per.	s. d.	— paniculata	Herit.	lign.	s. d.
<i>Convolvulus amblyocalyx</i>				— sanguinea	L.	lign.	sp.
	Steud.	per.	cal.	<i>Cornutia pyramidata</i>	Spr.	lign.	cal.
				<i>Coronilla coronata</i>	L.	per.	s. d.

<i>Coronilla cretica</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	<i>Crassula arborescens</i>	<i>W.</i>	lign.	cal.
— <i>Emerus</i>	<i>L.</i>	lign.	sp.	— <i>columnaris</i>	<i>L. fil.</i>	lign.	cal.
— <i>georgica</i>	<i>Hsch.</i>	per.	s. d.	— <i>cordata</i>	<i>Ait.</i>	lign.	cal.
— <i>glauca</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>Cotyledonis</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.
— <i>junceae</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.	— <i>ericoides</i>	<i>Haw.</i>	lign.	cal.
— <i>montana</i>	<i>Scop.</i>	per.	s. d.	— <i>glomerata</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>procumbens</i>	<i>Delil.</i>	per.	s. d.	— <i>lactea</i>	<i>Ait.</i>	lign.	cal.
— <i>valentina</i>	<i>Lam.</i>	lign.	frig.	— <i>marginalis</i>	<i>Ait.</i>	lign.	cal.
— <i>varia</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>obliqua</i>	<i>Ait.</i>	lign.	cal.
<i>Correa alba</i>	<i>Andr.</i>	lign.	tep.	— <i>orbicularis</i>	<i>L.</i>	per.	cal.
— <i>rufa</i>	<i>Gärtn. fil.</i>	lign.	frig.	— <i>pellucida</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.
— <i>speciosa</i>	<i>Andr.</i>	lign.	tep.	— <i>perfossa</i>	<i>Lam.</i>	lign.	cal.
<i>Corrigiola capensis</i>	<i>Thunb.</i>	ann.	s. d.	— <i>spathulata</i>	<i>Thunb.</i>	lign.	cal.
— <i>littoralis</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>tetragona</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.
<i>Cortusa Matthioli</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Crataegus coccinea</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.
<i>Gorydalis aurea</i>	<i>DC.</i>	bien.	s. d.	— <i>Crus galli</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>bulbosa</i>	<i>Pers.</i>	per.	s. d.	— <i>linearis</i>	<i>Pers.</i>	lign.	s. d.
— <i>capnoides</i>	<i>Pers.</i>	per.	s. d.	— <i>elliptica</i>	<i>Ait.</i>	lign.	s. d.
— <i>lutea</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.	— <i>flava</i>	<i>Ait.</i>	lign.	s. d.
— <i>glauca</i>	<i>Pursh</i>	ann.	s. d.	— <i>glandulosa</i>	<i>Ait.</i>	lign.	s. d.
— <i>fungosa</i>	<i>Vent.</i>	bien.	s. d.	— <i>succulenta</i>	<i>Fisch.</i>	lign.	s. d.
— <i>nobilis</i>	<i>Pers.</i>	per.	s. d.	— <i>latifolia</i>	<i>Pers.</i>	lign.	s. d.
— <i>pallida</i>	<i>Pers.</i>	per.	s. d.	— <i>lobata</i>	<i>Bosc.</i>	lign.	s. d.
<i>Corylus Avellana</i>	<i>L.</i>	lign.	sp.	— <i>mexicana</i>	<i>Moc.</i>	lign.	s. d.
— <i>laciniata</i>	<i>Hort.</i>	lign.	s. d.	— <i>monogyna</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	sp.
— <i>purpurea</i>	<i>Loud.</i>	lign.	s. d.	— <i>nigra</i>	<i>W. Kit.</i>	lign.	s. d.
— <i>Colurna</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>orientalis</i>	<i>Bieb.</i>	lign.	s. d.
<i>Cosmos bipinnatus</i>	<i>Cav.</i>	ann.	s. d.	— <i>Oxyacantha</i>	<i>L.</i>	lign.	sp.
— <i>diversifolius</i>	<i>Otto</i>	per.	s. d.	— <i>flor. pl. alb.</i>		lign.	s. d.
— <i>parviflorus</i>	<i>Pers.</i>	ann.	s. d.	— <i>flor. pl. ros.</i>		lign.	s. d.
— <i>sulphureus</i>	<i>Cav.</i>	ann.	s. d.	— <i>fol. varieg.</i>		lign.	s. d.
<i>Costus speciosus</i>	<i>Sw.</i>	per.	cal.	— <i>parvifolia</i>	<i>Ait.</i>	lign.	s. d.
<i>Cotoneaster acuminata</i>	<i>Ldl.</i>	lign.	s. d.	— <i>prunifolia</i>	<i>Bosc.</i>	lign.	s. d.
— <i>laxiflora</i>	<i>Lindl.</i>	lign.	s. d.	— <i>ingestria</i>	<i>Lodd.</i>	lign.	s. d.
— <i>microphylla</i>	<i>Wall.</i>	lign.	s. d.	— <i>pyracantha</i>	<i>Pers.</i>	lign.	s. d.
— <i>rotundifolia</i>	<i>Wall.</i>	lign.	s. d.	— <i>sanguinea</i>	<i>Pall.</i>	lign.	s. d.
— <i>vulgaris</i>	<i>Lindl.</i>	lign.	s. d.	— <i>stipulacea</i>	<i>Lodd.</i>	lign.	s. d.
<i>Cotula aurea</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>tanacetifolia</i>	<i>Pers.</i>	lign.	s. d.
— <i>filifolia</i>	<i>Thunb.</i>	ann.	s. d.	<i>Crataeva fragrans</i>	<i>Sims</i>	lign.	cal.
— <i>matricarioides</i>	<i>Engd.</i>	ann.	s. d.	<i>Cremocephalum cernuum</i>	<i>Cass.</i>	ann.	s. d.
<i>Cotyledon coruscans</i>	<i>Haw.</i>	lign.	cal.	<i>Crepis alpestris</i>	<i>Tausch</i>	per.	s. d.
— <i>crispata</i>	<i>DC.</i>	lign.	cal.	— <i>biennis</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>fascicularis</i>	<i>Ait.</i>	lign.	cal.	— <i>Bungei</i>	<i>Led.</i>	per.	s. d.
— <i>hemisphaerica</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.	— <i>chondrilloides</i>	<i>Jacq.</i>	per.	s. d.
— <i>jasmiflora</i>	<i>Sal.</i>	lign.	cal.	— <i>grandiflora</i>	<i>Tausch</i>	per.	s. d.
— <i>orbiculata</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.	— <i>hieracioides</i>	<i>W. Kit.</i>	per.	s. d.
— <i>farinosa</i>	<i>Hort.</i>	lign.	cal.	— <i>mollis</i>	<i>Hort.</i>	per.	s. d.
— <i>obovata</i>	<i>Hort.</i>	lign.	cal.	— <i>lodomiriensis</i>	<i>Bess.</i>	per.	s. d.
— <i>ramosissima</i>	<i>Mill.</i>	lign.	cal.	— <i>multicaulis</i>	<i>Led.</i>	per.	s. d.
— <i>spuria</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.	— <i>pulchra</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
<i>Coulteria horrida</i>	<i>Humb.</i>	lign.	cal.	— <i>sibirica</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
<i>Cousinia Hystrix</i>	<i>Mey.</i>	per.	s. d.	— <i>teetorum</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
<i>Crambe cordifolia</i>	<i>Stev.</i>	per.	s. d.	<i>Crinum amabile</i>	<i>Don</i>	per.	cal.
— <i>grandiflora</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.	— <i>americanum</i>	<i>L.</i>	per.	cal.
— <i>junceae</i>	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.	— <i>asiaticum</i>	<i>L.</i>	per.	cal.
— <i>maritima</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.				

<i>Crinum Commelini</i>	<i>Jacq.</i>	per.	cal.	<i>Cucumis Dudaim</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>erubescens</i>	<i>Ait.</i>	per.	cal.	— <i>Figarei</i>	<i>Delil.</i>	ann.	s. d.
— <i>latifolium</i>	<i>Roxb.</i>	per.	cal.	— <i>flexuosus</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>revolutum</i>	<i>Herb.</i>	per.	cal.	— <i>macrocarpus</i>	<i>Wndr.</i>	ann.	s. d.
— <i>zeylanicum</i>	<i>L.</i>	per.	cal.	— <i>Melo</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
<i>Crithmum maritimum</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>metuliferus</i>	<i>E. Mey.</i>	ann.	s. d.
<i>Crocus autumnalis</i>	<i>Mill.</i>	per.	frig.	— <i>sativus</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>biflorus</i>	<i>Mill.</i>	per.	frig.	<i>Cucurbita aurantiaca</i>	<i>W.</i>	ann.	s. d.
— <i>brachystemon</i>	<i>Kstltz.</i>	per.	frig.	— <i>campaniformis</i>	<i>H. Pr.</i>	ann.	s. d.
— <i>longiflorus</i>	<i>Rafin.</i>	per.	frig.	— <i>maxima</i>	<i>Duch.</i>	ann.	s. d.
— <i>luteus</i>	<i>Lam.</i>	per.	frig.	— <i>Melopepo</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>sativus</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>ovifera</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>suaveolens</i>	<i>Bertol.</i>	per.	frig.	— <i>Pepo</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>sulphureus</i>	<i>Curt.</i>	per.	frig.	— <i>sicula</i>	<i>Haberl.</i>	ann.	s. d.
— <i>variegatus</i>	<i>Hopp.</i>	per.	s. d.	— <i>verrucosa</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>vernus</i>	<i>Sm.</i>	per.	s. d.	<i>Cunninghamia sinensis</i>	<i>Rech.</i>	lign.	frig.
<i>Crossandra infundibulifor-</i>	<i>mis Nees</i>	lign.	cal.	<i>Cunonia capensis</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.
<i>Grotalaria genistella</i>	<i>Humb.</i>	per.	cal.	<i>Cuphea procumbens</i>	<i>Cav.</i>	ann.	s. d.
— <i>incana</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>viscosissima</i>	<i>Jacq.</i>	ann.	s. d.
— <i>retusa</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	<i>Cupressus expansa</i>	<i>Targ.</i>	lign.	s. d.
— <i>sagittalis</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>sempervirens</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>stipularis</i>	<i>Desv.</i>	ann.	s. d.	<i>Curculigo sumatrana</i>	<i>Roxb.</i>	per.	cal.
— <i>villosa</i>	<i>Thunb.</i>	per.	cal.	<i>Curcuma longa</i>	<i>L.</i>	per.	cal.
<i>Croton adenophyllum</i>	<i>Bert.</i>	lign.	cal.	— <i>Zedoaria</i>	<i>Rosc.</i>	per.	cal.
— <i>Casarettianum</i>	<i>Vis.</i>	lign.	cal.	<i>Curtisia laginea</i>	<i>Thunb.</i>	lign.	frig.
— <i>lacerum</i>	<i>Desf.</i>	lign.	cal.	<i>Cuscuta chilensis</i>	<i>Ker.</i>	per.	frig.
— <i>— palmatum</i>	<i>H. Pat.</i>	lign.	cal.	— <i>Epithymum</i>	<i>Sm.</i>	ann.	sp.
— <i>penicillatum</i>	<i>Vent.</i>	lign.	cal.	— <i>europaea</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
<i>Crozophora tinctoria</i>	<i>Juss.</i>	ann.	s. d.	<i>Cussonia thyrsiflora</i>	<i>Thunb.</i>	lign.	cal.
<i>Crucianella angustifolia</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>triptera</i>	<i>Coll.</i>	lign.	cal.
— <i>gilanica</i>	<i>Trin.</i>	per.	s. d.	<i>Cyanopsis pubescens</i>	<i>Blum.</i>	ann.	s. d.
— <i>latifolia</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	<i>Cycas circinalis</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.
— <i>— monspeliaca</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>revoluta</i>	<i>Thunb.</i>	lign.	cal.
— <i>stylosa</i>	<i>Trin.</i>	per.	s. d.	<i>Cyclamen coum</i>	<i>Mill.</i>	per.	s. d.
— <i>suaveolens</i>	<i>Mey.</i>	per.	s. d.	— <i>europaeum</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
<i>Crupina vulgaris</i>	<i>Pers.</i>	ann.	sp.	— <i>hederaefolium</i>	<i>Ait.</i>	per.	s. d.
<i>Cryphiacanthus lacteus</i>	<i>Nees</i>	per.	frig.	— <i>persicum</i>	<i>Mill.</i>	per.	frig.
<i>Crypsis aculeata</i>	<i>Ait.</i>	ann.	sp.	— <i>— flor. albo</i>	<i>Hort.</i>	per.	frig.
— <i>schoenoides</i>	<i>Lam.</i>	ann.	sp.	— <i>— flor. rubro</i>	<i>Hort.</i>	per.	frig.
<i>Cryptanthus discolor</i>	<i>Otto</i>	per.	cal.	<i>Cyclanthera pedata</i>	<i>Schrd.</i>	ann.	s. d.
<i>Cryptostegia grandiflora</i>	<i>R. Br.</i>	lign.	cal.	<i>Cydonia chinensis</i>	<i>Thouin</i>	lign.	s. d.
<i>Cryptostemma calendula-</i>	<i>ceum R. Br.</i>	ann.	s. d.	— <i>japonica</i>	<i>Pers.</i>	lign.	s. d.
— <i>hypochondriacum</i>	<i>R. Br.</i>	ann.	s. d.	— <i>vulgaris</i>	<i>Pers.</i>	lign.	s. d.
<i>Cryptotaenia canadensis</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.	<i>Cylista villosa</i>	<i>Ait.</i>	lign.	tep.
<i>Cucumis amarissimus</i>	<i>Schr.</i>	ann.	s. d.	<i>Cymbidium aloifolium</i>	<i>Sw.</i>	per.	cal.
— <i>Anguria</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>ensifolium</i>	<i>Sw.</i>	per.	cal.
— <i>arabicus</i>	<i>Del.</i>	ann.	s. d.	— <i>sinense</i>	<i>W.</i>	per.	cal.
— <i>Citrullus</i>	<i>Ser.</i>	ann.	s. d.	<i>Cynanchum acutum</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>deliciosus</i>	<i>Roth</i>	ann.	s. d.	— <i>fuscatum</i>	<i>Lk.</i>	per.	s. d.
— <i>dipsaceus</i>	<i>Ehrnb.</i>	ann.	s. d.	— <i>monspeliacum</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
				— <i>nigrum</i>	<i>Pers.</i>	per.	s. d.
				— <i>Vincetoxicum</i>	<i>Pers.</i>	per.	sp.
				<i>Cynara Cardunculus</i>	<i>L.</i>	bien.	s. d.
				— <i>ferox</i>	<i>Tenor.</i>	per.	s. d.
				— <i>horrida</i>	<i>Ait.</i>	per.	s. d.
				— <i>Scolymus</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.

<i>Cynara spinosissima</i>	<i>Presl</i>	per.	s. d.	<i>Cytisus nigricans</i>	<i>L.</i>	lign.	sp.
<i>Cynodon Dactylon</i>	<i>Pers.</i>	per.	sp.	— — sericeus	<i>Hort.</i>	lign.	s. d.
<i>Cynoglossum anchusoides</i>				— polytrichus	<i>Bieb.</i>	lign.	s. d.
— <i>clandestinum</i>	<i>H. Angl.</i>	bien.	s. d.	— purpureus	<i>Scop.</i>	lign.	s. d.
— <i>Dioscoridis</i>	<i>Desf.</i>	bien.	s. d.	— sessilifolius	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>furcatum</i>	<i>Vill.</i>	bien.	s. d.	— spinosus	<i>Lam.</i>	lign.	s. d.
— <i>lanceolatum</i>	<i>Wall.</i>	bien.	tep.	— triflorus	<i>Herit.</i>	lign.	s. d.
— <i>lanceolatum</i>	<i>Forsk.</i>	ann.	s. d.	— uralensis	<i>Led.</i>	lign.	s. d.
— <i>officinale</i>		L.	per. sp.	— <i>Weldenii</i>	<i>Vis.</i>	lign.	s. d.
— <i>pictum</i>	<i>Ait.</i>	bien.	sp.				
— <i>sylvaticum</i>	<i>Haenk.</i>	bien.	s. d.	<i>Dactylaena micrantha</i>	<i>Schr.</i>	ann.	s. d.
— <i>umbellatum</i>	<i>W. et K.</i>	per.	s. d.	<i>Dactylis altaica</i>	<i>Bess.</i>	per.	s. d.
<i>Cynosurus cristatus</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	— — glomerata		L.	per. sp.
<i>Cyperus alternifolius</i>	<i>L.</i>	per.	cal.	— — abbreviata	<i>Bh.</i>	per.	s. d.
— <i>aureus</i>	<i>Tenor.</i>	per.	s. d.	— — glaucescens	<i>W.</i>	per.	s. d.
— <i>auricomus</i>	<i>Sieb.</i>	per.	s. d.	<i>Dactyloctenium aristatum</i>			
— <i>australis</i>	<i>Schrad.</i>	per.	s. d.		<i>Lk.</i>	ann.	s. d.
— <i>compressus</i>	<i>L.</i>	per.	tep.	<i>Dahlia coccinea</i>	<i>Cav.</i>	per.	frig.
— <i>congestus</i>	<i>Vahl.</i>	per.	frig.	— minor	<i>Vis.</i>	per.	frig.
— <i>distans</i>	<i>L.</i>	per.	tep.	— variabilis	<i>Desf.</i>	per.	frig.
— <i>erythraeus</i>	<i>Schrad.</i>	ann.	s. d.	— — plur. variet.		per.	frig.
— <i>flavescens</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	<i>Dais cotinifolia</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>fuscus</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	<i>Dalea alopecuroides</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>infucatus</i>	<i>Kth.</i>	per.	s. d.	— — Lagopus	<i>W.</i>	ann.	s. d.
— <i>Iria</i>	<i>L.</i>	per.	tep.	<i>Daphne alpina</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>longus</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>Cneorum</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>Luzulae</i>	<i>Rottb.</i>	per.	tep.	— collina	<i>Sm.</i>	lign.	s. d.
— <i>Monti</i>	<i>L. fil.</i>	per.	sp.	— hybrida	<i>Sweet.</i>	lign.	s. d.
— <i>mucronatus</i>	<i>Rottb.</i>	ann.	s. d.	— <i>Laureola</i>	<i>L.</i>	lign.	sp.
— <i>Papyrus</i>	<i>L.</i>	per.	cal.	— <i>Mezereum</i>	<i>L.</i>	lign.	sp.
— <i>patulus</i>	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.	— odora	<i>Thunb.</i>	lign.	frig.
— <i>pygmaeus</i>	<i>Rottb.</i>	ann.	s. d.	— — marginata	<i>Host.</i>	lign.	frig.
— <i>spectabilis</i>	<i>Lk.</i>	per.	s. d.	— striata	<i>Tratt.</i>	lign.	s. d.
— <i>textilis</i>	<i>Thunb.</i>	per.	frig.	<i>Darlingtonia brachyloba</i>			
<i>Cypripedium insigne</i>	<i>Wall.</i>	per.	cal.		<i>DC.</i>	per.	s. d.
— <i>venustum</i>	<i>Wall.</i>	per.	cal.	— glandulosa	<i>DC.</i>	per.	s. d.
<i>Cyrtanthus angustifolius</i>	<i>Ait.</i>	per.	cal.	<i>Datisca cannabina</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>obliquus</i>	<i>Ait.</i>	per.	cal.	<i>Datura ceratocaula</i>	<i>Jacq.</i>	ann.	s. d.
— <i>odorus</i>	<i>Ker.</i>	per.	cal.	— fastuosa	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>pumilio</i>	<i>Schult.</i>	per.	cal.	— ferox	<i>L.</i>	ann.	s. d.
<i>Cyrtopera Woodfordii</i>	<i>Lndl.</i>	per.	cal.	— hybrida	<i>Hort.</i>	bien.	frig.
<i>Cysticapnos africana</i>	<i>Gärtn.</i>	ann.	s. d.	— laevis	<i>L. fil.</i>	ann.	s. d.
<i>Cytinus Hypocistis</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	— Metel	<i>L.</i>	ann.	s. d.
<i>Cytisus alpinus</i>	<i>Mill.</i>	lign.	s. d.	— quercifolia	<i>Humb.</i>	ann.	s. d.
— <i>Alschingeri</i>	<i>Vis.</i>	lign.	s. d.	— <i>Stramonium</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>anstriacus</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— Tatula	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>biflorus</i>	<i>Herit.</i>	lign.	s. d.	<i>Daucus Bocconi</i>	<i>Guss.</i>	bien.	s. d.
— <i>calycinus</i>	<i>Bieb.</i>	lign.	s. d.	— Carota	<i>L.</i>	bien.	sp.
— <i>canescens</i>	<i>Lois.</i>	lign.	s. d.	— <i>Gingidium</i>	<i>L.</i>	bien.	s. d.
— <i>capitatus</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	sp.	— hispanicus	<i>DC.</i>	bien.	s. d.
— <i>chrysobotrys</i>	<i>Fisch.</i>	lign.	s. d.	— hispidus	<i>Desf.</i>	bien.	s. d.
— <i>cinereus</i>	<i>Host.</i>	lign.	s. d.	— maritimus	<i>Lam.</i>	bien.	s. d.
— <i>elongatus</i>	<i>W. et K.</i>	lign.	s. d.	— pulcherrimus	<i>Koch.</i>	ann.	s. d.
— <i>falcatus</i>	<i>W. et K.</i>	lign.	s. d.	— siculum	<i>Tin.</i>	ann.	s. d.
— <i>Laburnum</i>	<i>L.</i>	sp.		<i>Decaneurum senegalense</i>			
— <i>leucanthus</i>	<i>W. et K.</i>	lign.	s. d.		<i>DC.</i>	lign.	cal.

<i>Decumaria barbara</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	<i>Desmodium canadense</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.
<i>Deeringia celosioides</i>	<i>R. Br.</i>	lign.	tep.	— <i>gangeticum</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.
— <i>indica</i>	<i>Spr.</i>	bien.	tep.	— <i>marylandicum</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.
<i>Delphinium acuminatum</i>				— <i>heterocarpum</i>	<i>DC.</i>	lign.	cal.
— <i>Ajacis</i>	<i>Kostl.</i>	per.	s. d.	— <i>heterophyllum</i>	<i>DC.</i>	per.	cal.
— <i>angustum</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>nutans</i>	<i>Wall.</i>	lign.	cal.
— <i>azureum</i>	<i>Kostl.</i>	per.	s. d.	— <i>paniculatum</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.
— <i>bicolor</i>	<i>Michx.</i>	per.	s. d.	— <i>polycarpum</i>	<i>DC.</i>	lign.	cal.
— <i>Consolida</i>	<i>Hort.</i>	per.	s. d.	— <i>triquetrum</i>	<i>DC.</i>	lign.	cal.
— <i>crassicaule</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>viridiflorum</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.
— <i>cuneatum</i>	<i>Gmel.</i>	per.	s. d.	<i>Desmoncus polyacanthus</i>			
— <i>cyaneum</i>	<i>Stev.</i>	per.	s. d.		<i>Mart.</i>	lign.	cal.
— <i>discolor</i>	<i>Stev.</i>	per.	s. d.	<i>Deutzia scabra</i>	<i>Thunb.</i>	lign.	s. d.
— <i>dissectum</i>	<i>Fisch.</i>	per.	s. d.	<i>Dianella coerulea</i>	<i>Sims</i>	per.	frig.
— <i>divaricatum</i>	<i>Kostl.</i>	per.	s. d.	— <i>ensifolia</i>	<i>Ait.</i>	per.	tep.
— <i>elegans</i>	<i>Ledeb.</i>	ann.	s. d.	<i>Dianthus aggregatus</i>	<i>Poir.</i>	per.	s. d.
— <i>exaltatum</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.	— <i>arbores</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.
— <i>fixum</i>	<i>Ait.</i>	per.	s. d.	— <i>arenarius</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>flexuosum</i>	<i>W. et K.</i>	per.	s. d.	— <i>Armeria</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>glabellum</i>	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.	— <i>atrorubens</i>	<i>All.</i>	per.	sp.
— <i>grandiflorum</i>	<i>Turt.</i>	per.	s. d.	— <i>asper</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.
— <i>chinense</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>barbatus</i>	<i>L.</i>	bien.	sp.
— <i>intermedium</i>	<i>Fisch.</i>	per.	s. d.	— <i>bicolor</i>	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.
— <i>junceum</i>	<i>Ait.</i>	per.	s. d.	— <i>caesius</i>	<i>Sm.</i>	per.	s. d.
— <i>lazulinum</i>	<i>DC.</i>	ann.	sp.	— <i>campestris</i>	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.
— <i>lilacinum</i>	<i>Reichb.</i>	per.	s. d.	— <i>Carthusianorum</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>mesoleucum</i>	<i>Hort.</i>	per.	s. d.	— <i>clavatus</i>	<i>Spr.</i>	per.	s. d.
— <i>neglectum</i>	<i>Lk.</i>	per.	s. d.	— <i>Caryophyllus</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>palmatifidum</i>	<i>Colla</i>	per.	s. d.	— <i>— plur. variet.</i>		lign.	s. d.
— <i>pictum</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.	— <i>chinensis</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>praecox</i>	<i>W.</i>	bien.	s. d.	— <i>ciliatus</i>	<i>Gusson.</i>	lign.	s. d.
— <i>punicum</i>	<i>Kostl.</i>	per.	s. d.	— <i>cingulatus</i>	<i>Reichb.</i>	per.	s. d.
— <i>pyramidale</i>	<i>L. fil.</i>	per.	s. d.	— <i>corsicus</i>	<i>Fisch.</i>	per.	s. d.
— <i>revolutum</i>	<i>Kostl.</i>	per.	s. d.	— <i>Cyri</i>	<i>Fisch.</i>	ann.	s. d.
— <i>rubellum</i>	<i>Desf.</i>	per.	s. d.	— <i>deltoides</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>speciosum</i>	<i>Kostl.</i>	per.	s. d.	— <i>alpestris</i>	<i>Hort.</i>	per.	s. d.
— <i>Staphysagria</i>	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.	— <i>dentosus</i>	<i>Fisch.</i>	per.	s. d.
— <i>sulcatum</i>	<i>L.</i>	bien.	s. d.	— <i>dubius</i>	<i>Horn.</i>	per.	s. d.
— <i>triste</i>	<i>Reichb.</i>	per.	s. d.	— <i>fimbriatus</i>	<i>Bieb.</i>	lign.	s. d.
— <i>truncatum</i>	<i>Fisch.</i>	per.	s. d.	— <i>Fischeri</i>	<i>Spr.</i>	per.	s. d.
— <i>urceolatum</i>	<i>Kostl.</i>	per.	s. d.	— <i>furcatus</i>	<i>Balb.</i>	per.	s. d.
— <i>velutinum</i>	<i>Jacq.</i>	per.	s. d.	— <i>giganteus</i>	<i>Urvill.</i>	per.	s. d.
— <i>villosum</i>	<i>Bertol.</i>	per.	s. d.	— <i>glaucophyllus</i>	<i>Colla</i>	per.	s. d.
<i>Dendrobium pulchellum</i>	<i>Stev.</i>	per.	s. d.	— <i>ibericus</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.
— <i>speciosum</i>	<i>Roxb.</i>	per.	cal.	— <i>liburnicus</i>	<i>Bartl.</i>	per.	s. d.
<i>Dentaria bulbifera</i>	<i>Sm.</i>	per.	tep.	— <i>lineolatus</i>	<i>Delil.</i>	per.	s. d.
— <i>enneaphylla</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>longicaulis</i>	<i>Tenor.</i>	per.	s. d.
<i>Deschampsia juncea</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>monspessulanus</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
<i>Desmanthus cinereus</i>	<i>Pal.</i>	per.	s. d.	— <i>montanus</i>	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.
— <i>stipulaceus</i>	<i>H. Filln.</i>	lign.	cal.	— <i>nitidus</i>	<i>W. et K.</i>	per.	s. d.
— <i>virgatus</i>	<i>W.</i>	lign.	cal.	— <i>pannonicus</i>	<i>H. Mon.</i>	per.	s. d.
<i>Desmochaeta atropurpurea</i>				— <i>petraeus</i>	<i>W. et K.</i>	per.	s. d.
— <i>flavescens</i>	<i>DC.</i>	per.	cal.	— <i>plumarius</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
				— <i>moschatus</i>	<i>Desf.</i>	per.	s. d.
				— <i>polymorphus</i>	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.
				— <i>diutinus</i>	<i>Kit.</i>	per.	s. d.

<i>Dianthus pratensis</i>	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.	<i>Diodia virginica</i>	<i>L.</i>	per.	frig.
— <i>prolifer</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	<i>Dioscorea bonariensis</i>	<i>H. Fl.</i>	per.	tep.
— <i>pulcherrimus</i>	<i>Lois.</i>	per.	tep.	— <i>bulbifera</i>	<i>L.</i>	per.	cal.
— <i>punctatus</i>	<i>Spr.</i>	per.	s. d.	— <i>punctata</i>	<i>R. Br.</i>	lign.	frig.
— <i>pungens</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>villosa</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>hispanicus</i>	<i>Asso</i>	per.	s. d.	<i>Diosma ericoides</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.
— <i>Seguieri</i>	<i>Vill.</i>	per.	s. d.	— <i>Hügeliana</i>	<i>Vis.</i>	lign.	frig.
— <i>serotinus</i>	<i>W. et K.</i>	per.	s. d.	<i>Diospiros Kaki</i>	<i>L. fil.</i>	lign.	s. d.
— <i>serrulatus</i>	<i>Desf.</i>	per.	s. d.	— <i>Lotus</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>siculus</i>	<i>Presl</i>	per.	s. d.	— <i>pubescens</i>	<i>Pursh</i>	lign.	s. d.
— <i>squarrosus</i>	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.	— <i>virginiana</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>sylvaticus</i>	<i>Hopp.</i>	per.	s. d.	<i>Diotis ceratoides</i>	<i>W.</i>	lign.	s. d.
— <i>suaavis</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.	<i>Diplolaena Dampieri</i>	<i>Desf.</i>	lign.	frig.
— <i>superbus</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Diplopappus fruticosus</i>			
— <i>trifasciculatus</i>	<i>Kit.</i>	per.	s. d.	— <i>linariaefolius</i>	<i>Lam.</i>	lign.	frig.
— <i>versicolor</i>	<i>Fisch.</i>	per.	s. d.	— <i>umbellatus</i>	<i>Lindl.</i>	per.	s. d.
— <i>virginicus</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Diplostephium amygdali-</i>			
— <i>viridescens</i>	<i>Vis.</i>	per.	s. d.	— <i>num</i>	<i>Cass.</i>	per.	s. d.
<i>Diasia graminifolia</i>	<i>DC.</i>	per.	frig.	— <i>umbellatum</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.
<i>Dichondra argentea</i>	<i>W.</i>	per.	tep.	<i>Diplotaxis apula</i>	<i>Tenor.</i>	ann.	s. d.
— <i>sericea</i>	<i>Sw.</i>	per.	frig.	— <i>erucoides</i>	<i>DC.</i>	ann.	s. d.
<i>Dichorisandra thyrsiflora</i>				— <i>muralis</i>	<i>DC.</i>	ann.	s. d.
— <i>Mik.</i>		per.	cal.	— <i>tenuifolia</i>	<i>DC.</i>	per.	sp.
<i>Dicksonia adiantoides</i>	<i>Hmb.</i>	per.	tep.	<i>Dipsacus ferox</i>	<i>Lois.</i>	bien.	s. d.
<i>Dicliptera ciliata</i>	<i>Schauer</i>	per.	tep.	— <i>fullonum</i>	<i>Mill.</i>	bien.	s. d.
<i>Dictamnus albus</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>Gmelini</i>	<i>Bieb.</i>	bien.	s. d.
<i>Didiscus coeruleus</i>	<i>Hook.</i>	ann.	s. d.	— <i>laciniatus</i>	<i>L.</i>	bien.	sp.
<i>Dielytra eximia</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.	— <i>recurvus</i>	<i>Hab.</i>	bien.	s. d.
<i>Diervilla canadensis</i>	<i>W.</i>	lign.	s. d.	— <i>sylvestris</i>	<i>Mill.</i>	bien.	sp.
<i>Digera arvensis</i>	<i>Forsk.</i>	ann.	s. d.	<i>Dipteracanthus Schaueria-</i>			
<i>Digitalis canariensis</i>	<i>L.</i>	lign.	tep.	— <i>nus Nees</i>		lign.	cal.
— <i>eristachya</i>	<i>Fisch.</i>	bien.	s. d.	<i>Dirca palustris</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>ferruginea</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Dischisma erinoides</i>	<i>G. Don</i>	bien.	cal.
— <i>fulva</i>	<i>Lindl.</i>	per.	s. d.	<i>Disemma adiantifolia</i>	<i>DC.</i>	lign.	cal.
— <i>fuscescens</i>	<i>W. et K.</i>	per.	s. d.	— <i>aurantia</i>	<i>Labill.</i>	lign.	cal.
— <i>grandiflora</i>	<i>Lam.</i>	per.	s. d.	— <i>Herbertiana</i>	<i>DC.</i>	lign.	tep.
— <i>laevigata</i>	<i>W. et K.</i>	per.	s. d.	<i>Disporum fulvum</i>	<i>Salisb.</i>	per.	s. d.
— <i>lanata</i>	<i>Ehrh.</i>	per.	s. d.	<i>Dodartia orientalis</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>lutea</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	<i>Dodecatheon Meadia</i>	<i>L.</i>	per.	frig.
— <i>media</i>	<i>Roth</i>	per.	s. d.	— <i>flor. alb.</i>	<i>Hort.</i>	per.	frig.
— <i>micrantha</i>	<i>Roth</i>	per.	s. d.	<i>Dodonaea Burmanniana</i>			
— <i>minor</i>	<i>Lindl.</i>	per.	s. d.	— <i>jamaicensis</i>	<i>DC.</i>	lign.	tep.
— <i>nervosa</i>	<i>Steud.</i>	per.	s. d.	— <i>viscosa</i>	<i>L.</i>	lign.	tep.
— <i>obscura</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Doemia cordata</i>	<i>R. Br.</i>	lign.	cal.
— <i>ochroleuca</i>	<i>Jacq.</i>	per.	sp.	<i>Dolichos biflorus</i>	<i>L.</i>	per.	cal.
— <i>orientalis</i>	<i>Lam.</i>	per.	s. d.	— <i>Catiang</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>purpurascens</i>	<i>Roth</i>	per.	s. d.	— <i>Jacquinii</i>	<i>DC.</i>	lign.	cal.
— <i>purpurea</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>Lubia</i>	<i>Forsk.</i>	ann.	s. d.
— <i>candida</i>	<i>Hab.</i>	per.	s. d.	— <i>melanophthalmus</i>			
— <i>carnea</i>	<i>Meig.</i>	per.	s. d.	— <i>monachalis</i>	<i>DC.</i>	ann.	s. d.
— <i>Thapsi</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>myodes</i>	<i>Brot.</i>	ann.	s. d.
— <i>tubidior</i>	<i>Lindl.</i>	per.	s. d.	— <i>niger</i>	<i>Tenor.</i>	ann.	s. d.
<i>Dillenia speciosa</i>	<i>Thunb.</i>	lign.	cal.	— <i>niloticus</i>	<i>Delil.</i>	ann.	s. d.
<i>Dimorphotheca pluvialis</i>				— <i>sesquipedalis</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>Moench</i>		ann.	s. d.				
<i>Diodia dasycephala</i>	<i>Chamss.</i>	per.	cal.				

<i>Dolichos sinensis</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	<i>Echenais carlinoides</i>	<i>Cass.</i>	bien.	s. d.
— <i>speciosus</i>	<i>DC.</i>	ann.	s. d.	<i>Echeveria caespitosa</i>	<i>DC.</i>	per.	cal.
<i>Dombeya ferruginea</i>	<i>Cav.</i>	lign.	cal.	— <i>coccinea</i>	<i>DC.</i>	lign.	cal.
<i>Doodia rupestris</i>	<i>Kaulf.</i>	per.	cal.	— <i>racemosa</i>	<i>Chamss.</i>	per.	cal.
<i>Doronicum Columnae</i>	<i>Ten.</i>	per.	s. d.	<i>Echinacea purpurea</i>	<i>Mach.</i>	per.	s. d.
— <i>Pardalianches</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>serotina</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.
<i>Dorstenia Contrayerva</i>	<i>L.</i>	per.	cal.	<i>Echinaria capitata</i>	<i>Desf.</i>	ann.	s. d.
<i>Dorycnium herbaceum</i>	<i>Vill.</i>	per.	sp.	<i>Echinocactus acutatus</i>	<i>Link.</i>	per.	cal.
— <i>hirsutum</i>	<i>Ser.</i>	lign.	s. d.	— <i>cornigerus</i>	<i>DC.</i>	per.	cal.
— <i>ibericum</i>	<i>W.</i>	lign.	s. d.	— <i>Decaisneanus</i>	<i>Vis.</i>	per.	cal.
— <i>rectum</i>	<i>Ser.</i>	lign.	s. d.	— <i>exsculptus</i>	<i>Ott.</i>	per.	cal.
— <i>suffruticosum</i>	<i>Vill.</i>	lign.	s. d.	— <i>gibbosus</i>	<i>Hort.</i>	per.	cal.
<i>Draba aizoides</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>ingens</i>	<i>Zuccar.</i>	per.	cal.
— <i>confusa</i>	<i>Ehrh.</i>	per.	s. d.	— <i>mammulosus</i>	<i>Lehm.</i>	per.	cal.
— <i>hirta</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>obvallatus</i>	<i>DC.</i>	per.	cal.
— <i>lapponica</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.	— <i>Ottonis</i>	<i>Lehm.</i>	per.	cal.
— <i>Muricella</i>	<i>Wahlb.</i>	per.	s. d.	— <i>pruinosis</i>	<i>Ott.</i>	per.	cal.
— <i>tridentata</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.	— <i>robustus</i>	<i>Link.</i>	per.	cal.
— <i>Unalaschkiana</i>	<i>DC.</i>	bien.	s. d.	— <i>Scopa</i>	<i>Link.</i>	per.	cal.
— <i>verna</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>sulcatus</i>	<i>Link.</i>	per.	cal.
<i>Dracaena arborea</i>	<i>Lk.</i>	lign.	cal.	— <i>tenuispinus</i>	<i>Link.</i>	per.	cal.
— <i>brasiliensis</i>	<i>Hort.</i>	lign.	cal.	<i>Echinochloa muricata</i>	<i>Kstlz.</i>	ann.	s. d.
— <i>Draco</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.	<i>Echinops bannaticus</i>	<i>Roch.</i>	per.	s. d.
— <i>ferrea</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.	— <i>exaltatus</i>	<i>Schrad.</i>	bien.	s. d.
— <i>variegata</i>	<i>Hort.</i>	lign.	cal.	— <i>persicus</i>	<i>Steph.</i>	ann.	s. d.
— <i>fragrans</i>	<i>Gawl.</i>	lign.	cal.	— <i>sphaerocephalus</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>marginata</i>	<i>Lam.</i>	lign.	cal.	— <i>Tournefortii</i>	<i>Led.</i>	per.	s. d.
— <i>reflexa</i>	<i>Lam.</i>	lign.	cal.	— <i>viscosus</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.
— <i>salicifolia</i>	<i>Hort.</i>	lign.	cal.	<i>Echinospermum cristatum</i>	<i>H. Petrop.</i>	ann.	s. d.
<i>Dracocephalum altaicense</i>	<i>Laxm.</i>	per.	s. d.	— <i>heteracanthum</i>	<i>Led.</i>	ann.	s. d.
— <i>argunense</i>	<i>Fisch.</i>	per.	s. d.	— <i>Lappula</i>	<i>Sw.</i>	ann.	sp.
— <i>austriacum</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>lejocarpum</i>	<i>Fisch.</i>	ann.	s. d.
— <i>canariense</i>	<i>L.</i>	per.	frig.	<i>Echites purpurea</i>	<i>H. Pat.</i>	lign.	cal.
— <i>integrifolium</i>	<i>Bung.</i>	per.	s. d.	<i>Echium australe</i>	<i>Lam.</i>	ann.	s. d.
— <i>peregrinum</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>candicans</i>	<i>L. fil.</i>	lign.	cal.
— <i>speciosum</i>	<i>Benth.</i>	per.	tep.	— <i>fastuosum</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	cal.
— <i>thymiflorum</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>foliosum</i>	<i>Lehm.</i>	lign.	cal.
<i>Dracopis amplexicaulis</i>	<i>Css.</i>	ann.	s. d.	— <i>giganteum</i>	<i>L. fil.</i>	lign.	cal.
<i>Drimia lanceaefolia</i>	<i>Gawl.</i>	per.	frig.	— <i>grandiflorum</i>	<i>Desf.</i>	per.	s. d.
— <i>purpurascens</i>	<i>Jacq.</i>	per.	frig.	— <i>italicum</i>	<i>L.</i>	bien.	sp.
<i>Dryandra armata</i>	<i>R. Br.</i>	lign.	frig.	— <i>lineatum</i>	<i>Jacq. fil.</i>	lign.	s. d.
<i>Dryas octopetala</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>orientale</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
<i>Drymaria cordata</i>	<i>W.</i>	ann.	s. d.	— <i>plantagineum</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>cubensis</i>	<i>H. Ber.</i>	ann.	s. d.	— <i>violaceum</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>divaricata</i>	<i>Humb.</i>	ann.	s. d.	— <i>vulgare</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>gracilis</i>	<i>Link.</i>	ann.	s. d.	— <i>Wierzbickii</i>	<i>Hab.</i>	bien.	s. d.
<i>Drypis spinosa</i>	<i>L.</i>	bien.	s. d.	<i>Eclipta erecta</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
<i>Dubyaea sonchoides</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.	— <i>procumbens</i>	<i>Michx.</i>	ann.	s. d.
<i>Duranta Ellisia</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.	<i>Eclopes trinervis</i>	<i>Less.</i>	lign.	tep.
— <i>microphylla</i>	<i>Desf.</i>	lign.	frig.	<i>Edwardia grandiflora</i>	<i>Sal.</i>	lign.	frig.
— <i>Plumieri</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.	— <i>microphylla</i>	<i>Salisb.</i>	lign.	frig.
<i>Duvaua dependens</i>	<i>DC.</i>	lign.	frig.	<i>Ebrharta panicea</i>	<i>Sm.</i>	per.	frig.
<i>Dyckia remotiflora</i>	<i>Ott.</i>	per.	cal.	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
<i>Dyssodia chrysanthemoides</i>	<i>Lag.</i>	ann.	s. d.	— <i>— fusca</i>	<i>Hort.</i>	lign.	s. d.
				— <i>— tidiensis</i>	<i>H. V.</i>	lign.	s. d.

<i>Elaeagnus ferruginea</i> Rich.	lign.	cal.	<i>Epilobium mexicanum</i> Moc.	ann.	s. d.
— <i>songarica</i> Fisch.	lign.	s. d.	— <i>minutum</i> Lindl.	ann.	s. d.
<i>Elaeis melanococca</i> Gärtn.	lign.	cal.	— <i>montanum</i> L.	per.	sp.
<i>Elaeodendron orientale</i> Jcy.	lign.	cal.	— <i>tetragonum</i> L.	per.	sp.
<i>Elate sylvestris</i> L.	lign.	cal.	— <i>tomentosum</i> Vent.	per.	s. d.
<i>Elatine hexandra</i> DC.	per.	sp.	<i>Epimedium alpinum</i> L.	per.	sp.
<i>Eleocharis acicularis</i> R. Br.	ann.	sp.	— <i>macranthum</i> Lindl.	per.	s. d.
— <i>ovata</i> R. Br.	ann.	sp.	<i>Epipactis latifolia</i> Sw.	per.	sp.
— <i>palustris</i> R. Br.	ann.	sp.	— <i>microphylla</i> Sw.	per.	sp.
— <i>minor</i> Pers.	ann.	sp.	<i>Epiphyllum Achermannii</i>		
<i>Eleusine indica</i> Gärtn.	ann.	s. d.	— <i>album</i> Haw.	lign.	cal.
— <i>oligostachya</i> Lk.	ann.	s. d.	— <i>Altensteinii</i> Pfeiff.	lign.	cal.
— <i>Tocussa</i> Fresen.	ann.	s. d.	— <i>truncatum</i> Haw.	lign.	cal.
— <i>tristachya</i> Kunth	ann.	s. d.	— <i>coccineum</i> Hort.	lign.	cal.
<i>Ellisia Nyctelaea</i> W.	ann.	s. d.	<i>Episcia melittifolia</i> Mart.	per.	cal.
<i>Elsholtzia cristata</i> W.	ann.	s. d.	— <i>japonica</i> Trin.	per.	s. d.
<i>Elymus canadensis</i> L.	per.	s. d.	— <i>megastachya</i> Link	ann.	sp.
— <i>caput Medusae</i> L.	per.	s. d.	— <i>pilosa</i> Beauv.	ann.	sp.
— <i>crinitus</i> Schreb.	ann.	s. d.	— <i>poaeformis</i> Link	ann.	sp.
— <i>giganteus</i> Vahl	per.	s. d.	<i>Eranthis hyemalis</i> Salisb.	per.	sp.
— <i>Hystrix</i> L.	ann.	s. d.	<i>Erechtites hieracifolia</i> Raf.	ann.	s. d.
— <i>major</i> Fres.	ann.	s. d.	<i>Eranthemum bicolor</i> Schrk	lign.	cal.
— <i>nardianus</i> H. Genev.	per.	s. d.	— <i>microphyllum</i> R. Br.	lign.	cal.
— <i>propinquus</i> Fresen.	per.	s. d.	— <i>nervosum</i> Vahl	lign.	cal.
— <i>sabulosus</i> Bieb.	per.	s. d.	— <i>parviflorum</i> R. Br.	lign.	cal.
— <i>sibiricus</i> L.	per.	s. d.	<i>Eremostachys laciniata</i> Bng.	per.	s. d.
— <i>striatus</i> W.	per.	s. d.	<i>Eria stellata</i> Lindl.	per.	cal.
— <i>teuer</i> L. fil.	per.	s. d.	<i>Erianthus Ravennae</i> Beauv.	per.	s. d.
— <i>villosus</i> Muhlbg.	per.	s. d.	<i>Erica arborea</i> L.	lign.	sp.
<i>Emex spinosa</i> Cambess.	ann.	s. d.	— <i>aggregata</i> Wendl.	lign.	frig.
<i>Emilia sagittata</i> DC.	ann.	s. d.	— <i>Bowieana</i> Lodd.	lign.	frig.
<i>Encelia canescens</i> Lam.	lign.	tep.	— <i>caffra</i> L.	lign.	frig.
<i>Encephalartus horridus</i>			— <i>campanulata</i> Andr.	lign.	frig.
— <i>pungens</i> Lehm.	lign.	cal.	— <i>canaliculata</i> Andr.	lign.	frig.
<i>Enchysia repens</i> Presl.	per.	frig.	— <i>capitata</i> L.	lign.	s. d.
<i>Endoptera aspera</i> DC.	ann.	s. d.	— <i>carnea</i> L.	per.	s. d.
— <i>Dioscoridis</i> DC.	ann.	s. d.	— <i>Chamaetetrax</i> Tsch.	lign.	frig.
<i>Entelea arborescens</i> R. Br.	lign.	cal.	— <i>coccinea</i> Berg.	lign.	frig.
<i>Epacris grandiflora</i> Sm.	lign.	frig.	— <i>colorans</i> Andr.	lign.	frig.
— <i>impressa</i> Labill.	lign.	frig.	— <i>comosa</i> L.	lign.	frig.
— <i>onosmaeflora</i> Cunn.	lign.	frig.	— <i>rubra</i> Hort.	lign.	frig.
— <i>pulchella</i> Cav.	lign.	frig.	— <i>cornuta</i> Roxb.	lign.	frig.
— <i>purpurascens</i> R. Br.	lign.	frig.	— <i>cruenta</i> Ait.	lign.	frig.
— <i>variabilis</i> Lodd.	lign.	frig.	— <i>cucullata</i> Tausch	lign.	frig.
<i>Ephedra altissima</i> Desf.	lign.	frig.	— <i>curvirostris</i> Salisb.	lign.	frig.
— <i>distachya</i> L.	lign.	frig.	— <i>cylindrica</i> Wendl.	lign.	tep.
— <i>minor</i> Host	lign.	s. d.	— <i>decumbens</i> H. Angl.	lign.	frig.
<i>Epidendrum cochleatum</i> L.	per.	cal.	— <i>discolor</i> Andr.	lign.	frig.
— <i>elongatum</i> Jacq.	per.	cal.	— <i>Ewerana</i> Ait.	lign.	frig.
<i>Epilobium augustifolium</i> L.	per.	sp.	— <i>floribunda</i> Lodd.	lign.	frig.
— <i>coloratum</i> Muhlbg.	per.	s. d.	— <i>globosa</i> Andr.	lign.	frig.
— <i>davuricum</i> Fisch.	per.	s. d.	— <i>gracilis</i> Wend.	lign.	frig.
— <i>denticulatum</i> Wndr.	per.	s. d.	— <i>hispidula</i> L. fil.	lign.	frig.
— <i>hirsutum</i> L.	per.	sp.	— <i>ignescens</i> Andr.	lign.	frig.
— <i>hypericifolium</i> Tsch.	per.	s. d.			

Erica	Lachnea	<i>Andr.</i>	lign.	frig.	Eryngium	Hohenackeri	<i>F. M.</i>	ann.	s. d.
—	lanuginosa	<i>Andr.</i>	lign.	frig.	—	Lens	<i>L.</i>	ann.	s. d.
—	Leeana	<i>Ait.</i>	lign.	frig.	—	sardoum	<i>Moris</i>	ann.	s. d.
—	— superba	<i>H. Hüg.</i>	lign.	frig.	—	tetraspermum	<i>L.</i>	ann.	s. d.
—	mediterranea	<i>L.</i>	lign.	frig.	Eryngium	amethystinum	<i>L.</i>	per.	sp.
—	multumbellif.	<i>Tsch.</i>	lign.	frig.	—	Bourgati	<i>Gou.</i>	per.	s. d.
—	multiflora	<i>L.</i>	lign.	frig.	—	campestre	<i>L.</i>	per.	sp.
—	paniculata	<i>L.</i>	lign.	frig.	—	creticum	<i>Lam.</i>	per.	s. d.
—	patens	<i>Andr.</i>	lign.	frig.	—	dichotomum	<i>Desf.</i>	per.	s. d.
—	rubens	<i>Andr.</i>	lign.	frig.	—	falcatum	<i>Delar.</i>	per.	s. d.
—	sparsa	<i>Hort.</i>	lign.	frig.	—	foetidum	<i>L.</i>	bien.	s. d.
—	striata	<i>Don</i>	lign.	s. d.	—	maritimum	<i>L.</i>	per.	s. d.
—	tenuifolia	<i>L.</i>	lign.	frig.	—	multifidum	<i>Sibth.</i>	per.	s. d.
—	transparens	<i>Andr.</i>	lign.	frig.	—	planum	<i>L.</i>	per.	s. d.
—	triflora	<i>L.</i>	lign.	frig.	—	rigidum	<i>Lam.</i>	per.	s. d.
—	umbellata	<i>L.</i>	lign.	frig.	—	tricuspidatum	<i>L.</i>	bien.	s. d.
—	vestita	<i>Thunb.</i>	lign.	frig.	—	tripartitum	<i>Desf.</i>	per.	s. d.
—	— rosea	<i>Andr.</i>	lign.	frig.	—	triquetrum	<i>Vahl</i>	per.	s. d.
—	viridiflora	<i>Andr.</i>	lign.	frig.	Erysimum	Allioni	<i>L.</i>	bien.	sp.
Erigeron	acre	<i>L.</i>	bien.	sp.	—	altissimum	<i>Lej.</i>	bien.	s. d.
—	alpinum	<i>L.</i>	per.	s. d.	—	Andrzeioskianum			
—	armerifolium	<i>Turcz.</i>	per.	s. d.			<i>Bess.</i>	bien.	s. d.
—	asperulum	<i>F. et M.</i>	ann.	s. d.	—	canescens	<i>Roth</i>	bien.	s. d.
—	canadense	<i>L.</i>	ann.	sp.	—	carniolicum	<i>Dollin.</i>	bien.	s. d.
—	elongatum	<i>Led.</i>	bien.	s. d.	—	crassipes	<i>F. et M.</i>	bien.	s. d.
—	glabellum	<i>Nutt.</i>	per.	s. d.	—	crepidifolium	<i>Rchb.</i>	bien.	s. d.
—	maximum	<i>Link</i>	per.	s. d.	—	cuspidatum	<i>DC.</i>	bien.	s. d.
—	podolicum	<i>Bess.</i>	per.	s. d.	—	lanceolatum	<i>R. Br.</i>	bien.	sp.
—	purpureum	<i>Ait.</i>	per.	s. d.	—	longisiliquum	<i>W.</i>	bien.	s. d.
—	speciosum	<i>DC.</i>	per.	s. d.	—	perfoliatum	<i>Crantz</i>	ann.	s. d.
Erinus	alpinus	<i>L.</i>	per.	s. d.	—	planisiliquum	<i>Steud.</i>	ann.	s. d.
Eriobotrya	japonica	<i>Lindl.</i>	lign.	s. d.	—	versicolor	<i>Andrz.</i>	bien.	s. d.
Eriocephalus	septifer	<i>Cass.</i>	lign.	frig.	—	viscosum	<i>Andrz.</i>	bien.	s. d.
Eriosynaphe	tortuosa	<i>F. M.</i>	bien.	s. d.	Erythraea	Centaurium	<i>Prs.</i>	ann.	sp.
Erodium	arabicum	<i>Decaisn.</i>	ann.	s. d.	—	pulchella	<i>Fries</i>	per.	sp.
—	ciconium	<i>W.</i>	ann.	sp.	—	spicata	<i>Pers.</i>	ann.	sp.
—	cicutarium	<i>W.</i>	ann.	sp.	Erythrina	caffra	<i>Thunb.</i>	lign.	cal.
—	— pimpinellifol.	<i>W.</i>	ann.	sp.	—	Corallodendron	<i>L.</i>	lign.	cal.
—	Gussoni	<i>Tenor.</i>	per.	s. d.	—	Cristagalli	<i>L.</i>	lign.	cal.
—	hymenodes	<i>Herit.</i>	per.	s. d.	—	— Andersoni	<i>Hort.</i>	lign.	cal.
—	laciniatum	<i>W.</i>	ann.	s. d.	—	— laurifolia	<i>Hort.</i>	lign.	cal.
—	malacoides	<i>W.</i>	ann.	s. d.	—	— herbacea	<i>L.</i>	lign.	cal.
—	melanostigma	<i>Mart.</i>	ann.	s. d.	Erythronium	dens canis	<i>L.</i>	per.	sp.
—	moschatum	<i>W.</i>	ann.	s. d.	Escallonia	coccinea	<i>Hort.</i>	lign.	frig.
—	Salzmanni	<i>Delil.</i>	ann.	s. d.	—	crenulata	<i>Poir.</i>	lign.	frig.
—	stellatum	<i>Delil.</i>	ann.	s. d.	—	floribunda	<i>Humb.</i>	lign.	frig.
—	Stephanianum	<i>W.</i>	per.	s. d.	—	montevidensis	<i>DC.</i>	lign.	frig.
—	verbenaefolium	<i>Del.</i>	ann.	s. d.	—	rubra	<i>Pers.</i>	lign.	frig.
Eruca	turgida	<i>Vis.</i>	ann.	s. d.	—	speciosa	<i>Hort.</i>	lign.	frig.
—	sativa	<i>Lam.</i>	ann.	s. d.	—	viscosa	<i>Lk.</i>	lign.	frig.
Erucastrum	arabicum	<i>F. M.</i>	ann.	s. d.	Eschscholtzia	californica			
—	Pollichii	<i>Schimp.</i>	per.	s. d.			<i>Chmss.</i>	per.	s. d.
Eryum	Camelorum	<i>Spr.</i>	ann.	s. d.	—	— crocea	<i>Bnth.</i>	per.	s. d.
—	Ervilia	<i>L.</i>	ann.	s. d.	Ethulia	angustifolia	<i>Boj.</i>	ann.	s. d.
—	gracile	<i>DC.</i>	ann.	sp.	—	corymbosa	<i>H. Ber.</i>	ann.	s. d.
—	hirsutum	<i>L.</i>	ann.	sp.	Eucalyptus	amygdalina	<i>Labl.</i>	lign.	frig.

<i>Eucalyptus obliqua</i>	<i>Herit.</i>	lign.	frig.	<i>Euphorbia melanopetala</i>			
— ovata	<i>Labill.</i>	lign.	frig.	— meloformis	<i>Ait.</i>	lign.	s. d.
— resinifera	<i>Sm.</i>	lign.	frig.	— multangularis	<i>Haw.</i>	lign.	cal.
— salicifolia	<i>Cav.</i>	lign.	frig.	— Myrsinites	<i>L.</i>	per.	s. d.
<i>Eucomis punctata</i>	<i>Ait.</i>	per.	frig.	— — erecta	<i>H. Pat.</i>	per.	frig.
— undulata	<i>Ait.</i>	per.	frig.	— nereifolia	<i>L.</i>	lign.	cal.
<i>Eugenia acris</i>	<i>Wight et A.</i>	lign.	cal.	— nicaeensis	<i>All.</i>	per.	sp.
— Michellii	<i>Lam.</i>	lign.	cal.	— officinarum	<i>L.</i>	lign.	cal.
<i>Eupatorium adenophorum</i>	<i>Spr.</i>	per.	tep.	— Ornithopus	<i>Jacq.</i>	lign.	cal.
— calaminthifol.	<i>Hmb.</i>	per.	tep.	— pallida	<i>W.</i>	per.	s. d.
— cannabinum	<i>L.</i>	per.	sp.	— palustris	<i>L.</i>	per.	s. d.
— — integrifolium	<i>W.</i>	per.	sp.	— Peplus	<i>L.</i>	ann.	sp.
— chilense	<i>Molin.</i>	per.	frig.	— persica	<i>H. Vind.</i>	per.	s. d.
— deltoideum	<i>Jacq.</i>	per.	frig.	— pilosa	<i>L.</i>	per.	sp.
— Morisii	<i>H. Pat.</i>	per.	tep.	— piscatoria	<i>Ait.</i>	lign.	cal.
— purpureum	<i>L.</i>	per.	s. d.	— Pithyusa	<i>L.</i>	per.	s. d.
— sessilifolium	<i>L.</i>	per.	s. d.	— platyphylla	<i>L.</i>	per.	sp.
— syriacum	<i>Jacq.</i>	per.	frig.	— procera	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.
— trifoliatum	<i>L.</i>	per.	s. d.	— prostrata	<i>Ait.</i>	per.	s. d.
<i>Euphorbia aleppica</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— salicifolia	<i>Host</i>	per.	s. d.
— amygdaloides	<i>L.</i>	per.	sp.	— spinosa	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— Anacantha	<i>Ait.</i>	lign.	cal.	— splendens	<i>Boj.</i>	lign.	cal.
— antiquorum	<i>L.</i>	lign.	cal.	— — Breoni	<i>Hort.</i>	lign.	cal.
— atropurpurea	<i>Brous.</i>	lign.	cal.	— Tirucalli	<i>L.</i>	lign.	cal.
— Bojeri	<i>Hook.</i>	lign.	cal.	— trigona	<i>Haw.</i>	lign.	cal.
— caespitosa	<i>Tenor.</i>	per.	s. d.	— trinervis	<i>Bertol.</i>	ann.	sp.
— canariensis	<i>L.</i>	lign.	cal.	— uralensis	<i>Fisch.</i>	per.	s. d.
— caput Medusae	<i>L.</i>	lign.	cal.	— variegata	<i>Colla</i>	ann.	s. d.
— Chamaesyce	<i>L.</i>	ann.	sp.	— veneta	<i>W.</i>	lign.	s. d.
— Characias	<i>L.</i>	lign.	sp.	— verrucosa	<i>L.</i>	per.	sp.
— cyathophora	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— virgata	<i>W. et K.</i>	per.	s. d.
— Cyparissias	<i>L.</i>	per.	sp.	<i>Euphoria Litchi</i>	<i>Desf.</i>	lign.	cal.
— dendroides	<i>L.</i>	lign.	frig.	<i>Euphrasia lutea</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— dentata	<i>Michx.</i>	ann.	s. d.	— officinalis	<i>L.</i>	ann.	sp.
— dulcis	<i>L.</i>	per.	sp.	<i>Eurya latifolia</i>	<i>Hort.</i>	lign.	tep.
— erosa	<i>W.</i>	lign.	cal.	<i>Eurybia argophylla</i>	<i>Cass.</i>	lign.	frig.
— exigua	<i>L.</i>	ann.	sp.	— erubescens	<i>DC.</i>	lign.	frig.
— retusa	<i>Cav.</i>	ann.	sp.	— ilicifolia	<i>DC.</i>	lign.	frig.
— falcata	<i>L.</i>	ann.	sp.	— myrsinoides	<i>DC.</i>	lign.	frig.
— fructus pini	<i>Mill.</i>	lign.	cal.	<i>Eurycles sylvestris</i>	<i>Salisb.</i>	per.	cal.
— fulgens	<i>Karw.</i>	lign.	cal.	<i>Euslenia albida</i>	<i>Nutt.</i>	per.	tep.
— geniculata	<i>Orteg.</i>	ann.	s. d.	<i>Eutaxia Baxteri</i>	<i>Knowl.</i>	lign.	frig.
— globosa	<i>Sims.</i>	lign.	cal.	— virgata	<i>Benth.</i>	lign.	frig.
— grandidens	<i>Haw.</i>	lign.	cal.	<i>Eutoca Menziesii</i>	<i>R. Br.</i>	ann.	s. d.
— helioscopia	<i>L.</i>	ann.	sp.	— viscida	<i>Benth.</i>	ann.	s. d.
— heptagona	<i>L.</i>	lign.	cal.	— Wrangeliana	<i>F. M.</i>	ann.	s. d.
— hypericifolia	<i>L.</i>	ann.	s. d.	<i>Eutriana curtispindula</i>	<i>Trin.</i>	per.	s. d.
— italica	<i>Lam.</i>	ann.	s. d.	<i>Evonymus americanus</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— lactea	<i>Haw.</i>	lign.	cal.	— angustifolius	<i>Pursh</i>	lign.	s. d.
— Lagascae	<i>Spr.</i>	ann.	s. d.	— atropurpureus	<i>Jacq.</i>	lign.	s. d.
— Lathyris	<i>L.</i>	bien.	s. d.	— europaeus	<i>L.</i>	lign.	sp.
— loricata	<i>Lam.</i>	lign.	cal.	— japonicus	<i>L. fil.</i>	lign.	s. d.
— lucida	<i>W. et K.</i>	per.	s. d.	— — varieg.	<i>Hort.</i>	lign.	s. d.
— mammillaris	<i>L.</i>	lign.	cal.	— verrucosus	<i>Scop.</i>	lign.	s. d.
— mauritanica	<i>L.</i>	lign.	cal.				

<i>Faba vulgaris</i>	Mill.	ann.	s. d.	<i>Ficus Carica</i>	L.	lign.	sp.
<i>Fabiana imbricata</i>	R. et P.	lign.	tep.	— <i>cerasiformis</i>	Parmt.	lign.	cal.
<i>Fabricia laevigata</i>	Sm.	lign.	frig.	— <i>cordata</i>	Thunb.	lign.	cal.
— <i>myrsifolia</i>	Gaertn.	lign.	frig.	— <i>crassinervia</i>	Desf.	lign.	cal.
<i>Fagelia bituminosa</i>	DC.	lign.	tep.	— <i>Dumontii</i>	Hort.	lign.	frig.
<i>Fagus comptoniaefolia</i>	Desf.	lign.	s. d.	— <i>elastica</i>	Roxb.	lign.	frig.
— <i>sylvatica</i>	L.	lign.	sp.	— <i>exasperata</i>	Vahl.	lign.	cal.
— — <i>argentea</i>	Hort.	lign.	s. d.	— <i>ferruginea</i>	Parment.	lign.	cal.
— — <i>atropurpurea</i>	Ht.	lign.	s. d.	— <i>heterophylla</i>	L. fil.	lign.	cal.
— — <i>cuprea</i>	Hort.	lign.	s. d.	— <i>hispidia</i>	L. fil.	lign.	cal.
— — <i>pendula</i>	Hort.	lign.	s. d.	— <i>indica</i>	L.	lign.	cal.
<i>Falcaria Rivini</i>	Host	per.	s. d.	— <i>laurifolia</i>	Lam.	lign.	cal.
<i>Falkia repens</i>	L.	per.	frig.	— <i>lutescens</i>	Parment.	lign.	cal.
<i>Farsetia clypeata</i>	R. Br.	bien.	sp.	— <i>macrophylla</i>	Desf.	lign.	cal.
— <i>eriocarpa</i>	DC.	lign.	s. d.	— <i>nitida</i>	Thunb.	lign.	cal.
— <i>lunarioides</i>	R. Br.	lign.	s. d.	— <i>phytolaccaefolia</i>	Desf.	lign.	cal.
— <i>triquetra</i>	DC.	lign.	s. d.	— <i>populnea</i>	W.	lign.	cal.
<i>Fedia Cornucopiae</i>	Vahl.	ann.	s. d.	— <i>pumila</i>	L.	lign.	cal.
<i>Felicia tenella</i>	Nees	ann.	s. d.	— <i>racemosa</i>	L.	lign.	cal.
<i>Ferraria undulata</i>	L.	per.	frig.	— <i>religiosa</i>	L.	lign.	cal.
<i>Ferula campestris</i>	Bess.	per.	s. d.	— <i>rubiginosa</i>	Desf.	lign.	cal.
— <i>communis</i>	L.	per.	s. d.	— <i>Saussureana</i>	DC.	lign.	cal.
— <i>Ferulago</i>	L.	per.	s. d.	— <i>stipulata</i>	Thunb.	lign.	tep.
— <i>glauca</i>	L.	per.	s. d.	— <i>Sycomorus</i>	L.	lign.	cal.
— <i>neapolitana</i>	Tenor.	per.	s. d.	— <i>ulmifolia</i>	Lam.	lign.	cal.
— <i>seseloides</i>	C. A. M.	per.	s. d.	<i>Filago gallica</i>	L.	ann.	sp.
— <i>thyrsiflora</i>	Sibth.	per.	s. d.	— <i>germanica</i>	L.	ann.	sp.
— <i>tingitana</i>	L.	per.	s. d.	— <i>montana</i>	L.	ann.	sp.
<i>Festuca duriuscula</i>	L.	per.	sp.	— — <i>minima</i>	Pers.	ann.	sp.
— <i>elatior</i>	L.	per.	sp.	<i>Fimbristylis annua</i>	R. Br.	ann.	sp.
— <i>Fenas</i>	Lag.	per.	s. d.	— <i>dichotoma</i>	Vahl.	ann.	sp.
— <i>gigantea</i>	Vill.	per.	s. d.	<i>Firmiana platanifolia</i>	Endl.	lign.	s. d.
— <i>glauca</i>	Lam.	per.	s. d.	<i>Flacourtia Ramontchi</i>	Her.	lign.	cal.
— <i>heterophylla</i>	Haenk.	per.	s. d.	<i>Flaveria repanda</i>	Lagasc.	ann.	s. d.
— <i>holiacea</i>	Huds.	per.	sp.	<i>Flemingia congesta</i>	Roxb.	lign.	cal.
— <i>ovina</i>	L.	per.	sp.	— <i>strobilifera</i>	R. Br.	lign.	cal.
— <i>purpurascens</i>	Hrt.	per.	s. d.	<i>Florestina pedata</i>	Cass.	ann.	s. d.
— <i>pannonica</i>	Wulf.	per.	s. d.	<i>Foeniculum piperitum</i>	DC.	bien.	s. d.
— <i>polyantha</i>	Hall. fil.	per.	s. d.	— <i>vulgare</i>	Gaertn.	bien.	s. d.
— <i>pratensis</i>	Huds.	per.	sp.	<i>Fontanesia phylliraeoides</i>	Labill.	lign.	s. d.
— <i>rigida</i>	Kunth	per.	sp.	— <i>Forskohlea candida</i>	L. fil.	per.	cal.
— <i>rubra</i>	L.	per.	s. d.	— <i>viridis</i>	Ehrb.	ann.	s. d.
— — <i>dumetorum</i>	L.	per.	s. d.	<i>Fothergilla alnifolia</i>	L.	lign.	s. d.
— <i>spadicea</i>	Gouan	per.	s. d.	<i>Fourcroya gigantea</i>	Vent.	lign.	cal.
— <i>tenuiflora</i>	Schrad.	ann.	s. d.	— <i>tuberosa</i>	Ait.	lign.	cal.
— <i>vaginata</i>	W. et K.	per.	s. d.	<i>Fragaria indica</i>	Andr.	per.	s. d.
— <i>valesiaca</i>	Gaud.	per.	s. d.	— <i>vesca</i>	L.	per.	s. d.
— <i>varia</i>	Haenk.	per.	s. d.	<i>Francoa appendiculata</i>	Cav.	per.	tep.
— — <i>flavescens</i>	Bell.	per.	s. d.	— <i>sonchifolia</i>	Cav.	per.	tep.
<i>Ficaria ranunculoides</i>	Moench	per.	sp.	<i>Franciscea uniflora</i>	Pohl.	lign.	cal.
<i>Ficus aurantiaca</i>	Wall.	lign.	cal.	<i>Frankenia laevis</i>	L.	per.	frig.
— <i>benghalensis</i>	L.	lign.	cal.	<i>Franseria artemisioides</i>	W.	lign.	frig.
— <i>beniamina</i>	L.	lign.	cal.	<i>Fraxinus acuminata</i>	Lam.	lign.	s. d.
— <i>biglandulosa</i>	Hort.	lign.	cal.	— <i>caroliniana</i>	Lam.	lign.	s. d.
— <i>capensis</i>	Thunb.	lign.	cal.	— <i>excelsior</i>	L.	lign.	s. d.

Fraxinus excelsior argentea	<i>Desf.</i>	lign.	s. d.	Galega officinalis africana	<i>Mill.</i>	per.	s. d.
— aurea	<i>W.</i>	lign.	s. d.	— elatior	<i>Hort</i>	per.	s. d.
— crispa	<i>Bosc</i>	lign.	s. d.	— orientalis	<i>Lam.</i>	per.	s. d.
— horizontalis	<i>Desf.</i>	lign.	s. d.	— persica	<i>Pers.</i>	per.	s. d.
— pendula	<i>Ait.</i>	lign.	s. d.	Galeobdolon luteum	<i>Sm.</i>	per.	s. d.
— heterophylla	<i>Vahl</i>	lign.	s. d.	— Milzadella	<i>H. Pat.</i>	per.	s. d.
— juglandifolia	<i>Lam.</i>	lign.	s. d.	Galeopsis angustifolia	<i>Ehrh.</i>	ann.	s. d.
— lentiscifolia	<i>Desf.</i>	lign.	s. d.	— Ladanum	<i>L.</i>	ann.	sp.
— Ornus	<i>L.</i>	lign.	sp.	— Tetrabit	<i>L.</i>	ann.	sp.
— ovata	<i>Bosc</i>	lign.	s. d.	— versicolor	<i>Curt.</i>	ann.	sp.
— oxycarpa	<i>W.</i>	lign.	s. d.	Galinsoga parviflora	<i>Cav.</i>	ann.	s. d.
— pubescens	<i>Walt.</i>	lign.	s. d.	Galium Aparine	<i>L.</i>	ann.	sp.
— pumila	<i>H. Angl.</i>	lign.	s. d.	— aristatum	<i>L.</i>	per.	sp.
— quadrangulata	<i>Mich.</i>	lign.	s. d.	— caucasicum	<i>Fisch.</i>	per.	s. d.
— rostrata	<i>H. Paris.</i>	lign.	s. d.	— capillipes	<i>Rechb.</i>	per.	s. d.
— sambucifolia	<i>Lam.</i>	lign.	s. d.	— Crucjata	<i>Scop.</i>	per.	sp.
— viridis	<i>Bosc</i>	lign.	s. d.	— divaricatum	<i>Lam.</i>	ann.	s. d.
Fritillaria imperialis	<i>L.</i>	per.	s. d.	— lithospermifol.	<i>Fisch.</i>	per.	s. d.
— persica	<i>L.</i>	per.	s. d.	— Mollugo	<i>L.</i>	per.	sp.
— pyrenaica	<i>L.</i>	per.	s. d.	— elatum	<i>Thuill.</i>	per.	sp.
Fuchsia affinis	<i>Hort.</i>	lign.	tep.	— ochroleucum	<i>Kit.</i>	per.	s. d.
— arborescens	<i>Sims</i>	lign.	tep.	— palustre	<i>L.</i>	per.	sp.
— coccinea	<i>L.</i>	lign.	tep.	— hexaphyllum	<i>Vis.</i>	per.	sp.
— salicifolia	<i>Hort.</i>	lign.	tep.	— parisiense	<i>L.</i>	ann.	sp.
— conica	<i>Lindl.</i>	lign.	tep.	— pedemontanum	<i>All.</i>	ann.	sp.
— fulgens	<i>Moc.</i>	lign.	tep.	— persicum	<i>DC.</i>	per.	sp.
— globosa	<i>Lindl.</i>	lign.	tep.	— porrigens	<i>Schrad.</i>	ann.	s. d.
— gracilis	<i>Lindl.</i>	lign.	tep.	— purpureum	<i>L.</i>	lign.	sp.
— macrostemma	<i>R. et P.</i>	lign.	tep.	— rubioides	<i>L.</i>	per.	s. d.
— microphylla	<i>Humb.</i>	lign.	tep.	— satirejaefolium	<i>Trv.</i>	per.	s. d.
— ovalis	<i>R. et P.</i>	lign.	tep.	— sylvaticum	<i>L.</i>	per.	sp.
— rosea	<i>R. et P.</i>	lign.	tep.	— valantioides	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.
Fumaria alexandrina	<i>Ehrb.</i>	ann.	s. d.	— vernum	<i>Scop.</i>	per.	sp.
— capreolata	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— verum	<i>L.</i>	per.	sp.
— media	<i>Loisl.</i>	ann.	s. d.	— Witheringi	<i>Sm.</i>	per.	s. d.
— officinalis	<i>L.</i>	ann.	sp.	Gamolepis annua	<i>Less.</i>	ann.	s. d.
— parviflora	<i>Lam.</i>	ann.	s. d.	Gardenia florida	<i>L.</i>	lign.	frig.
Funkia ovata	<i>Spr.</i>	per.	s. d.	— neriifolia	<i>H. Lan.</i>	lign.	frig.
— Sieboldiana	<i>Lodd.</i>	per.	s. d.	— grandiflora	<i>Lour.</i>	lign.	frig.
— subcordata	<i>Spr.</i>	per.	s. d.	— latifolia	<i>Ait.</i>	lign.	tep.
Gagea arvensis	<i>Schult.</i>	per.	s. d.	— lucida	<i>Roxb.</i>	lign.	tep.
— minima	<i>Rechb.</i>	per.	sp.	— radicans	<i>Thunb.</i>	lign.	tep.
Gagnebina axillaris	<i>DC.</i>	lign.	cal.	— Thunbergia	<i>L. fil.</i>	lign.	tep.
Gaillardia aristata	<i>Pursh</i>	per.	s. d.	Gardoquia betonicoides	<i>Benth.</i>	per.	tep.
— Drummondii	<i>DC.</i>	ann.	s. d.	Garidella Nigellastrum	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— lanceolata	<i>Michx.</i>	per.	s. d.	Garuga pinnata	<i>Roxb.</i>	lign.	frig.
— pulchella	<i>Foug.</i>	ann.	s. d.	Garuleum bipinnatum	<i>Less.</i>	lign.	frig.
Galactites tomentosa	<i>Much.</i>	ann.	s. d.	— viscosum	<i>Cass.</i>	per.	frig.
Galanthus nivalis	<i>L.</i>	per.	sp.	Gastridium australe	<i>Beauv.</i>	ann.	s. d.
Galatea undulata	<i>H. Hügel</i>	per.	frig.	Gaudinia fragilis	<i>Beauv.</i>	ann.	s. d.
Galatella hyssopifolia	<i>Nees</i>	per.	s. d.	— geminiflora	<i>Gay</i>	ann.	s. d.
— linifolia	<i>Nees</i>	per.	s. d.	Gaultheria Shallon	<i>Pursh</i>	lign.	s. d.
— punctata	<i>DC.</i>	per.	s. d.	Gaura biennis	<i>L.</i>	bien.	s. d.
Galega officinalis	<i>L.</i>	per.	sp.				

<i>Gaura mutabilis</i>	<i>Cav.</i>	per.	s. d.	<i>Geranium reflexum</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
<i>Gazania heterophylla</i>	<i>W.</i>	per.	frig.	— <i>robertianum</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>rigens</i>	<i>R. Br.</i>	per.	frig.	— <i>rotundifolium</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>uniflora</i>	<i>Ker</i>	per.	frig.	— <i>sanguineum</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
<i>Gelsemium nitidum</i>	<i>Michx.</i>	lign.	s. d.	— <i>sylvaticum</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
<i>Gendarussa Adhatoda</i>	<i>Steud.</i>	lign.	frig.	— <i>variegatum</i>	<i>Wnder.</i>	per.	s. d.
— <i>furcata</i>	<i>Nees</i>	per.	tep.	— <i>Wallichianum</i>	<i>Swt.</i>	per.	frig.
— <i>vulgaris</i>	<i>Nees</i>	lign.	tep.	<i>Geropogon glaber</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
<i>Genista aethnensis</i>	<i>DC.</i>	lign.	s. d.	<i>Gesneria allagophylla</i>	<i>Mrt.</i>	per.	cal.
— <i>anzantica</i>	<i>Tenor.</i>	lign.	s. d.	— <i>bulbosa</i>	<i>Ker</i>	per.	cal.
— <i>canariensis</i>	<i>L.</i>	lign.	tep.	— <i>corymbosa</i>	<i>Sw.</i>	lign.	cal.
— <i>candicans</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.	— <i>Deppeana</i>	<i>Schlecht.</i>	lign.	cal.
— <i>elatior</i>	<i>Ehrh.</i>	lign.	s. d.	— <i>elongata</i>	<i>Hamb.</i>	per.	cal.
— <i>florida</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>faucialis</i>	<i>Lindl.</i>	per.	cal.
— <i>germanica</i>	<i>L.</i>	lign.	sp.	— <i>rutila</i>	<i>Lindl.</i>	per.	cal.
— <i>linifolia</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.	— <i>Sceptrum</i>	<i>Mart.</i>	per.	cal.
— <i>mantica</i>	<i>Pollin.</i>	lign.	s. d.	— <i>spicata</i>	<i>Humb.</i>	lign.	cal.
— <i>ovata</i>	<i>W. et K.</i>	lign.	s. d.	— <i>splendens</i>	<i>Hort.</i>	lign.	cal.
— <i>prostrata</i>	<i>Lam.</i>	lign.	s. d.	<i>Geum album</i>	<i>Gmel.</i>	per.	s. d.
— <i>pulchella</i>	<i>Vis.</i>	lign.	s. d.	— <i>atlanticum</i>	<i>Desf.</i>	per.	s. d.
— <i>radiata</i>	<i>Scop.</i>	lign.	sp.	— <i>chiloense</i>	<i>Balb.</i>	per.	s. d.
— <i>Scorpius</i>	<i>DC.</i>	lign.	s. d.	— <i>Laxmanni</i>	<i>Gärtn.</i>	per.	s. d.
— <i>sibirica</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>macrophyllum</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.
— <i>tinctoria</i>	<i>L.</i>	lign.	sp.	— <i>pyrenaicum</i>	<i>Ram.</i>	per.	s. d.
— <i>virgata</i>	<i>Pollin.</i>	lign.	s. d.	— <i>Rafinesqueanum</i>	<i>Steud.</i>	per.	s. d.
— <i>triphylla</i>	<i>H. Flor.</i>	lign.	frig.	— <i>rivale</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
<i>Gentiana acaulis</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>strictum</i>	<i>Ait.</i>	per.	s. d.
— <i>Amarella</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>urbanum</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>asclepiadea</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	<i>Gilia achilleaeifolia</i>	<i>Benth.</i>	ann.	s. d.
— <i>bavarica</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>androsacea</i>	<i>Steud.</i>	ann.	s. d.
— <i>cruciata</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>capitata</i>	<i>Dougl.</i>	ann.	s. d.
— <i>imbricata</i>	<i>Froel.</i>	per.	s. d.	— <i>coronopifolia</i>	<i>Pers.</i>	bien.	s. d.
— <i>lutea</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>eryngioides</i>	<i>Lehm.</i>	ann.	s. d.
— <i>nivalis</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>Leptosiphon</i>	<i>Steud.</i>	ann.	s. d.
— <i>Pneumonanthe</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>millefoliata</i>	<i>F. et M.</i>	ann.	s. d.
<i>Geranium aconitifolium</i>				— <i>parviflora</i>	<i>Spr.</i>	ann.	s. d.
— <i>affine</i>	<i>Herit.</i>	per.	s. d.	— <i>tricolor</i>	<i>Benth.</i>	ann.	s. d.
— <i>angulatum</i>	<i>Led.</i>	per.	s. d.	<i>Ginkgo biloba</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>batrachyoides</i>	<i>Curt.</i>	per.	s. d.	<i>Gladiolus angustus</i>	<i>L.</i>	per.	frig.
— <i>carolinianum</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>byzantinus</i>	<i>Mill.</i>	per.	s. d.
— <i>collinum</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.	— <i>carneus</i>	<i>Jacq.</i>	per.	frig.
— <i>columbinum</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>communis</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>cristatum</i>	<i>Stev.</i>	per.	s. d.	— <i>cuspidatus</i>	<i>Jacq.</i>	per.	frig.
— <i>dissectum</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>trimaculatus</i>	<i>Lm.</i>	per.	frig.
— <i>divaricatum</i>	<i>Ehrh.</i>	bien.	s. d.	— <i>dichotomus</i>	<i>Thunb.</i>	per.	frig.
— <i>eriosomon</i>	<i>Fisch.</i>	per.	s. d.	— <i>hastatus</i>	<i>Gawl.</i>	per.	frig.
— <i>Londesii</i>	<i>Fisch.</i>	per.	s. d.	— <i>natalensis</i>	<i>Reinw.</i>	per.	frig.
— <i>lucidum</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>ramosus</i>	<i>H. Pat.</i>	per.	frig.
— <i>macrorrhizon</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>segetum</i>	<i>Ker</i>	per.	sp.
— <i>molle</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>fl. albo</i>	<i>Hort.</i>	per.	s. d.
— <i>nepalense</i>	<i>Sweet</i>	per.	frig.	— <i>tristis</i>	<i>L.</i>	per.	frig.
— <i>nodosum</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>undulatus</i>	<i>Jacq.</i>	per.	frig.
— <i>phaeum</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Glauicum corniculatum</i>			
— <i>platypetalum</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>fulvum</i>	<i>Curt.</i>	ann.	s. d.
— <i>pyrenaicum</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.		<i>Sm.</i>	bien.	s. d.

<i>Glaucium luteum</i>	Scop.	bien.	s. d.	<i>Gomphrena decumbens</i>	Jacq.	ann.	s. d.
<i>Gleditschia caspica</i>	Desf.	lign.	s. d.	— globosa	L.	ann.	s. d.
— ferox	Desf.	lign.	s. d.	— intermedia	Hort.	per.	frig.
— macroacantha	Desf.	lign.	s. d.	<i>Goodenia grandiflora</i>	Sims	bien.	frig.
— sinensis	Lam.	lign.	s. d.	<i>Goodia lotifolia</i>	Salisb.	lign.	cal.
— triacanthos	L.	lign.	s. d.	<i>Goodyera discolor</i>	Ker.	per.	cal.
— inermis	Hort.	lign.	s. d.	<i>Gordonia pubescens</i>	Lam.	lign.	s. d.
<i>Globba marantina</i>	L.	per.	cal.	<i>Gossypium arboreum</i>	L.	lign.	cal.
<i>Globularia Alypum</i>	L.	lign.	frig.	— herbaceum	L.	ann.	s. d.
— nudicaulis	L.	per.	s. d.	— religiosum	W.	lign.	cal.
— salicina	Lam.	lign.	tep.	<i>Gouania domingensis</i>	L.	lign.	cal.
— vulgaris	L.	per.	sp.	<i>Gouffejaholosteoides</i>	C.A.M.	ann.	s. d.
<i>Globulea canescens</i>	Haw.	per.	cal.	<i>Grabowskia boerhaviaefol.</i>	Schldt.	lign.	frig.
— cultrata	Haw.	per.	cal.	<i>Grammanthes chloraefolia</i>	DC.	ann.	s. d.
— obvallata	Haw.	lign.	cal.	<i>Grammitis Ceterach</i>	Sw.	per.	sp.
<i>Gloriosa superba</i>	L.	per.	cal.	<i>Gratiola officinalis</i>	L.	per.	sp.
<i>Gloxinia arborea</i>	Colla	lign.	cal.	<i>Grevillea acanthifolia</i>	Sieb.	lign.	frig.
— caulescens	Lindl.	per.	cal.	— rosmarinifolia	Cunn.	lign.	frig.
— discolor	H. Lavan.	per.	cal.	— sulphurea	Cunn.	lign.	frig.
— Helleri	Mart.	lign.	cal.	<i>Grewia flava</i>	DC.	lign.	tep.
— hybrida	Hort.	per.	cal.	— occidentalis	L.	lign.	frig.
— lilacina	Hort.	per.	cal.	— oppositifolia	Buch.	lign.	frig.
— maculata	Herit.	per.	cal.	<i>Grindelia ciliata</i>	Spr.	bien.	frig.
— Smithii	Hort.	per.	cal.	— crispa	H. Ber.	bien.	frig.
— speciosa	Lodd.	per.	cal.	— glutinosa	Dun.	lign.	frig.
— velutina	Mart.	per.	cal.	— nitida	Bernh.	per.	frig.
— villosa	Mart.	per.	cal.	— squarrosa	Dun.	per.	s. d.
<i>Glyceria fluitans</i>	R. Br.	per.	sp.	<i>Gronovia scandens</i>	L.	ann.	s. d.
— spectabilis	M. K.	per.	sp.	<i>Guilandina Bonduc</i>	L.	lign.	cal.
<i>Glycine micrantha</i>	H. Drsd.	per.	cal.	<i>Guizotia oleifera</i>	DC.	ann.	s. d.
<i>Glycosmis pentaphylla</i>	Cor.	lign.	cal.	<i>Gymnadenia odoratissima</i>	Rich.	per.	s. d.
<i>Glycyrrhiza dubia</i>	Bernh.	lign.	s. d.	<i>Gymnogramma Calomela-</i>			
— echinata	L.	per.	s. d.	— nos	Kaulf.	per.	cal.
— foetida	Desf.	per.	s. d.	— chaerophylla	Desv.	per.	cal.
— glabra	L.	per.	s. d.	— chrysophylla	Kaulf.	per.	cal.
— glandulifera	W. et K.	per.	s. d.	— peruviana	Ott.	per.	tep.
— hirsuta	L.	per.	s. d.	— sulphurea	Desv.	per.	cal.
— lepidota	Pursh.	per.	s. d.	— tartarea	Desv.	per.	cal.
<i>Guaphalium Candelabron</i>	Horn.	ann.	s. d.	<i>Gypsophila acutifolia</i>	Fisch.	per.	s. d.
— carpathicum	Wahlb.	per.	s. d.	— adscendens	Jacq.	per.	s. d.
— citrinum	Hook.	ann.	s. d.	— altissima	L.	per.	s. d.
— flaccidum	Weinm.	per.	tep.	— dichotoma	Bess.	per.	s. d.
— luteo-album	L.	ann.	sp.	— effusa	Jacq.	per.	s. d.
— pensylvanicum	W.	ann.	s. d.	— elegans	Bieb.	ann.	s. d.
— resedaefolium	Trev.	ann.	s. d.	— glauca	Stev.	per.	s. d.
— uliginosum	L.	ann.	sp.	— glomerata	Pall.	per.	s. d.
— Vira-Vira	Molin.	ann.	s. d.	— Grmelini	Bung.	per.	s. d.
<i>Gnidia imbricata</i>	L. fil.	lign.	frig.	— thesiifolia	Ser.	per.	s. d.
— simplex	L.	lign.	frig.	— muralis	L.	ann.	sp.
<i>Goldbachia laevigata</i>	DC.	ann.	s. d.	— paniculata	L.	per.	s. d.
— tetragona	Led.	ann.	s. d.	— perfoliata	L.	per.	s. d.
— torulosa	DC.	ann.	s. d.	— praealta	Jan.	per.	s. d.
<i>Gomphocarpus angustifo-</i>				— repens	L.	per.	s. d.
— lius	Lk.	per.	frig.				
— fruticosus	R. Br.	lign.	frig.				

<i>Gypsophyla Rokejeka</i>	<i>Del.</i>	per.	s. d.
— <i>saligna</i>	<i>Schrad.</i>	per.	s. d.
— <i>scorzonerifolia</i>	<i>Ser.</i>	per.	s. d.
— <i>spathulata</i>	<i>Bertol.</i>	per.	s. d.
— <i>trichotoma</i>	<i>Wender.</i>	per.	s. d.
<i>Gyrocarpus americanus</i>	<i>Jacq.</i>	ligu.	cal.
<i>Hablitzia tamnoides</i>	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.
<i>Hacquetia Epipactis</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.
<i>Haemanthus albidus</i>	<i>Jacq.</i>	per.	tep.
— <i>coccineus</i>	<i>L.</i>	per.	tep.
— <i>punicus</i>	<i>L.</i>	per.	tep.
— <i>speciosus</i>	<i>Hort.</i>	per.	tep.
— <i>tigrinus</i>	<i>Jacq.</i>	per.	tep.
<i>Hakea amplexicaulis</i>	<i>R. Br.</i>	ligu.	frig.
— <i>Baxteri</i>	<i>R. Br.</i>	ligu.	frig.
— <i>florida</i>	<i>R. Br.</i>	ligu.	frig.
— <i>gibbosa</i>	<i>Cav.</i>	ligu.	frig.
— <i>nitida</i>	<i>R. Br.</i>	ligu.	frig.
— <i>oleacefolia</i>	<i>R. Br.</i>	ligu.	frig.
— <i>pectinata</i>	<i>Dumont C.</i>	ligu.	frig.
— <i>pugioniformis</i>	<i>Cav.</i>	ligu.	frig.
— <i>saligna</i>	<i>R. Br.</i>	ligu.	frig.
— <i>suaveolens</i>	<i>R. Br.</i>	ligu.	frig.
<i>Halesia tetraptera</i>	<i>L.</i>	ligu.	s. d.
<i>Halimodendron argenteum</i>	<i>DC.</i>	ligu.	s. d.
<i>Halleria lucida</i>	<i>L.</i>	ligu.	frig.
<i>Halocnemum fruticosum</i>	<i>Dietr.</i>	ligu.	s. d.
<i>Haloragis capensis</i>	<i>Nois.</i>	ligu.	frig.
<i>Hamamelis virginica</i>	<i>L.</i>	ligu.	s. d.
<i>Hamelia patens</i>	<i>L.</i>	ligu.	cal.
<i>Hardenbergia Comptoniana</i>	<i>Benth.</i>	ligu.	frig.
— <i>monophylla</i>	<i>Benth.</i>	ligu.	frig.
— <i>ovata</i>	<i>Benth.</i>	ligu.	frig.
<i>Hariota salicornioides</i>	<i>DC.</i>	ligu.	cal.
<i>Hasselquistia aegyptiaca</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>cordata</i>	<i>L. fil.</i>	ann.	s. d.
<i>Heckeria umbellata</i>	<i>Kunth</i>	ligu.	cal.
<i>Hedeoma pulegioides</i>	<i>Pers.</i>	ann.	s. d.
<i>Hedera capitata</i>	<i>Sm.</i>	ligu.	cal.
— <i>Helix</i>	<i>L.</i>	ligu.	sp.
— <i>variegata</i>	<i>Hort.</i>	ligu.	s. d.
— <i>umbellifera</i>	<i>DC.</i>	ligu.	cal.
<i>Hedychium angustifolium</i>	<i>Roxb.</i>	per.	cal.
— <i>carneum</i>	<i>Carey</i>	per.	cal.
— <i>coccineum</i>	<i>Sm.</i>	per.	cal.
— <i>coronarium</i>	<i>Koen.</i>	per.	cal.
— <i>flavescens</i>	<i>Carey</i>	per.	cal.
— <i>Gardnerianum</i>	<i>W. l.</i>	per.	cal.
— <i>Loddigesii</i>	<i>Hort.</i>	per.	cal.
<i>Hedyotis biflora</i>	<i>Sm.</i>	ann.	s. d.
— <i>lactea</i>	<i>W.</i>	ann.	s. d.

<i>Hedynois coronopifolia</i>	<i>Ten.</i>	ann.	s. d.
— <i>cretica</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>persica</i>	<i>Bieb.</i>	ann.	s. d.
— <i>polymorpha</i>	<i>DC.</i>	ann.	s. d.
— <i>rhagadioloides</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>tubaeformis</i>	<i>Tenor.</i>	ann.	s. d.
<i>Hedysarum candidum</i>	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.
— <i>coronarium</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>flor. albo</i>	<i>Hort.</i>	per.	s. d.
— <i>elongatum</i>	<i>Fisch.</i>	per.	s. d.
— <i>fruticosum</i>	<i>L.</i>	ligu.	s. d.
— <i>obscurum</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
<i>Heimia salicifolia</i>	<i>Link.</i>	ligu.	frig.
<i>Helenium autumnale</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>californicum</i>	<i>Dougl.</i>	bien.	s. d.
— <i>commutatum</i>	<i>H. Ar. gent.</i>	ann.	s. d.
— <i>mexicanum</i>	<i>Humb.</i>	per.	s. d.
— <i>quadridentatum</i>	<i>La-bill.</i>	ann.	s. d.
<i>Helianthemum canariense</i>	<i>Pers.</i>	ligu.	frig.
— <i>Fumana</i>	<i>L.</i>	sp.	
— <i>guttatum</i>	<i>Mill.</i>	ann.	sp.
— <i>laevipes</i>	<i>Pers.</i>	ligu.	frig.
— <i>ledifolium</i>	<i>Pers.</i>	ann.	s. d.
— <i>Rhodax</i>	<i>Steud.</i>	per.	s. d.
— <i>alpestre</i>	<i>Dun.</i>	per.	s. d.
— <i>cinereum</i>	<i>Pers.</i>	per.	sp.
— <i>stoechadifolium</i>	<i>Prx.</i>	ligu.	frig.
— <i>variabile</i>	<i>Spach.</i>	per.	s. d.
— <i>angustifol.</i>	<i>Dun.</i>	per.	frig.
— <i>appenninum</i>	<i>Mll.</i>	ligu.	frig.
— <i>glaucum</i>	<i>Pers.</i>	per.	frig.
— <i>hispidum</i>	<i>Dun.</i>	per.	frig.
— <i>obscurum</i>	<i>Pers.</i>	per.	frig.
— <i>polifolium</i>	<i>Pers.</i>	per.	frig.
<i>Helianthus annuus</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>Colossus</i>	<i>Kunze</i>	ann.	s. d.
— <i>decapetalus</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>Maximiliani</i>	<i>Schrd.</i>	ann.	s. d.
— <i>mollis</i>	<i>Lam.</i>	ann.	s. d.
— <i>multiflorus</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>flor. pl.</i>	<i>Hort.</i>	per.	s. d.
— <i>orgyalis</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.
— <i>strumosus</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>tuberosus</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
<i>Helichrysum angustifolium</i>	<i>Don</i>	ligu.	sp.
— <i>bracteatum</i>	<i>W.</i>	bien.	frig.
— <i>flor. alb.</i>	<i>Hort.</i>	bien.	frig.
— <i>foetidum</i>	<i>Moench</i>	bien.	frig.
— <i>fulgidum</i>	<i>W.</i>	ligu.	frig.
— <i>macranthum</i>	<i>Benth.</i>	ligu.	frig.
— <i>odoratissimum</i>	<i>Don</i>	ligu.	frig.
— <i>orientale</i>	<i>Gaertn.</i>	ligu.	frig.

<i>Helichrysum rutilans</i> Don	ann.	s. d.	<i>Herniaria hirsuta</i> L.	ann.	sp.
<i>Heliconia lunilis</i> Jacq.	per.	cal.	— incana Lam.	lign.	s. d.
— psittacorum L. fil.	per.	cal.	<i>Herpestis chrysantha</i> Chmss.	ann.	s. d.
— superba Hort.	per.	cal.	<i>Herpetion reniforme</i> Hort.	per.	frig.
<i>Helicteres barucensis</i> L.	lign.	cal.	<i>Hesperis fragrans</i> Fisch.	bien.	s. d.
— jamaicensis L.	lign.	cal.	— matronalis L.	per.	sp.
— Isora L.	lign.	cal.	— — euganea Marsil.	per.	sp.
— verbascifolia Lk.	lign.	cal.	— — sibirica L.	per.	s. d.
<i>Heliocarpus americanus</i> L.	lign.	cal.	— nivea Baumg.	per.	s. d.
— popayanensis Humb.	lign.	cal.	— ramosissima Desf.	ann.	s. d.
<i>Heliophila crithmifolia</i> W.	ann.	s. d.	— runcinata W. et K.	bien.	s. d.
— pusilla L. fil.	ann.	s. d.	— ucranica H. Mosq.	bien.	s. d.
<i>Heliopsis laevis</i> Pers.	per.	s. d.	<i>Heteracia Szowitsii</i> F. et M.	ann.	s. d.
— scabra Dun.	per.	s. d.	<i>Heteronema subtripiner-</i>		
<i>Heliotropium corymbosum</i>			— vium DC.	lign.	cal.
— — R. et P.	lign.	tep.	<i>Heteropteris chrysophylla</i>		
— curassavicum L.	ann.	s. d.	— — Humb.	lign.	cal.
— europaeum L.	ann.	sp.	— nitida Humb.	lign.	cal.
— peruvianum L.	lign.	tep.	<i>Heterotheca inuloides</i> Cass.	bien.	frig.
— supinum L.	ann.	s. d.	— scabra DC.	per.	s. d.
<i>Helipterum fasciculatum</i>			<i>Heuchera americana</i> L.	per.	s. d.
— — DC.	lign.	frig.	— caulescens Pursh.	per.	s. d.
— sesamoides DC.	lign.	frig.	— divaricata Fisch.	per.	s. d.
<i>Helleborus Bocconi</i> Tenor.	per.	s. d.	— lucida Lodd.	per.	s. d.
— foetidus L.	per.	s. d.	<i>Hexacentris coccinea</i> Nees	lign.	cal.
— niger L.	per.	s. d.	<i>Hibbertia volubilis</i> Andr.	lign.	cal.
— viridis L.	per.	sp.	<i>Hibiscus Abelmoschus</i> L.	lign.	cal.
<i>Helminthia echioides</i> Grtn.	ann.	sp.	— abutiloides W.	lign.	cal.
<i>Helosciadium leptophyllum</i>			— armeniacus Bouche	per.	cal.
— — DC.	ann.	s. d.	— Bartlingianus Steud.	lign.	cal.
<i>Hemerocallis flava</i> L.	per.	s. d.	— calycinus W.	lign.	cal.
— fulva L.	per.	sp.	— cannabinus L.	ann.	s. d.
— graminea Andr.	per.	s. d.	— cubanus Hort.	lign.	cal.
<i>Hemilepis Ehrenbergii</i> Knz.	ann.	s. d.	— digitiformis DC.	lign.	s. d.
<i>Hepatica triloba</i> Chaix.	per.	sp.	— diversifolius Jacq.	lign.	cal.
— — pl. var. Hort.	per.	s. d.	— esculentus L.	ann.	s. d.
<i>Heracleum asperum</i> Bieb.	per.	s. d.	— heterophyllum Vent.	lign.	cal.
— barbatum Led.	bien.	s. d.	— incanus Wendl.	per.	s. d.
— dissectum Led.	bien.	s. d.	— laevigatus Colla	per.	tep.
— flavescens Baumg.	per.	s. d.	— lavateroides Moric.	per.	tep.
— gunniferum W.	per.	s. d.	— liliiflorus Cav.	lign.	cal.
— lanatum Michx.	per.	s. d.	— Lindleyi Wall.	lign.	cal.
— Panaces L.	per.	s. d.	— Manihot L.	lign.	cal.
— Pollinianum Bertol.	per.	s. d.	— militaris Cav.	per.	s. d.
— pubescens Bieb.	per.	s. d.	— Moscheutos L.	per.	s. d.
— pyrenaicum Lam.	per.	s. d.	— mutabilis L.	lign.	frig.
— Sphondylium L.	bien.	s. d.	— palmatus W.	ann.	s. d.
— tauricum Stev.	bien.	s. d.	— palustris L.	per.	s. d.
<i>Hermannia althaeaeifolia</i> L.	lign.	tep.	— Patersonius Ait.	lign.	frig.
— candicans Ait.	lign.	tep.	— pedunculatus Thnb.	lign.	frig.
— denudata L. fil.	lign.	tep.	— philadelphicus Hort.	per.	s. d.
— disticha Schrad.	lign.	tep.	— phoeniceus L.	lign.	cal.
— flammula Jacq.	lign.	tep.	— — hirsutus L.	lign.	cal.
— scabra Cav.	lign.	tep.	— pruriens Roxb.	ann.	s. d.
<i>Hernium Monorchis</i> R. B.	per.	s. d.	— Rainerianus Vis.	lign.	cal.
<i>Herniaria glabra</i> L.	ann.	s. d.	— Richardsonii Lindl.	lign.	cal.

<i>Hibiscus Rosa sinensis</i> <i>L.</i>	lign.	cal.	<i>Hoplotheca floridana</i> <i>Nutt.</i>	ann.	s. d.
— — pl. variet.	lign.	cal.	— interrupta <i>Nutt.</i>	ann.	s. d.
— roseus <i>Loisl.</i>	per.	s. d.	<i>Hordeum bulbosum</i> <i>L.</i>	per.	s. d.
— speciosus <i>Ait.</i>	per.	s. d.	— distichon <i>L.</i>	ann.	s. d.
— sphaerocarpus <i>Bchè</i>	per.	frig.	— himalayense <i>Rittig.</i>	ann.	s. d.
— splendens <i>Hort.</i>	lign.	cal.	— murinum <i>L.</i>	per.	sp.
— syriacus <i>L.</i>	lign.	s. d.	— pratense <i>Huds.</i>	per.	s. d.
— — pl. var.	lign.	s. d.	— vulgare <i>L.</i>	ann.	s. d.
— tiliaceus <i>L.</i>	lign.	cal.	— Zeocriton <i>L.</i>	ann.	s. d.
— Trionum <i>L.</i>	ann.	sp.	<i>Hornemannia bicolor</i> <i>W.</i>	ann.	s. d.
— Verani <i>H. Taur.</i>	lign.	cal.	<i>Hotcia japonica</i> <i>Morr.</i>	per.	s. d.
— vitifolius <i>L.</i>	ann.	s. d.	<i>Hottonia palustris</i> <i>L.</i>	per.	sp.
<i>Hieracium aurantiacum</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Hovenia dulcis</i> <i>Thunb.</i>	lign.	sp.
— boreale <i>Fries</i>	per.	s. d.	<i>Hoya carnosa</i> <i>R. Br.</i>	lign.	cal.
— cymosum <i>Vill.</i>	per.	sp.	— coccinea <i>Hort.</i>	lign.	cal.
— — Vaillantii <i>Tsch</i>	per.	s. d.	<i>Humulus Lupulus</i> <i>L.</i>	per.	sp.
— echioides <i>W. et K.</i>	per.	s. d.	<i>Hunnemannia fumariaefolia</i>		
— foliosum <i>W. et K.</i>	per.	s. d.		<i>Sweet</i>	per. tep.
— Gronovii <i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Hura crepitans</i> <i>L.</i>	lign.	cal.
— melachaetum <i>Tsch</i>	per.	s. d.	<i>Hyacinthus orientalis</i> <i>L.</i>	per.	s. d.
— murorum <i>L.</i>	per.	sp.	— romanus <i>L.</i>	per.	s. d.
— — sylvaticum <i>L.</i>	per.	sp.	<i>Hydrangea arborescens</i> <i>L.</i>	lign.	s. d.
— nigrescens <i>W.</i>	per.	s. d.	— flortensia <i>DC.</i>	lign.	s. d.
— oblongifolium <i>Tsch</i>	per.	s. d.	— nivea <i>Michx</i>	lign.	s. d.
— Pilosella <i>L.</i>	per.	sp.	— quercifolia <i>Bartr.</i>	lign.	s. d.
— piloselloides <i>Vill.</i>	per.	sp.	<i>Hydrastis canadensis</i> <i>L.</i>	per.	frig.
— porrifolium <i>L.</i>	per.	sp.	<i>Hydrocharis morsus ranae</i> <i>L.</i>	per.	sp.
— praealtum <i>Vill.</i>	per.	sp.	<i>Hydrocotyle asiatica</i> <i>L.</i>	per.	tep.
— pratense <i>Tsch</i>	per.	s. d.	— sibthorpioides <i>Lam.</i>	ann.	s. d.
— prenanthoides <i>Vill.</i>	per.	s. d.	— vulgaris <i>L.</i>	per.	sp.
— prostratum <i>DC.</i>	per.	s. d.	<i>Hydrophyllum chilense</i> <i>H.P.</i>	per.	frig.
— ramosum <i>Suter</i>	per.	s. d.	— virginicum <i>L.</i>	per.	s. d.
— rotundatum <i>Schult.</i>	per.	s. d.	<i>Hymenoxis californica</i> <i>Hook</i>	ann.	s. d.
— sabaudum <i>L.</i>	per.	sp.	<i>Hyoscyamus albus</i> <i>L.</i>	ann.	sp.
— Schmidtii <i>Tsch</i>	per.	sp.	— aureus <i>L.</i>	per.	s. d.
— umbellatum <i>L.</i>	per.	sp.	— chloranthus <i>Wunder.</i>	ann.	s. d.
— — Lactaris <i>Bert.</i>	per.	sp.	— niger <i>L.</i>	ann.	sp.
— villosus <i>L.</i>	per.	s. d.	— — agrestis <i>W. K.</i>	ann.	s. d.
<i>Himantoglossum hircinum</i>			— pallidus <i>W. K.</i>	ann.	s. d.
	<i>Spr.</i>	per. sp.	— physaloides <i>L.</i>	per.	s. d.
<i>Hippia frutescens</i> <i>L.</i>	lign.	cal.	— pusillus <i>L.</i>	ann.	s. d.
<i>Hippocrepis ciliata</i> <i>W.</i>	ann.	s. d.	— reticulatus <i>L.</i>	ann.	s. d.
— comosa <i>L.</i>	per.	sp.	— varians <i>Vis.</i>	per.	s. d.
— multisiliquosa <i>L.</i>	ann.	s. d.	<i>Hyoseris lucida</i> <i>L.</i>	per.	s. d.
— — multisiliquosa <i>L.</i>	ann.	s. d.	<i>Hyperanthera Moringa</i> <i>Vhl</i>	lign.	cal.
<i>Hippophae rhamnoides</i> <i>L.</i>	lign.	s. d.	<i>Hypericum aegyptiacum</i> <i>L.</i>	lign.	tep.
<i>Hippuris vulgaris</i> <i>L.</i>	per.	sp.	— ascyroides <i>W.</i>	per.	s. d.
<i>Hoitzia coccinea</i> <i>Cav.</i>	lign.	cal.	— Ascyron <i>L.</i>	per.	s. d.
<i>Holcus lanatus</i> <i>L.</i>	per.	sp.	— balearicum <i>L.</i>	lign.	tep.
<i>Holmskioldia sanguinea</i> <i>Rtz</i>	lign.	cal.	— calycinum <i>L.</i>	lign.	frig.
<i>Holoschoenus atrovirens</i> <i>Lk.</i>	per.	s. d.	— canariense <i>L.</i>	lign.	tep.
— Linnaei <i>Rchb.</i>	per.	sp.	— crispum <i>L.</i>	lign.	tep.
— — romanus <i>L.</i>	per.	sp.	— dentatum <i>Loisl.</i>	per.	frig.
<i>Holosteum glutinosum</i> <i>F.M.</i>	ann.	s. d.	— elegans <i>Steph.</i>	per.	s. d.
— umbellatum <i>L.</i>	ann.	sp.	— fimbriatum <i>Lam.</i>	per.	s. d.
<i>Homogyne alpina</i> <i>Cass.</i>	per.	s. d.	— floribundum <i>Ait.</i>	lign.	tep.

Hypericum Gebleri <i>Ledeb.</i>	per.	s. d.	Jatropha Curcas <i>L.</i>	lign.	cal.
— hircinum <i>L.</i>	lign.	s. d.	Iberis amara <i>L.</i>	ann.	s. d.
— hirsutum <i>L.</i>	per.	sp.	— ciliata <i>All.</i>	bien.	s. d.
— Kalmianum <i>L.</i>	lign.	s. d.	— odorata <i>L.</i>	ann.	s. d.
— monogynum <i>L.</i>	lign.	tep.	— saxatilis <i>L.</i>	lign.	s. d.
— montanum <i>L.</i>	lign.	sp.	— semperflorens <i>L.</i>	lign.	s. d.
— Montbretii <i>Spach</i>	lign.	frig.	— variegata <i>Hort.</i>	lign.	s. d.
— perforatum <i>L.</i>	per.	sp.	— sempervirens <i>L.</i>	lign.	s. d.
— songaricum <i>Led.</i>	per.	s. d.	— taurica <i>DC.</i>	ann.	s. d.
— pulchellum <i>W.</i>	per.	frig.	— Tenoreana <i>DC.</i>	per.	s. d.
— punctatum <i>Lam.</i>	per.	s. d.	— umbellata <i>L.</i>	ann.	sp.
— pyramidatum <i>Ait.</i>	per.	s. d.	— speciosa <i>Hort.</i>	ann.	s. d.
— quadrangulum <i>L.</i>	per.	sp.	— violacea <i>Ait.</i>	ann.	s. d.
— tomentosum <i>L.</i>	per.	s. d.	— virginica <i>F. et M.</i>	ann.	s. d.
Hypochaeris glabra <i>L.</i>	ann.	sp.	Ilex angustifolia <i>W.</i>	lign.	s. d.
— minima <i>Desf.</i>	ann.	s. d.	— Aquifolium <i>L.</i>	lign.	sp.
— radicata <i>L.</i>	per.	sp.	— — ferox <i>Ait.</i>	lign.	s. d.
Hypoxis erecta <i>L.</i>	per.	s. d.	— — variegata <i>Hort.</i>	lign.	s. d.
— villosa <i>L. fil.</i>	per.	frig.	— balearica <i>Desf.</i>	lign.	s. d.
Hyptis canescens <i>Humb.</i>	ann.	s. d.	— Cassine <i>L.</i>	lign.	s. d.
— pectinata <i>Poit.</i>	per.	cal.	— crocea <i>Thunb.</i>	lign.	frig.
— radiata <i>W.</i>	per.	cal.	— vomitoria <i>Ait.</i>	lign.	s. d.
Hyssopus angustifolius <i>Bieb.</i>	per.	s. d.	Illicium anisatum <i>L.</i>	lign.	frig.
— officinalis <i>L.</i>	lign.	s. d.	— floridanum <i>L.</i>	lign.	frig.
Jaborosa integrifolia <i>Lam.</i>	per.	s. d.	Impatiens Balsamina <i>L.</i>	ann.	s. d.
— runcinata <i>Lam.</i>	per.	s. d.	— capensis <i>Thunb.</i>	ann.	s. d.
Jacaranda rhombifolia <i>Mey.</i>	lign.	cal.	— glandulifera <i>Royl.</i>	ann.	s. d.
Jacquinia aurantiaca <i>Ait.</i>	lign.	cal.	— leptoceras <i>Wall.</i>	ann.	s. d.
Jambosa australis <i>DC.</i>	lign.	cal.	— noli tangere <i>L.</i>	ann.	s. d.
— malaccensis <i>DC.</i>	lign.	cal.	— parviflora <i>DC.</i>	ann.	s. d.
— vulgaris <i>DC.</i>	lign.	cal.	— tricornis <i>Wall.</i>	ann.	s. d.
Jasione montana <i>L.</i>	ann.	sp.	Incarvillea sinensis <i>Lam.</i>	ann.	s. d.
Jasminum angustifolium <i>W.</i>	lign.	cal.	Indigofera amoena <i>Ait.</i>	lign.	frig.
— azoricum <i>L.</i>	lign.	frig.	— Anil <i>L.</i>	lign.	cal.
— flexile <i>Vahl.</i>	lign.	tep.	— atropurpurea <i>Roxb.</i>	lign.	tep.
— fruticans <i>L.</i>	lign.	s. d.	— australis <i>W.</i>	lign.	frig.
— gracile <i>Andr.</i>	lign.	frig.	— cassioides <i>Rottl.</i>	lign.	cal.
— grandiflorum <i>L.</i>	lign.	frig.	— divaricata <i>Jacq.</i>	lign.	cal.
— heterophyllum <i>Wall.</i>	lign.	frig.	— hirsuta <i>L.</i>	lign.	cal.
— hirsutum <i>W.</i>	lign.	cal.	— psoraloides <i>L.</i>	lign.	cal.
— humile <i>L.</i>	lign.	s. d.	— tinctoria <i>L.</i>	lign.	tep.
— odoratissimum <i>L.</i>	lign.	tep.	Inga alba <i>W.</i>	lign.	tep.
— officinale <i>L.</i>	lign.	s. d.	Inula bifrons <i>L.</i>	bien.	s. d.
— mauritanium <i>Hort.</i>	lign.	tep.	— britannica <i>L.</i>	per.	sp.
— revolutum <i>Sims.</i>	lign.	s. d.	— Bubonium <i>Jacq.</i>	per.	s. d.
— Sambac <i>Ait.</i>	lign.	cal.	— crithmifolia <i>L.</i>	per.	s. d.
— simplicifolium <i>Forst.</i>	lign.	frig.	— ensifolia <i>L.</i>	per.	s. d.
— tortuosum <i>W.</i>	lign.	frig.	— glandulosa <i>W.</i>	per.	s. d.
— — latifolium <i>H. Pat.</i>	lign.	frig.	— Helenium <i>L.</i>	per.	s. d.
— undulatum <i>W.</i>	lign.	cal.	— Oculus Christi <i>L.</i>	per.	s. d.
— Wallichianum <i>Lndl.</i>	lign.	s. d.	— salicina <i>L.</i>	per.	sp.
Jasonia glutinosa <i>Less.</i>	per.	s. d.	— semiamplexicaulis <i>Reut.</i>	per.	s. d.
— longifolia <i>Cass.</i>	per.	s. d.	— squarrosa <i>L.</i>	per.	sp.
— radiata <i>Cass.</i>	per.	s. d.	— suaveolens <i>Jacq.</i>	per.	s. d.
			— thapsoides <i>Spr.</i>	per.	s. d.

<i>Ipomoea barbata</i>	<i>Chois.</i>	lign.	cal.	<i>Iris ruthenica</i>	<i>Ait.</i>	per.	s. d.
— candicans	<i>Sweet.</i>	per.	s. d.	— sambucina	<i>L.</i>	per.	s. d.
— carnea	<i>L.</i>	per.	cal.	— setosa	<i>Pall.</i>	per.	s. d.
— coccinea	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— sibirica	<i>L.</i>	per.	s. d.
— cordigera	<i>Mart.</i>	ann.	s. d.	— haematophylla	<i>F.</i>	per.	s. d.
— curassavica	<i>Balb.</i>	ann.	s. d.	— sordida	<i>Retz.</i>	per.	s. d.
— dasysperma	<i>Jacq. f.</i>	ann.	s. d.	— spuria	<i>L.</i>	per.	s. d.
— ficifolia	<i>Lincl.</i>	per.	tep.	— squalens	<i>L.</i>	per.	s. d.
— hederacea	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— susiana	<i>L.</i>	per.	s. d.
— maritima	<i>R. Br.</i>	per.	cal.	— Swertii	<i>Lam.</i>	per.	s. d.
— muricata	<i>Jacq.</i>	ann.	s. d.	— tenuifolia	<i>Pall.</i>	per.	s. d.
— mutabilis	<i>Ker.</i>	per.	cal.	— tuberosa	<i>L.</i>	per.	sp.
— palmata	<i>Forsk.</i>	per.	tep.	— versicolor	<i>L.</i>	per.	s. d.
— peltata	<i>Chois.</i>	per.	cal.	— virginica	<i>L.</i>	per.	s. d.
— pes tigridis	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— Xiphium	<i>L.</i>	per.	s. d.
— pubescens	<i>Horn.</i>	per.	cal.	<i>Isatis costata</i>	<i>Ledeb.</i>	bien.	s. d.
— punctata	<i>Pers.</i>	ann.	s. d.	— dasycarpa	<i>Ledeb.</i>	bien.	s. d.
— purpurea	<i>Lam.</i>	ann.	s. d.	— praecox	<i>Kit.</i>	bien.	s. d.
— Schlechthendalii	<i>Vis.</i>	per.	cal.	— taurica	<i>Bieb.</i>	bien.	s. d.
— superba	<i>Colla.</i>	ann.	s. d.	— tinctoria	<i>L.</i>	bien.	s. d.
— tuberosa	<i>L.</i>	per.	s. d.	— heterocarpa	<i>An- drz.</i>	bien.	s. d.
<i>Iresine nervosa</i>	<i>H. Vind.</i>	per.	tep.	— — microcarpa	<i>Hort.</i>	bien.	s. d.
<i>Iris acuta</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.	<i>Ischaemum aristatum</i>	<i>L.</i>	per.	tep.
— aequiloba	<i>Led.</i>	per.	s. d.	<i>Isnardia palustris</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— atomaria	<i>Bess.</i>	per.	s. d.	<i>Isolepis Micheliana</i>	<i>R. et Sch.</i>	ann.	sp.
— biglumis	<i>Vahl.</i>	per.	s. d.	<i>Isopogon anethifolius</i>	<i>R. Br.</i>	lign.	frig.
— chinensis	<i>Curt.</i>	per.	s. d.	<i>Isotoma axillaris</i>	<i>R. Br.</i>	per.	tep.
— Cochlearvensis	<i>Hook.</i>	per.	s. d.	— longiflora	<i>Presl.</i>	per.	tep.
— dichotoma	<i>L. fil.</i>	per.	s. d.	— senecioides	<i>DC.</i>	bien.	tep.
— florentina	<i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Itea virginica</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— foetidissima	<i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Juglans cinerea</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— — variegata	<i>Hort.</i>	per.	s. d.	— nigra	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— germanica	<i>L.</i>	per.	sp.	— regia	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— — alba	<i>Sav.</i>	per.	sp.	<i>Juncus acutiflorus</i>	<i>Ehrh.</i>	per.	s. d.
— odorata	<i>Pers.</i>	per.	s. d.	— acutus	<i>L.</i>	per.	sp.
— graminea	<i>L.</i>	per.	sp.	— Angelisii	<i>Tenor.</i>	per.	s. d.
— — fl. albo	<i>Hort.</i>	per.	s. d.	— bufonius	<i>L.</i>	ann.	sp.
— Guldenstaediana	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.	— conglomeratus	<i>L.</i>	per.	sp.
— — halophila	<i>Pall.</i>	per.	s. d.	— effusus	<i>L.</i>	per.	sp.
— heterophylla	<i>H. P.</i>	per.	s. d.	— glaucus	<i>Sibth.</i>	per.	sp.
— — stenogyna	<i>DC.</i>	per.	s. d.	— inflexus	<i>L.</i>	per.	sp.
— laevigata	<i>Fisch.</i>	per.	s. d.	— lampocarpus	<i>Ehrh.</i>	per.	sp.
— livida	<i>Booth.</i>	per.	s. d.	— maritimus	<i>L.</i>	per.	sp.
— longifolia	<i>Sweet.</i>	per.	s. d.	— obtusiflorus	<i>Ehrh.</i>	per.	sp.
— maritima	<i>Mill.</i>	per.	s. d.	<i>Juniperus bermudiana</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.
— notha	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.	— communis	<i>L.</i>	lign.	sp.
— orientalis	<i>Thunb.</i>	per.	s. d.	— phoenicea	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— pallida	<i>Lam.</i>	per.	s. d.	— Sabina	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— persica	<i>L.</i>	per.	frig.	— thurifera	<i>L.</i>	lign.	frig.
— pluvialis	<i>H. Crac.</i>	per.	s. d.	— virginiana	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— prismatica	<i>Pursh.</i>	per.	s. d.	<i>Jurinea alata</i>	<i>Cass.</i>	bien.	s. d.
— Pseudacorus	<i>L.</i>	per.	sp.	— spectabilis	<i>F. et M.</i>	bien.	s. d.
— pumila	<i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Jussiaea grandiflora</i>	<i>Michx.</i>	per.	s. d.
— — coerulea	<i>H. Pat.</i>	per.	s. d.	— ramosa	<i>Jacq.</i>	ann.	s. d.
— — lutescens	<i>DC.</i>	per.	s. d.	— scabra	<i>W.</i>	per.	tep.

<i>Justicia carnea</i>	<i>Lindl.</i>	lign.	tep.	<i>Kolreuteria paniculata</i>	<i>Lxm</i>	lign.	s. d.
— <i>caracasana</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	cal.	<i>Krigia virginica</i>	<i>W.</i>	ann.	s. d.
— <i>coccinea</i>	<i>Aubl.</i>	lign.	cal.	<i>Kruberaleptophylla</i>	<i>Hoffm.</i>	ann.	s. d.
— <i>Ecbolium</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.	<i>Krynitzkya leiocarpa</i>	<i>F. M.</i>	ann.	s. d.
— <i>hyssopifolia</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.	<i>Kuhnia fruticosa</i>	<i>Vent.</i>	lign.	cal.
— <i>nasuta</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.	— <i>Maximiliani</i>	<i>Trev.</i>	per.	s. d.
— <i>quadrifida</i>	<i>Vahl.</i>	lign.	frig.	<i>Kundmannia sicula</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.
— <i>humilis</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	frig.	<i>Kyllingia cruciformis</i>	<i>Schr.</i>	per.	cal.
— <i>rivinaefolia</i>	<i>Vis.</i>	lign.	tep.	— <i>monocephala</i>	<i>L.</i>	per.	frig.
<i>Iva frutescens</i>	<i>L.</i>	lign.	tep.				
— <i>xanthiifolia</i>	<i>Nutt.</i>	ann.	s. d.	<i>Lablab vulgaris</i>	<i>Savi</i>	ann.	s. d.
<i>Ixia capillaris</i>	<i>Thunb.</i>	per.	frig.	— <i>leucocarpus</i>	<i>Savi</i>	ann.	s. d.
— <i>conica</i>	<i>Salisb.</i>	per.	frig.	— <i>nankinicus</i>	<i>Savi</i>	ann.	s. d.
— <i>crateroides</i>	<i>Ker.</i>	per.	frig.	<i>Lachenalia contaminata</i>	<i>Ait.</i>	per.	frig.
— <i>flexuosa</i>	<i>L.</i>	per.	frig.	— <i>luteola</i>	<i>Jacq.</i>	per.	frig.
— <i>maculata</i>	<i>L.</i>	per.	frig.	— <i>pendula</i>	<i>Ait.</i>	per.	frig.
— <i>quadrangula</i>	<i>Delar.</i>	per.	frig.	— <i>tricolor</i>	<i>Thunb.</i>	per.	frig.
<i>Ixiolirion tataricum</i>	<i>Herb.</i>	per.	frig.	<i>Lactuca elongata</i>	<i>Mühlb.</i>	bien.	s. d.
<i>Ixora incarnata</i>	<i>DC.</i>	lign.	cal.	— <i>muralis</i>	<i>Don</i>	ann.	sp.
— <i>undulata</i>	<i>Roxb.</i>	lign.	cal.	— <i>perennis</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
				— <i>saligna</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
<i>Kaempferia Galanga</i>	<i>L.</i>	per.	cal.	— <i>sativa</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>rotunda</i>	<i>L.</i>	per.	cal.	— <i>capitata</i>	<i>Hort.</i>	ann.	s. d.
<i>Kalbfussia Mülleri</i>	<i>Schultz</i>	ann.	s. d.	— <i>crispa</i>	<i>Roth</i>	ann.	s. d.
— <i>Salzmanni</i>	<i>Schultz</i>	ann.	s. d.	— <i>laciniata</i>	<i>Roth</i>	ann.	s. d.
<i>Kalmia glauca</i>	<i>Ait.</i>	lign.	frig.	— <i>palmata</i>	<i>W.</i>	ann.	s. d.
— <i>latifolia</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.	— <i>Scariola</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>multiflora</i>	<i>Hort.</i>	lign.	frig.	— <i>sonchoides</i>	<i>Lap</i>	per.	s. d.
— <i>oleifolia</i>	<i>Hort.</i>	lign.	frig.	— <i>tuberosa</i>	<i>Jacq.</i>	per.	frig.
<i>Kennedyia apetala</i>	<i>Lodd.</i>	lign.	frig.	— <i>virosa</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>arabica</i>	<i>Hochst.</i>	per.	tep.	<i>Lagascea helianthifolia</i>	<i>Hmb</i>	lign.	cal.
— <i>rubicunda</i>	<i>Vent.</i>	lign.	tep.	<i>Lagenaria vulgaris</i>	<i>Ser.</i>	ann.	s. d.
— <i>splendens</i>	<i>Hort.</i>	lign.	tep.	<i>Lagerstroemia indica</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
<i>Kentrophyllum lanatum</i>	<i>DC.</i>	ann.	sp.	— <i>caucasica</i>	<i>Hort.</i>	lign.	s. d.
— <i>leucocaulon</i>	<i>DC.</i>	ann.	s. d.	<i>Lagoecia cuminoides</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
<i>Kerria japonica</i>	<i>DC.</i>	lign.	s. d.	<i>Lagunaea lobata</i>	<i>W.</i>	ann.	s. d.
— <i>fl. pl.</i>	<i>Hort.</i>	lign.	s. d.	<i>Lamarkia dentata</i>	<i>H. Burd.</i>	lign.	frig.
<i>Kiggelaria africana</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.	<i>Lambertia formosa</i>	<i>Sm.</i>	lign.	frig.
<i>Kitaibelia vitifolia</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.	<i>Lamium album</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
<i>Kleinia Anteuophorbium</i>	<i>DC.</i>	lign.	cal.	— <i>amplexicaule</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>articulata</i>	<i>Haw.</i>	lign.	cal.	— <i>flexuosum</i>	<i>Tenor.</i>	per.	s. d.
— <i>carnosa</i>	<i>Vis.</i>	lign.	cal.	— <i>garganicum</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>ficoides</i>	<i>Haw.</i>	lign.	cal.	— <i>maculatum</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>Haworthii</i>	<i>DC.</i>	lign.	cal.	— <i>Orvala</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>neriifolia</i>	<i>Haw.</i>	lign.	cal.	— <i>purpureum</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>repens</i>	<i>Haw.</i>	lign.	cal.	<i>Lantana aculeata</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.
<i>Knautia orientalis</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>alba</i>	<i>Mill.</i>	lign.	cal.
<i>Knowltonia vesicatoria</i>	<i>Sms</i>	per.	frig.	— <i>asperata</i>	<i>H. Paris.</i>	lign.	cal.
<i>Kochia hyssopifolia</i>	<i>Roth</i>	ann.	s. d.	— <i>Camara</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.
— <i>muricata</i>	<i>Schrad.</i>	lign.	s. d.	— <i>involutrata</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.
— <i>scoparia</i>	<i>Schrad.</i>	ann.	s. d.	— <i>lilacina</i>	<i>Desf.</i>	lign.	cal.
<i>Koeleria brachystachya</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.	— <i>nivea</i>	<i>Vent.</i>	lign.	cal.
— <i>cristata</i>	<i>Pers.</i>	per.	sp.	— <i>rosea</i>	<i>Hort.</i>	lign.	cal.
— <i>hirsuta</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.	— <i>Radula</i>	<i>Sw.</i>	lign.	cal.
— <i>phleoides</i>	<i>Pers.</i>	ann.	sp.	— <i>recta</i>	<i>Ait.</i>	lign.	cal.
— <i>villosa</i>	<i>Pers.</i>	ann.	s. d.	— <i>salvifolia</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	cal.

<i>Lantana scabrida</i>	<i>Ait.</i>	lign.	cal.	<i>Lavandula multifida</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.
— <i>stricta</i>	<i>Sw.</i>	lign.	cal.	— <i>pinnata</i>	<i>L. fil.</i>	lign.	tep.
— <i>trifolia</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.	— <i>pubescens</i>	<i>Decais.</i>	lign.	tep.
<i>Lappa major</i>	<i>Gaertn.</i>	bien.	sp.	— <i>Spica</i>	<i>DC.</i>	lign.	s. d.
— <i>minor</i>	<i>DC.</i>	bien.	s. d.	<i>Lavatera acerifolia</i>	<i>Cav.</i>	lign.	frig.
<i>Lapsana communis</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>arborea</i>	<i>L.</i>	bien.	frig.
<i>Larbrea aquatica</i>	<i>St. Hil.</i>	ann.	sp.	— <i>biennis</i>	<i>Bieb.</i>	bien.	s. d.
<i>Laserpitium nitidum</i>	<i>Zant.</i>	per.	s. d.	— <i>lusitanica</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.
— <i>peucedanoides</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>maritima</i>	<i>Gou.</i>	lign.	frig.
— <i>prutenicum</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>micans</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.
— <i>Siler</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>punctata</i>	<i>All.</i>	ann.	s. d.
<i>Lasiandra argentea</i>	<i>DC.</i>	lign.	cal.	— <i>Salvitellensis</i>	<i>Brig.</i>	per.	frig.
<i>Lasiospermum eriosper-</i>				— <i>sylvestris</i>	<i>Brot.</i>	bien.	frig.
— <i>mum</i>	<i>G. Don</i>	per.	s. d.	— <i>thuringiaca</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>pedunculare</i>	<i>Lag.</i>	per.	s. d.	— <i>trimestris</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>radiatum</i>	<i>Trevir.</i>	bien.	s. d.	— <i>unguiculata</i>	<i>Desf.</i>	lign.	frig.
<i>Lasthenia glaberrima</i>	<i>DC.</i>	ann.	s. d.	<i>Lawsonia alba</i>	<i>Lam.</i>	lign.	tep.
— <i>glabrata</i>	<i>Lindl.</i>	ann.	s. d.	<i>Lebeckia cytisoides</i>	<i>Thunb.</i>	lign.	frig.
<i>Latania chinensis</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	cal.	— <i>sericea</i>	<i>Thunb.</i>	lign.	frig.
<i>Lathraea Squamaria</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	<i>Lechenaultia formosa</i>	<i>R. Br.</i>	lign.	frig.
<i>Lathyrus angulatus</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	<i>Ledum angustifolium</i>	<i>Hort.</i>	lign.	frig.
— <i>annuus</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>latifolium</i>	<i>Lam.</i>	lign.	frig.
— <i>Aphaca</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	<i>Leersia oryzoides</i>	<i>Sw.</i>	per.	sp.
— <i>Cicera</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	<i>Lemna gibba</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>ciliatus</i>	<i>Guss.</i>	ann.	s. d.	— <i>minor</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>ensifolius</i>	<i>Badar.</i>	per.	s. d.	— <i>polyrrhiza</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>grandiflorus</i>	<i>Sibth.</i>	ann.	s. d.	— <i>trisulca</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>heterophyllus</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Leonotis Leonurus</i>	<i>Pers.</i>	lign.	frig.
— <i>hirsutus</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>nepetaefolia</i>	<i>R. Br.</i>	ann.	s. d.
— <i>inconspicuus</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>Raineriana</i>	<i>Vis.</i>	lign.	cal.
— <i>latifolius</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	<i>Leontice altaica</i>	<i>Pall.</i>	per.	s. d.
— <i>leptophyllus</i>	<i>Bieb.</i>	ann.	s. d.	<i>Leontodon Berinii</i>	<i>Rchb.</i>	per.	s. d.
— <i>longepedunculatus</i>				— <i>hastilis</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>lusitanicus</i>	<i>Mart.</i>	ann.	s. d.	— <i>hispidus</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>lutescens</i>	<i>Fisch.</i>	per.	s. d.	— <i>lucidus</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.
— <i>magellanicus</i>	<i>Lam.</i>	ann.	s. d.	— <i>Rosani</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.
— <i>Nissolia</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>saxatilis</i>	<i>Rchb.</i>	per.	s. d.
— <i>odoratus</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>Villarsii</i>	<i>Lois.</i>	per.	sp.
— <i>pratensis</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	<i>Leontopodium alpinum</i>	<i>Cas.</i>	per.	s. d.
— <i>purpureus</i>	<i>Desf.</i>	ann.	s. d.	<i>Leonurus Cardiaca</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>sativus</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>condensatus</i>	<i>Hrn.</i>	per.	s. d.
— <i>setifolius</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>glaucescens</i>	<i>Bung.</i>	per.	s. d.
— <i>sphaericus</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>lacerus</i>	<i>Lindl.</i>	per.	s. d.
— <i>stans</i>	<i>Vis.</i>	ann.	s. d.	— <i>lanatus</i>	<i>Pers.</i>	per.	s. d.
— <i>sylvestris</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>Marrubiastrum</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>tuberosus</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>multifidus</i>	<i>Desf.</i>	per.	s. d.
— <i>venosus</i>	<i>Mühlb.</i>	per.	s. d.	— <i>sibiricus</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
<i>Laurus aggregata</i>	<i>Sims.</i>	lign.	cal.	— <i>tataricus</i>	<i>L.</i>	bien.	s. d.
— <i>nobilis</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>villosus</i>	<i>Desf.</i>	blen.	s. d.
— <i>tenuifolia</i>	<i>Mill.</i>	lign.	frig.	<i>Lepechinia spicata</i>	<i>W.</i>	per.	frig.
— <i>tomentosa</i>	<i>Hort.</i>	lign.	frig.	<i>Lepidium affine</i>	<i>Ledeb.</i>	per.	s. d.
<i>Lavandula abrotanoides</i>				— <i>campestre</i>	<i>R. Br.</i>	ann.	sp.
— <i>dentata</i>	<i>Lam.</i>	lign.	tep.	— <i>cordatum</i>	<i>W.</i>	ann.	s. d.
— <i>latifolia</i>	<i>Ehrh.</i>	lign.	frig.	— <i>divaricatum</i>	<i>Ait.</i>	lign.	frig.
				— <i>Draba</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
				— <i>Eckloni</i>	<i>Schrad.</i>	per.	frig.

<i>Lepidium Gussoni</i> Schrad.	ann.	s. d.	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lm.	per.	sp.
— <i>Iberis</i> L.	per.	sp.	<i>Leucas aspera</i> Spr.	ann.	s. d.
— <i>incisum</i> Roth	ann.	s. d.	— <i>martinicensis</i> R. Br.	ann.	s. d.
— <i>latifolium</i> L.	per.	s. d.	— <i>Schimperi</i> Hochst.	per.	tep.
— <i>Menziesii</i> DC.	per.	s. d.	— <i>zeylanica</i> R. Br.	ann.	s. d.
— <i>micranthum</i> Led.	ann.	s. d.	<i>Leuchæria senecioides</i> Hok	ann.	s. d.
— <i>perfoliatum</i> L.	ann.	s. d.	<i>Leucocarpus alatus</i> Don	bien.	s. d.
— <i>sativum</i> L.	ann.	s. d.	<i>Leucojum aestivum</i> L.	per.	sp.
— <i>virginicum</i> L.	ann.	s. d.	— <i>vernum</i> L.	per.	sp.
<i>Lepigonum canadense</i> F. M.	ann.	s. d.	<i>Leuzca altaica</i> Fisch.	per.	s. d.
— <i>capense</i> F. et M.	ann.	s. d.	— <i>carthamoides</i> DC.	bien.	s. d.
— <i>chilense</i> F. et M.	ann.	s. d.	— <i>conifera</i> DC.	bien.	s. d.
— <i>glandulosum</i> F. M.	ann.	s. d.	<i>Levisticum officinale</i> Koch	per.	sp.
— <i>sperguloides</i> F. M.	ann.	s. d.	<i>Leycesteria formosa</i> Wall.	lign.	frig.
<i>Lepismium commune</i> Pfeiff.	lign.	tep.	— <i>buchthormensis</i> Spr.	ann.	s. d.
— <i>Knightii</i> Pfeiff.	lign.	tep.	<i>Liatris spicata</i> W.	per.	s. d.
— <i>Myosurus</i> Pfeiff.	lign.	tep.	<i>Libanotisathamantoides</i> DC.	per.	s. d.
— <i>paradoxum</i> Salm.	lign.	tep.	— <i>buchthormensis</i> DC.	per.	s. d.
<i>Leptinella perpusilla</i> F. M.	ann.	s. d.	— <i>daucifolia</i> Rechb.	per.	s. d.
<i>Leptochloa arabica</i> Kunth	ann.	s. d.	— <i>vulgaris</i> DC.	per.	s. d.
— <i>mucronata</i> Kunth	ann.	s. d.	— <i>condensata</i> L.	per.	s. d.
— <i>virgata</i> Beauv.	ann.	s. d.	— <i>sibirica</i> Koch	per.	s. d.
<i>Leptospermum acuminatum</i> Wendl.	lign.	frig.	<i>Lidbeckia pectinata</i> Berg.	lign.	cal.
— <i>australe</i> Salisb.	lign.	frig.	<i>Ligularia macrophylla</i> DC.	per.	s. d.
— <i>pubescens</i> W.	lign.	frig.	— <i>speciosa</i> F. et M.	per.	s. d.
— <i>Celsianum</i> Tenor.	lign.	frig.	<i>Ligustrum japonicum</i> Thnb.	lign.	s. d.
— <i>diosmaefolium</i> Hort.	lign.	frig.	— <i>nepalense</i> Wall.	lign.	frig.
— <i>ellipticum</i> Endl.	lign.	frig.	— <i>vulgare</i> L.	lign.	sp.
— <i>epacrioides</i> H. Hüg.	lign.	frig.	<i>Liliumatrosanguineum</i> Sibb.	per.	s. d.
— <i>flavescens</i> Sm.	lign.	frig.	— <i>bulbiferum</i> L.	per.	sp.
— <i>juniperinum</i> Sm.	lign.	frig.	— <i>canadense</i> L.	per.	s. d.
— <i>persiciflorum</i> Rechb.	lign.	frig.	— <i>candidum</i> L.	per.	s. d.
— <i>scoparium</i> Forst.	lign.	frig.	— <i>rubescens</i> H. Pat.	per.	s. d.
— <i>rubricaule</i> Lk.	lign.	frig.	— <i>strobilaceum</i> H. P.	per.	s. d.
— <i>trinerve</i> White	lign.	frig.	— <i>carniolicum</i> Bernh.	per.	s. d.
<i>Lepturus filiformis</i> Trin.	per.	s. d.	— <i>Catesbaei</i> Walt.	per.	s. d.
— <i>incurvatus</i> Trin.	ann.	sp.	— <i>concolor</i> Salisb.	per.	frig.
<i>Leprodiclis holosteoides</i> Fenzl	ann.	s. d.	— <i>cordifolium</i> Thunb.	per.	s. d.
<i>Lespedeza juncea</i> Pers.	per.	s. d.	— <i>croceum</i> Chaix.	per.	s. d.
— <i>polystachya</i> Michx.	per.	s. d.	— <i>dauricum</i> Ker	per.	s. d.
— <i>sessiliflora</i> Nutt.	per.	s. d.	— <i>eximium</i> Courtois	per.	frig.
<i>Lessertia annua</i> DC.	ann.	s. d.	— <i>japonicum</i> Thunb.	per.	frig.
— <i>perennans</i> DC.	per.	frig.	— <i>lancifolium</i> Thunb.	per.	frig.
<i>Leucadendron adscendens</i> R. Br.	lign.	frig.	— <i>longiflorum</i> Thunb.	per.	frig.
— <i>cinereum</i> R. Br.	lign.	frig.	— <i>Martagon</i> L.	per.	s. d.
— <i>Levisanus</i> Berg.	lign.	frig.	— <i>monadelphum</i> Bieb.	per.	s. d.
— <i>salignum</i> R. Br.	lign.	frig.	— <i>pomponium</i> L.	per.	s. d.
<i>Leucanthemum arcticum</i> DC.	per.	s. d.	— <i>pyrenaicum</i> Gou.	per.	s. d.
— <i>atratum</i> DC.	per.	sp.	— <i>superbum</i> L.	per.	s. d.
— <i>cebenense</i> DC.	per.	s. d.	— <i>Szowitsianum</i> Fisch.	per.	s. d.
— <i>ircutianum</i> DC.	per.	s. d.	— <i>tenuifolium</i> Fisch.	per.	s. d.
— <i>montanum</i> DC.	per.	sp.	— <i>tigrinum</i> Gaul.	per.	s. d.
			— <i>venustum</i> H. Lovan.	per.	s. d.
			<i>Limnanthemum nymphioides</i> Lk.	per.	sp.
			— <i>peltatum</i> Griseb.	per.	s. d.

<i>Limnanthes Douglasii</i>	<i>R. B.</i>	per.	s. d.	<i>Lippia nodiflora</i>	<i>Rich.</i>	lign.	frig.
<i>Limodorum abortivum</i>	<i>Sw.</i>	per.	sp.	— <i>purpurea</i>	<i>Armano</i>	lign.	tep.
<i>Linaria acutifolia</i>	<i>Fisch.</i>	ann.	s. d.	— <i>repens</i>	<i>Spr.</i>	lign.	frig.
— <i>acutiloba</i>	<i>Fisch.</i>	per.	s. d.	<i>Liquidambar orientale</i>	<i>Mill.</i>	lign.	s. d.
— <i>alpina</i>	<i>Desf.</i>	bien.	s. d.	— <i>styraciflua</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>bipartita</i>	<i>W.</i>	ann.	s. d.	<i>Liriodendrum Tulipifera</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>caulirrhizans</i>	<i>Delil.</i>	ann.	s. d.	— <i>integrifolium</i>	<i>Hrt.</i>	lign.	s. d.
— <i>chalepensis</i>	<i>Mill.</i>	ann.	s. d.	— <i>obtusilob.</i>	<i>H. Pat.</i>	lign.	s. d.
— <i>cirrhuosa</i>	<i>W.</i>	ann.	s. d.	<i>Lithospermum apulum</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>crenifolia</i>	<i>Delil.</i>	ann.	s. d.	— <i>arvense</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>Cymbalaria</i>	<i>W.</i>	per.	sp.	— <i>dispermum</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>dalmatica</i>	<i>Mill.</i>	ann.	s. d.	— <i>latifolium</i>	<i>Michx.</i>	per.	s. d.
— <i>Elatine</i>	<i>Desf.</i>	ann.	sp.	— <i>officinale</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>genistaefolia</i>	<i>Mill.</i>	per.	s. d.	— <i>orientale</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>junceae</i>	<i>DC.</i>	ann.	s. d.	— <i>purpureo-coerul.</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>linifolia</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.	— <i>tenuiflorum</i>	<i>L. fil.</i>	ann.	s. d.
— <i>Loeselii</i>	<i>Schweig.</i>	per.	s. d.	<i>Littorella lacustris</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>lusitanica</i>	<i>Spr.</i>	per.	frig.	<i>Loasa acerifolia</i>	<i>Juss.</i>	ann.	s. d.
— <i>macroura</i>	<i>Bieb.</i>	ann.	s. d.	— <i>nitida</i>	<i>Lam.</i>	ann.	s. d.
— <i>organifolia</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.	— <i>tricolor</i>	<i>Lindl.</i>	ann.	s. d.
— <i>Perezii</i>	<i>Gay</i>	ann.	s. d.	— <i>triloba</i>	<i>Juss.</i>	ann.	s. d.
— <i>pilosa</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.	<i>Lobelia arenaria</i>	<i>Salzm.</i>	ann.	s. d.
— <i>purpurea</i>	<i>Mill.</i>	per.	s. d.	— <i>azurea</i>	<i>H. Angl.</i>	ann.	s. d.
— <i>reflexa</i>	<i>Desf.</i>	per.	s. d.	— <i>bicolor</i>	<i>Curt.</i>	per.	tep.
— <i>repens</i>	<i>Steud.</i>	per.	s. d.	— <i>cardinalis</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>silenifolia</i>	<i>Hoffm.</i>	per.	frig.	— <i>coronopifolia</i>	<i>L.</i>	per.	frig.
— <i>simplex</i>	<i>DC.</i>	ann.	s. d.	— <i>decumbens</i>	<i>Rich.</i>	per.	tep.
— <i>spuria</i>	<i>W.</i>	ann.	sp.	— <i>fulgens</i>	<i>W.</i>	per.	tep.
— <i>triphylla</i>	<i>W.</i>	ann.	s. d.	— <i>hederacea</i>	<i>Ait.</i>	per.	tep.
— <i>vulgaris</i>	<i>Mill.</i>	per.	sp.	— <i>ignea</i>	<i>Arrab.</i>	per.	tep.
— <i>Webbiana</i>	<i>Vis.</i>	lign.	tep.	— <i>inflata</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
<i>Lindernia Pyxidaria</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>Nuttallii</i>	<i>R. et S.</i>	bien.	s. d.
<i>Linnaea borealis</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>splendens</i>	<i>W.</i>	per.	tep.
<i>Linosyris vulgaris</i>	<i>DC.</i>	per.	sp.	— <i>syphilitica</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>— liburnica</i>	<i>Sav.</i>	per.	s. d.	— <i>speciosa</i>	<i>Sweet.</i>	per.	s. d.
<i>Linum acuminatum</i>	<i>Much.</i>	per.	s. d.	<i>Lobularia maritima</i>	<i>Desf.</i>	per.	s. d.
— <i>angustifolium</i>	<i>Huds.</i>	per.	s. d.	— <i>nummularia</i>	<i>Steud.</i>	per.	s. d.
— <i>aquilinum</i>	<i>Molin.</i>	per.	frig.	— <i>spinosa</i>	<i>Steud.</i>	lign.	s. d.
— <i>asiaticum</i>	<i>Mart.</i>	ann.	s. d.	<i>Loeflingia hispanica</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>catharticum</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	<i>Lolium arvense</i>	<i>Wibb.</i>	ann.	sp.
— <i>fasciculare</i>	<i>Hort.</i>	per.	s. d.	— <i>Boucheanum</i>	<i>Kunth</i>	ann.	s. d.
— <i>gallicum</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>multiflorum</i>	<i>Lam.</i>	ann.	sp.
— <i>grandiflorum</i>	<i>Desf.</i>	per.	frig.	— <i>perenne</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>monadelphum</i>	<i>Mrt.</i>	per.	s. d.	— <i>cristatum</i>	<i>Pers.</i>	per.	sp.
— <i>narbonense</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>speciosum</i>	<i>Bieb.</i>	ann.	s. d.
— <i>nervosum</i>	<i>W. et K.</i>	per.	s. d.	— <i>temulentum</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>perenne</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Lomatia longifolia</i>	<i>R. Br.</i>	lign.	frig.
— <i>punctatum</i>	<i>Presl.</i>	per.	s. d.	— <i>silaifolia</i>	<i>R. Br.</i>	lign.	frig.
— <i>sibiricum</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.	<i>Lomatophyllum borboni-</i>			
— <i>squamulosum</i>	<i>Rudol.</i>	per.	s. d.	— <i>— cum W.</i>		lign.	cal.
— <i>tenuifolium</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>macrum</i>	<i>Salm.</i>	lign.	cal.
— <i>trigynum</i>	<i>Roxb.</i>	lign.	cal.	<i>Lonas inodora</i>	<i>Gaertn.</i>	ann.	s. d.
— <i>usitatissimum</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	<i>Lonicera alpigena</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
<i>Lippia asperifolia</i>	<i>Rich.</i>	lign.	frig.	— <i>canescens</i>	<i>Schouw.</i>	lign.	s. d.
— <i>citriodora</i>	<i>Kunth</i>	lign.	frig.	— <i>Caprifolium</i>	<i>L.</i>	lign.	sp.
— <i>montevidensis</i>	<i>Spr.</i>	lign.	tep.	— <i>chinensis</i>	<i>Wats.</i>	lign.	s. d.

Lonicera ciliata	<i>Mühlb.</i>	lign.	s. d.	Lupinus varius	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>coerulea</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	Luzula albida	<i>Desv.</i>	per.	sp.
— <i>etrusca</i>	<i>Savi</i>	lign.	s. d.	— <i>campestris</i>	<i>Desv.</i>	per.	sp.
— <i>grata</i>	<i>Ait.</i>	lign.	s. d.	— <i>pediformis</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.
— <i>implexa</i>	<i>Ait.</i>	lign.	s. d.	— <i>pilosa</i>	<i>W.</i>	per.	sp.
— <i>balearica</i>	<i>Viv.</i>	lign.	s. d.	— <i>sudetica</i>	<i>DC.</i>	per.	sp.
— <i>parviflora</i>	<i>Lam.</i>	lign.	s. d.	— <i>syriaca</i>	<i>Richen.</i>	per.	sp.
— <i>Periclymenum</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	Lychnis brachypetala	<i>Fisch.</i>	per.	s. d.
— <i>quercifol.</i>	<i>Meig.</i>	lign.	s. d.	— <i>Bungeana</i>	<i>F. et M.</i>	per.	s. d.
— <i>sempervirens</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>chalconica</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>tatarica</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>coronaria</i>	<i>Desv.</i>	per.	s. d.
— <i>sibirica</i>	<i>Hort.</i>	lign.	s. d.	— <i>corsica</i>	<i>Loisl.</i>	per.	s. d.
— <i>Xylosteum</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>dioica</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
Lopezia coronata	<i>Andr.</i>	ann.	s. d.	— <i>flos Cuculi</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>miniata</i>	<i>DC.</i>	lign.	cal.	— — <i>fl. pleno</i>	<i>Hort.</i>	per.	s. d.
— <i>racemosa</i>	<i>Cav.</i>	ann.	s. d.	— <i>flos Jovis</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
Lophanthus anisatus	<i>Benth.</i>	lign.	s. d.	— <i>fulgens</i>	<i>Fisch.</i>	per.	s. d.
— <i>chinensis</i>	<i>Benth.</i>	per.	s. d.	— <i>Githago</i>	<i>Lam.</i>	ann.	sp.
— <i>nepetoides</i>	<i>Benth.</i>	per.	s. d.	— <i>niccaensis</i>	<i>W.</i>	ann.	s. d.
— <i>rugosus</i>	<i>F. et M.</i>	lign.	s. d.	— <i>grandiflora</i>	<i>Jacq.</i>	per.	frig.
— <i>scrophulariaefolius</i>	<i>Benth.</i>	per.	s. d.	— <i>laeta</i>	<i>Ait.</i>	ann.	s. d.
Lophospermum erubescens	<i>Don</i>	per.	cal.	— <i>mutabilis</i>	<i>H. Dresd.</i>	per.	s. d.
— <i>Rhodochiton</i>	<i>D. Don</i>	lign.	cal.	— <i>pyrenaica</i>	<i>Berger.</i>	per.	s. d.
— <i>scandens</i>	<i>Don</i>	per.	cal.	Lycium afrum	<i>L.</i>	lign.	frig.
Lotus aristatus	<i>DC.</i>	ann.	s. d.	— <i>barbarum</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>corniculatus</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>europaeum</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>crassifolius</i>	<i>Pers.</i>	per.	sp.	— <i>lanceolatum</i>	<i>Poir.</i>	lign.	s. d.
— <i>tenuifolius</i>	<i>Poll.</i>	per.	sp.	— <i>ovatum</i>	<i>Duham.</i>	lign.	s. d.
— <i>villosus</i>	<i>Thuil.</i>	per.	sp.	— <i>Trevianum</i>	<i>R. et S.</i>	lign.	s. d.
— <i>creticus</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.	Lycopersicon cerasiforme	<i>Dun.</i>	ann.	s. d.
— <i>Gebelia</i>	<i>Vent.</i>	per.	frig.	— <i>esculentum</i>	<i>Mill.</i>	ann.	s. d.
— <i>hispidus</i>	<i>Desf.</i>	ann.	s. d.	— <i>Humboldtii</i>	<i>Dun.</i>	ann.	s. d.
— <i>Jacobaeus</i>	<i>L.</i>	per.	tep.	— <i>pyriforme</i>	<i>Dun.</i>	ann.	s. d.
— <i>fl. luteo</i>	<i>Hort.</i>	per.	tep.	Lycopsis flavescens	<i>Mey.</i>	ann.	s. d.
— <i>major</i>	<i>Scop.</i>	per.	sp.	— <i>versicolor</i>	<i>Stev.</i>	ann.	s. d.
— <i>ornithopodioides</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	Lycopus europaeus	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>suaveolens</i>	<i>Pers.</i>	per.	s. d.	— <i>exaltatus</i>	<i>Schrd.</i>	per.	sp.
Lourea Vespertilionis	<i>Desv.</i>	ann.	s. d.	— <i>virginicus</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
Lubinia mauritiana	<i>Spr.</i>	ann.	s. d.	Lygeum Spartium	<i>L.</i>	per.	s. d.
Luffa acutangula	<i>Ser.</i>	ann.	s. d.	Lyperia violacea	<i>G. Don</i>	lign.	cal.
— <i>aegyptiaca</i>	<i>DC.</i>	ann.	s. d.	Lysimachia ciliata	<i>Forst.</i>	per.	s. d.
Lunaria biennis	<i>Moench</i>	bien.	sp.	— <i>decurrens</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>rediviva</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>Nummularia</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
Lupinus albus	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>punctata</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>bicolor</i>	<i>Dougl.</i>	ann.	s. d.	— <i>verticillata</i>	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.
— <i>Cruikshanksii</i>	<i>Hook</i>	lign.	cal.	— <i>vulgaris</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>Hartwegii</i>	<i>Lindl.</i>	lign.	s. d.	Lythrum Graefferi	<i>Tenor.</i>	per.	s. d.
— <i>hirsutus</i>	<i>L.</i>	ann.	cal.	— <i>Hyssopifolia</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>micranthus</i>	<i>Dougl.</i>	ann.	s. d.	— <i>Salicaria</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>mutabilis</i>	<i>Sweet</i>	per.	tep.	— <i>pubescens</i>	<i>Pursh</i>	per.	s. d.
— <i>nootkatensis</i>	<i>Don</i>	per.	s. d.	— <i>tomentosum</i>	<i>Mill.</i>	per.	s. d.
— <i>pilosus</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>virgatum</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>Terminis</i>	<i>Forsk.</i>	ann.	s. d.	— — — — —			
— <i>tristis</i>	<i>Benth.</i>	per.	s. d.	Maclura aurantiaca	<i>Nutt.</i>	lign.	s. d.
				Madaria elegans	<i>DC.</i>	ann.	s. d.

<i>Madia mellosa</i>	<i>Molin.</i>	ann.	s. d.	<i>Malva leprosa</i>	<i>Orteg.</i>	per.	tep.
— <i>sativa</i>	<i>Molin.</i>	ann.	s. d.	— <i>limensis</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>stellata</i>	<i>F. et M.</i>	ann.	s. d.	— <i>mareotica</i>	<i>Delil.</i>	ann.	s. d.
— <i>viscosa</i>	<i>Cav.</i>	ann.	s. d.	— <i>mauritiana</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
<i>Magnolia acuminata</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>miniata</i>	<i>Cav.</i>	per.	tep.
— <i>auriculata</i>	<i>Lam.</i>	lign.	s. d.	— <i>moschata</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>cordata</i>	<i>Michx.</i>	lign.	s. d.	— <i>parviflora</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>fuscata</i>	<i>Andr.</i>	lign.	frig.	— <i>peruviana</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>glauca</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.	— <i>pulchella</i>	<i>Bernh.</i>	ann.	s. d.
— <i>grandiflora</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>purpurata</i>	<i>Lindl.</i>	per.	frig.
— <i>angustifolia</i>	<i>Hort.</i>	lign.	s. d.	— <i>rotundifolia</i>	<i>L.</i>	bien.	sp.
— <i>praecox</i>	<i>Hort.</i>	lign.	s. d.	— <i>sylvestris</i>	<i>L.</i>	bien.	sp.
— <i>macrophylla</i>	<i>Michx.</i>	lign.	frig.	— <i>tricuspidata</i>	<i>Ait.</i>	bien.	tep.
— <i>obovata</i>	<i>Thunb.</i>	lign.	s. d.	— <i>umbellata</i>	<i>Cav.</i>	lign.	frig.
— <i>discolor</i>	<i>Vent.</i>	lign.	s. d.	— <i>verticillata</i>	<i>L.</i>	per.	frig.
— <i>pygmaea</i>	<i>Hort.</i>	lign.	s. d.	<i>Malvaviscus arboreus</i>	<i>Cav.</i>	lign.	frig.
— <i>Norberthiana</i>	<i>Hort.</i>	lign.	s. d.	— <i>mollis</i>	<i>DC.</i>	lign.	frig.
— <i>stricta</i>	<i>Hort.</i>	lign.	s. d.	— <i>pilosus</i>	<i>DC.</i>	lign.	frig.
— <i>superba</i>	<i>Hort.</i>	lign.	s. d.	<i>Mammillaria acanthophle-</i>			
— <i>triumphans</i>	<i>Hort.</i>	lign.	s. d.	— <i>gma</i>	<i>Lehm.</i>	lign.	cal.
— <i>Umbrella</i>	<i>Desv.</i>	lign.	s. d.	— <i>acanthostephes</i>	<i>Lhm.</i>	lign.	cal.
— <i>Yulan</i>	<i>Desf.</i>	lign.	s. d.	— <i>aciculata</i>	<i>Otto</i>	lign.	cal.
— <i>Soulangeana</i>	<i>Hrt.</i>	lign.	s. d.	— <i>angularis</i>	<i>H. Ber.</i>	lign.	cal.
— <i>speciosa</i>	<i>Hort.</i>	lign.	s. d.	— <i>aureiceps</i>	<i>Lemair.</i>	lign.	cal.
<i>Mahernia bipinnata</i>	<i>DC.</i>	lign.	tep.	— <i>bicolor</i>	<i>Lehm.</i>	lign.	cal.
— <i>glabrata</i>	<i>Cav.</i>	lign.	tep.	— <i>eolumnaris</i>	<i>Mart.</i>	lign.	cal.
<i>Mahonia Aquifolium</i>	<i>Nutt.</i>	lign.	s. d.	— <i>cornifera</i>	<i>DC.</i>	lign.	cal.
— <i>fascicularis</i>	<i>DC.</i>	lign.	s. d.	— <i>coronaria</i>	<i>Haw.</i>	lign.	cal.
— <i>repens</i>	<i>G. Don</i>	lign.	s. d.	— <i>crinita</i>	<i>DC.</i>	lign.	cal.
<i>Majorana hortensis</i>	<i>Moench</i>	lign.	frig.	— <i>decipiens</i>	<i>Scheidw.</i>	lign.	cal.
— <i>Onites</i>	<i>Benth.</i>	lign.	s. d.	— <i>discolor</i>	<i>Haw.</i>	lign.	cal.
<i>Malachra capitata</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>echinata</i>	<i>DC.</i>	lign.	cal.
— <i>fasciata</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	cal.	— <i>densa</i>	<i>Lk.</i>	lign.	cal.
<i>Malcolmia africana</i>	<i>R. Br.</i>	ann.	s. d.	— <i>elegans</i>	<i>DC.</i>	lign.	cal.
— <i>arenaria</i>	<i>DC.</i>	ann.	s. d.	— <i>elongata</i>	<i>DC.</i>	lign.	cal.
— <i>maritima</i>	<i>R. Br.</i>	ann.	s. d.	— <i>eriantha</i>	<i>H. Ber.</i>	lign.	cal.
— <i>parviflora</i>	<i>DC.</i>	ann.	s. d.	— <i>flavescens</i>	<i>DC.</i>	lign.	cal.
<i>Malope grandiflora</i>	<i>Hort.</i>	bien.	s. d.	— <i>Galeotti</i>	<i>Scheidw.</i>	lign.	cal.
— <i>malaeoides</i>	<i>L.</i>	bien.	s. d.	— <i>gladiata</i>	<i>Mart.</i>	lign.	cal.
<i>Malpighia coccifera</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.	— <i>glochidiata</i>	<i>Mart.</i>	lign.	cal.
— <i>glabra</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.	— <i>alba</i>	<i>Hort.</i>	lign.	cal.
— <i>urens</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.	— <i>rosea</i>	<i>Hort.</i>	lign.	cal.
— <i>volubilis</i>	<i>Sims</i>	lign.	cal.	— <i>gracilis</i>	<i>Hort.</i>	lign.	cal.
<i>Malva Alcea</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>Hystrix</i>	<i>Mart.</i>	lign.	cal.
— <i>asperrima</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	frig.	— <i>Lehmanni</i>	<i>H. Ber.</i>	lign.	cal.
— <i>borbonica</i>	<i>W.</i>	lign.	cal.	— <i>longimamma</i>	<i>DC.</i>	lign.	cal.
— <i>borealis</i>	<i>Liljeb.</i>	per.	s. d.	— <i>magnimamma</i>	<i>Haw.</i>	lign.	cal.
— <i>bryonifolia</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.	— <i>obscura</i>	<i>Hort.</i>	lign.	cal.
— <i>caroliniana</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>parvimamma</i>	<i>Haw.</i>	lign.	cal.
— <i>capensis</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>polyedra</i>	<i>Mart.</i>	lign.	cal.
— <i>crispa</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>polythele</i>	<i>Mart.</i>	lign.	cal.
— <i>fastigiata</i>	<i>Cav.</i>	per.	frig.	— <i>pusilla</i>	<i>DC.</i>	lign.	cal.
— <i>fragrans</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	cal.	— <i>major</i>	<i>Hort.</i>	lign.	cal.
— <i>italica</i>	<i>Pollin.</i>	per.	sp.	— <i>pycnacantha</i>	<i>Mart.</i>	lign.	cal.
— <i>lactea</i>	<i>Ait.</i>	lign.	cal.	— <i>quadrispina</i>	<i>Mart.</i>	lign.	cal.
— <i>lasio melanocarpa</i>	<i>Sy</i>	per.	s. d.	— <i>rhodantha</i>	<i>Lk.</i>	lign.	cal.

Mammillaria <i>rutila</i> Zuccar.	lign.	cal.	Medicago <i>aculeata</i> W.	ann.	s. d.
— <i>Schellasi</i> Hort.	lign.	cal.	— <i>apiculata</i> W.	ann.	s. d.
— <i>Seitziana</i> Mart.	lign.	cal.	— <i>arborea</i> L.	lign.	frig.
— <i>simplex</i> Haw.	lign.	cal.	— <i>carstiensis</i> Jacq.	per.	sp.
— <i>sphacelata</i> Mart.	lign.	cal.	— <i>caspica</i> Fisch.	ann.	s. d.
— <i>subangularis</i> DC.	lign.	cal.	— <i>catalonica</i> Schrk.	ann.	s. d.
— <i>subpolyedra</i> Salm.	lign.	cal.	— <i>circinata</i> L.	ann.	s. d.
— <i>sulcimamma</i> Hort.	lign.	cal.	— <i>cretacea</i> Bieb.	per.	s. d.
— <i>tentaculata</i> H. Ber.	lign.	cal.	— <i>denticulata</i> W.	ann.	s. d.
— <i>tenuis</i> DC.	lign.	cal.	— <i>Echinus</i> DC.	ann.	s. d.
— <i>uberiformis</i> Zuccar.	lign.	cal.	— <i>elegans</i> Jacq.	ann.	s. d.
— <i>vetula</i> Mart.	lign.	cal.	— <i>falcata</i> L.	per.	sp.
— <i>Wildiana</i> Otto	lign.	cal.	— <i>Gerardi</i> W. et K.	ann.	sp.
— <i>Zuccariniana</i> Mart.	lign.	cal.	— <i>graeca</i> Horn.	ann.	s. d.
Mandragora <i>vernalis</i> Bertl.	per.	s. d.	— <i>laciniata</i> All.	ann.	s. d.
Manettia <i>cordifolia</i> Mart.	per.	cal.	— <i>lappacea</i> Desv.	ann.	s. d.
Manglesia <i>cuneata</i> Endl.	lign.	frig.	— <i>littoralis</i> Rhode	ann.	s. d.
Maranta <i>arundinacea</i> L.	per.	cal.	— <i>lupulina</i> L.	ann.	s. d.
Margaranthus <i>solanaceus</i> Schlcht.	per.	cal.	— <i>maculata</i> W.	ann.	sp.
Margyricarpus <i>setosus</i> R.P.	lign.	tep.	— <i>marginata</i> W.	ann.	s. d.
Marica <i>coelestis</i> Lehm.	per.	frig.	— <i>microdon</i> Fhrb.	ann.	s. d.
— <i>Northiana</i> Ker	per.	frig.	— <i>minima</i> Lam.	ann.	sp.
Mariscus <i>ovularis</i> Vahl	per.	s. d.	— <i>nigra</i> W.	ann.	s. d.
— <i>umbellatus</i> Vahl	per.	tep.	— <i>orbicularis</i> W.	ann.	s. d.
Marrubium <i>Alysson</i> L.	per.	s. d.	— <i>prostrata</i> Jacq.	per.	s. d.
— <i>candidissimum</i> L.	per.	s. d.	— <i>sativa</i> L.	per.	sp.
— <i>parviflorum</i> F. et M.	per.	s. d.	— <i>scutellata</i> Lam.	ann.	s. d.
— <i>peregrinum</i> L.	per.	s. d.	— <i>tentaculata</i> W.	ann.	s. d.
— <i>propinquum</i> F. et M.	per.	s. d.	— <i>Terebellum</i> W.	ann.	s. d.
— <i>vulgare</i> L.	per.	sp.	— <i>tuberculata</i> W.	ann.	s. d.
— <i>apulum</i> Tenor.	per.	s. d.	— <i>turbinata</i> W.	ann.	s. d.
Marsdenia <i>erecta</i> R. Br.	lign.	s. d.	Melaleuca <i>armillaris</i> Sm.	lign.	frig.
Martynia <i>proboscidea</i> Glox.	ann.	s. d.	— <i>decussata</i> R. Br.	lign.	frig.
Maruta <i>Cotula</i> Cass.	ann.	sp.	— <i>diosmaefolia</i> Andr.	lign.	frig.
Matricaria <i>Chamomilla</i> L.	ann.	sp.	— <i>fulgens</i> R. Br.	lign.	frig.
— <i>inodora</i> L.	ann.	s. d.	— <i>hypericifolia</i> Sm.	lign.	frig.
— <i>nigellaefolia</i> DC.	ann.	s. d.	— <i>linarifolia</i> Sm.	lign.	frig.
Matthiola <i>annua</i> Sweet	ann.	s. d.	— <i>pinifolia</i> Colla	lign.	frig.
— <i>arborescens</i> Schrk.	lign.	frig.	— <i>pulchella</i> R. Br.	lign.	frig.
— <i>fenestralis</i> R. Br.	bien.	frig.	— <i>sphaerica</i> Hort.	lign.	frig.
— <i>incana</i> R. Br.	bien.	s. d.	— <i>squamea</i> Labill.	lign.	frig.
— <i>parviflora</i> R. Br.	ann.	s. d.	— <i>squarrosa</i> Sm.	lign.	frig.
— <i>patens</i> Presl	lign.	s. d.	— <i>stypelioides</i> Sm.	lign.	frig.
— <i>saxatilis</i> Bernh.	lign.	frig.	— <i>thymifolia</i> Sm.	lign.	frig.
— <i>sinuata</i> R. Br.	bien.	s. d.	Melampodium <i>paludosum</i> Humb.	ann.	s. d.
— <i>torulosa</i> DC.	ann.	s. d.	— <i>perfoliatum</i> Humb.	ann.	s. d.
— <i>tricuspidata</i> R. Br.	ann.	s. d.	Melampyrum <i>arvense</i> L.	ann.	sp.
Maurandia <i>antirrhiniflora</i> Humb.	lign.	cal.	— <i>barbatum</i> W. et K.	ann.	sp.
— <i>Barcklayana</i> Lindl.	lign.	cal.	— <i>purpureum</i> Poll.	ann.	sp.
— <i>semperlorens</i> Jacq.	lign.	cal.	— <i>cristatum</i> L.	ann.	sp.
Maxillaria <i>aromatica</i> Grah.	per.	cal.	— <i>memorosum</i> L.	ann.	sp.
— <i>Harrisoniae</i> Lindl.	per.	cal.	— <i>pratense</i> L.	ann.	sp.
— <i>squalens</i> Hook.	per.	cal.	Melanthera <i>deltoidea</i> Michx.	ann.	s. d.
— <i>stapelioides</i> Lindl.	per.	cal.	— <i>hastata</i> Michx.	ann.	s. d.

<i>Melastoma coerulea</i>	<i>Pav.</i>	lign.	cal.	<i>Mentha rotundifolia</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>cymosa</i>	<i>Vent.</i>	lign.	cal.	— <i>suavis</i>	<i>Gusson.</i>	per.	s. d.
<i>Melia Azedarach</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>ayvestris</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>baccifera</i>	<i>Roth.</i>	lign.	frig.	— <i>candicans</i>	<i>Crantz.</i>	per.	s. d.
— <i>sempervirens</i>	<i>Sw.</i>	lign.	frig.	— <i>gratissima</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.
<i>Melianthus major</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.	— <i>undulata</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.
— <i>minor</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.	— <i>urticifolia</i>	<i>Tenor.</i>	per.	s. d.
<i>Melica altissima</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>viridis</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>Bauhini</i>	<i>All.</i>	per.	s. d.	<i>Mentzelia hispida</i>	<i>W.</i>	lign.	cal.
— <i>ciliata</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Menyanthes trifoliata</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>minuta</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Menziesia polifolia</i>	<i>Juss.</i>	lign.	s. d.
— <i>nutans</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	<i>Mercurialis aunua</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>uniflora</i>	<i>Retz.</i>	per.	sp.	— <i>ovata</i>	<i>Sternb.</i>	per.	s. d.
<i>Melilotus alba</i>	<i>Desv.</i>	ann.	sp.	— <i>perennis</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>Bonplandii</i>	<i>Tenor.</i>	ann.	s. d.	<i>Meristostigma corymbosum</i>	<i>Dietr.</i>	per.	frig.
— <i>coerulea</i>	<i>Lam.</i>	ann.	s. d.	<i>Mesembryanthemum acina-</i>			
— <i>dentata</i>	<i>W.</i>	bien.	s. d.	— <i>ciforme</i>	<i>L.</i>	lign.	tep.
— <i>diffusa</i>	<i>Trev.</i>	ann.	s. d.	— <i>acutum</i>	<i>Haw.</i>	per.	tep.
— <i>gracilis</i>	<i>DC.</i>	ann.	s. d.	— <i>albidum</i>	<i>L.</i>	per.	tep.
— <i>italica</i>	<i>Lam.</i>	ann.	s. d.	— <i>aloides</i>	<i>Haw.</i>	per.	tep.
— <i>messanensis</i>	<i>Desf.</i>	ann.	s. d.	— <i>anceps</i>	<i>Haw.</i>	lign.	tep.
— <i>officinalis</i>	<i>L.</i>	bien.	sp.	— <i>aureum</i>	<i>L.</i>	lign.	tep.
— <i>parviflora</i>	<i>Desf.</i>	ann.	sp.	— <i>australe</i>	<i>Ait.</i>	lign.	tep.
— <i>taurica</i>	<i>H. Ber.</i>	bien.	s. d.	— <i>barbatum</i>	<i>L.</i>	lign.	tep.
<i>Melissa Acinos</i>	<i>Benth.</i>	ann.	sp.	— <i>blandum</i>	<i>Haw.</i>	lign.	tep.
— <i>alpina</i>	<i>Benth.</i>	per.	s. d.	— <i>calamiforme</i>	<i>L.</i>	per.	tep.
— <i>Calamintha</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>caninum</i>	<i>Haw.</i>	per.	tep.
— <i>Clinopodium</i>	<i>Benth.</i>	per.	sp.	— <i>caulescens</i>	<i>Mill.</i>	lign.	tep.
— <i>cordifolia</i>	<i>Pers.</i>	per.	s. d.	— <i>clavatum</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	tep.
— <i>grandiflora</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>coccineum</i>	<i>Haw.</i>	lign.	tep.
— <i>graveolens</i>	<i>Benth.</i>	ann.	s. d.	— <i>conspicuum</i>	<i>Haw.</i>	lign.	tep.
— <i>Nepeta</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>cordifolium</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>athonica</i>	<i>Bernh.</i>	per.	s. d.	— <i>corniculatum</i>	<i>L.</i>	per.	tep.
— <i>officinalis</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>crassifolium</i>	<i>L.</i>	per.	tep.
— <i>patavina</i>	<i>Benth.</i>	per.	frig.	— <i>cruciatum</i>	<i>Haw.</i>	per.	tep.
<i>Melittis Melissophyllum</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>crystallinum</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
<i>Melocactus amoenus</i>	<i>Hffmng.</i>	lign.	cal.	— <i>glaciale</i>	<i>Haw.</i>	ann.	s. d.
— <i>communis</i>	<i>DC.</i>	lign.	cal.	— <i>deflexum</i>	<i>Ait.</i>	lign.	tep.
— <i>meonacanthus</i>	<i>Lk. O.</i>	lign.	cal.	— <i>deltoides</i>	<i>Mill.</i>	lign.	tep.
<i>Melochia pyramidata</i>	<i>L.</i>	per.	cal.	— <i>densum</i>	<i>Haw.</i>	lign.	tep.
<i>Melothria pendula</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>denticulatum</i>	<i>Haw.</i>	per.	tep.
<i>Memecylon angulatum</i>	<i>Rhb.</i>	lign.	frig.	— <i>depressum</i>	<i>Haw.</i>	per.	tep.
<i>Meniocus linifolius</i>	<i>Desv.</i>	ann.	s. d.	— <i>lividum</i>	<i>Hort.</i>	per.	tep.
<i>Menispermum canadense</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>difforme</i>	<i>L.</i>	per.	tep.
— <i>virginicum</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>diversifolium</i>	<i>Haw.</i>	lign.	tep.
— <i>smilacinum</i>	<i>DC.</i>	lign.	s. d.	— <i>dolabriforme</i>	<i>L.</i>	lign.	tep.
<i>Mentha aquatica</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>echinatum</i>	<i>Ait.</i>	lign.	tep.
— <i>citrata</i>	<i>Ehrh.</i>	per.	s. d.	— <i>edule</i>	<i>L.</i>	lign.	tep.
— <i>arvensis</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>falciforme</i>	<i>Haw.</i>	lign.	tep.
— <i>austriaca</i>	<i>Jacq.</i>	per.	sp.	— <i>felinum</i>	<i>Lam.</i>	per.	tep.
— <i>nudiuscula</i>	<i>Berth.</i>	per.	sp.	— <i>floribundum</i>	<i>Haw.</i>	lign.	tep.
— <i>borealis</i>	<i>Michx.</i>	per.	s. d.	— <i>forficatum</i>	<i>L.</i>	lign.	tep.
— <i>cervina</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>formosum</i>	<i>Haw.</i>	lign.	tep.
— <i>crispa</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>geniculiflorum</i>	<i>L.</i>	lign.	tep.
— <i>piperita</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>glaciatum</i>	<i>Hort.</i>	lign.	tep.
— <i>Pulegium</i>	<i>L.</i>	per.	sp.				

Mesembryanthemum glau-				Mesembryanthemum villo-			
— cescens	Haw.	lign.	tep.	— sum	L.	lign.	tep.
— glaucum	L.	lign.	tep.	— violaceum	DC.	lign.	tep.
— gracile	Haw.	lign.	tep.	Mespilus germanica	L.	lign.	sp.
— grossum	Ait.	lign.	tep.	Metabasis aethnensis	DC.	ann.	s. d.
— heteropetalum	Haw.	lign.	tep.	— cretensis	DC.	bien.	s. d.
— hirtellum	Haw.	lign.	tep.	Metrosideros corifolia	Vent.	lign.	frig.
— inclaudens	Haw.	lign.	tep.	— glauca	Bonpl.	lign.	frig.
— incurvum	Ait.	lign.	tep.	Michauxia campanuloides	Juss.	bien.	frig.
— lacerum	Haw.	lign.	tep.	— laevigata	Vent.	bien.	frig.
— latum	Haw.	lign.	tep.	Microlonchus salmanticus	DC.	bien.	s. d.
— laxum	W.	lign.	tep.	Micromeria filiformis	Benth.	lign.	s. d.
— linguaeforme	L.	per.	tep.	— graeca	Benth.	lign.	s. d.
— assurgens	Hort.	per.	tep.	— juliana	Benth.	lign.	s. d.
— rufescens	Haw.	per.	tep.	— marifolia	Benth.	lign.	s. d.
— longum	Haw.	per.	tep.	— microphylla	Benth.	lign.	s. d.
— loreum	Haw.	lign.	tep.	— nervosa	Benth.	lign.	frig.
— maximum	Haw.	lign.	tep.	— obovata	Benth.	lign.	frig.
— medium	Haw.	per.	tep.	— parviflora	Reichb.	lign.	s. d.
— micans	L.	lign.	tep.	— tenuifolia	Reichb.	lign.	s. d.
— muricatum	Haw.	lign.	tep.	Micropus erectus	L.	ann.	s. d.
— mutabile	Haw.	lign.	tep.	— supinus	L.	ann.	s. d.
— nitidum	Haw.	lign.	tep.	Microseris pygmaea	DC.	ann.	s. d.
— nobile	Haw.	per.	tep.	Microtea debilis	Sw.	ann.	s. d.
— noctiflorum	L.	lign.	tep.	— maypurensis	G. Don.	ann.	s. d.
— patens	W.	lign.	tep.	Milium effusum	L.	per.	sp.
— perfoliatum	Haw.	lign.	tep.	Millinaeleontodontoides	Cas.	per.	s. d.
— monacanth.	DC.	lign.	tep.	Mimetes coerulea	H. Hügel	lign.	tep.
— pinnatifidum	L.	ann.	s. d.	Mimosa asperata	L.	lign.	cal.
— polyanthum	Haw.	lign.	tep.	— pudica	L.	ann.	cal.
— pomeridianum	L.	ann.	s. d.	— sensitiva	L.	lign.	cal.
— praepingue	Haw.	per.	tep.	— strigosa	W.	lign.	cal.
— pulchellum	W.	lign.	tep.	Mimulus andicola	Humb.	per.	tep.
— purpurascens	Salm.	per.	tep.	— cardinalis	L.	ann.	s. d.
— ramulosum	Haw.	lign.	tep.	— glutinosus	Wendl.	lign.	tep.
— rubricaule	W.	lign.	tep.	— guttatus	DC.	ann.	s. d.
— Salmii	Haw.	per.	tep.	— luteus	L.	per.	frig.
— elongatum	Salm.	per.	tep.	— moschatus	Dougl.	per.	frig.
— semicruciatum	S.	per.	tep.	— ocellatus	Berter.	per.	frig.
— sarmentosum	Haw.	lign.	tep.	— — Smithii	Lindl.	per.	frig.
— scalpratum	Haw.	per.	tep.	— pilosiusculus	Humb.	per.	frig.
— speciosum	Haw.	lign.	tep.	— propinquus	Lindl.	per.	s. d.
— spectabile	Haw.	lign.	tep.	— ringens	L.	per.	s. d.
— spinosum	L.	lign.	tep.	— roseus	Lindl.	per.	frig.
— splendens	L.	lign.	tep.	Mirabilis ambigua	Trautv.	per.	frig.
— stramineum	W.	per.	tep.	— dichotoma	L.	per.	frig.
— strumosum	Haw.	lign.	tep.	— hybrida	Lepell.	per.	frig.
— subulatum	Mill.	per.	tep.	— Jalapa	L.	per.	frig.
— tenuifolium	L.	lign.	tep.	— planiflora	Trautv.	per.	frig.
— tigrinum	Haw.	per.	tep.	— longiflora	L.	per.	frig.
— tortuosum	L.	lign.	tep.	Mitracarpum stylosum	Chms.	ann.	s. d.
— tuberosum	L.	lign.	tep.	Moechringia muscosa	L.	per.	s. d.
— umbellatum	L.	lign.	tep.	Mogiphanes brasiliensis	Mrt.	per.	cal.
— uncinatum	L.	lign.	tep.	— straminea	Mart.	ann.	s. d.
— glaucescens	Salm.	lign.	tep.				
— verruculatum	L.	lign.	tep.				

<i>Molinia coerules</i>	<i>Moench</i>	per.	sp.	<i>Musa rosacea</i>	<i>Jacq.</i>	per.	cal.
— — <i>altissima</i>	<i>Lk.</i>	per.	sp.	— <i>sapientum</i>	<i>L.</i>	per.	cal.
— <i>serotina</i>	<i>M. et K.</i>	per.	sp.	<i>Muscari autumnale</i>	<i>Guss.</i>	per.	frig.
<i>Mollugo Cerviana</i>	<i>Ser.</i>	ann.	s. d.	— <i>botryoides</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
<i>Molucella spinosa</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>commutatum</i>	<i>Guss.</i>	per.	frig.
<i>Momordica Balsamina</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>comosum</i>	<i>Mill.</i>	per.	sp.
— <i>Charantia</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>monstræsum</i>	<i>Mill.</i>	per.	s. d.
— <i>Elaterium</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>moschatum</i>	<i>Desf.</i>	per.	s. d.
<i>Morarda amplexicaulis</i>	<i>Bi-</i>			— <i>racemosum</i>	<i>W.</i>	per.	sp.
— — — <i>sch.</i>	<i>per.</i>	s. d.		<i>Mutisia speciosa</i>	<i>Hook.</i>	per.	cal.
— <i>aristata</i>	<i>Nutt.</i>	per.	s. d.	<i>Myagræum perfoliatum</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>ciliata</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Myoporæum ellipticum</i>	<i>R. B.</i>	lign.	frig.
— <i>didyma</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>viscosum</i>	<i>R. Br.</i>	lign.	frig.
— <i>fistulosa</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Myosotis arvensis</i>	<i>Sibth.</i>	ann.	sp.
— <i>Kalmiana</i>	<i>Pursh</i>	per.	s. d.	— <i>intermedia</i>	<i>Lk.</i>	bien.	s. d.
— <i>mollis</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>palustris</i>	<i>Wüh.</i>	per.	sp.
<i>Monetia barlerioides</i>	<i>Herit.</i>	lign.	frig.	— <i>sylvatica</i>	<i>Ehrh.</i>	per.	s. d.
<i>Monsonia ovata</i>	<i>Cav.</i>	bien.	frig.	<i>Myriactis Gmelini</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.
<i>Moræa Candolleana</i>	<i>Spr.</i>	per.	frig.	<i>Myrica cerifera</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>collina</i>	<i>Thunb.</i>	per.	frig.	— <i>cordifolia</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.
— <i>edulis</i>	<i>Ker.</i>	per.	frig.	— <i>Faya</i>	<i>Ait.</i>	lign.	frig.
<i>Morina longifolia</i>	<i>Wall.</i>	per.	frig.	— <i>Gale</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
<i>Morus alba</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>quercifolia</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.
— — <i>constantinopoli-</i>				— <i>segregata</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	frig.
— — — <i>tana Poir.</i>	<i>lign.</i>	s. d.		— <i>serrata</i>	<i>Lam.</i>	lign.	frig.
— — <i>japonica</i>	<i>Nois.</i>	lign.	s. d.	<i>Myriogyne minuta</i>	<i>Less.</i>	ann.	s. d.
— — <i>italica</i>	<i>Poir.</i>	lign.	s. d.	<i>Myriophyllum spicatum</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— — <i>latifolia</i>	<i>Poir.</i>	lign.	s. d.	— <i>verticillatum</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— — <i>macrophylla</i>	<i>Mo-</i>			<i>Myrosma cannaefolia</i>	<i>L. fil.</i>	per.	cal.
— — — <i>ret.</i>	<i>lign.</i>	s. d.		<i>Myrrhis odorata</i>	<i>Scop.</i>	per.	s. d.
— — <i>nervosa</i>	<i>Delil.</i>	lign.	s. d.	<i>Myrsine melanophleas</i>	<i>R. B.</i>	lign.	frig.
— — <i>pumila</i>	<i>Nois.</i>	lign.	s. d.	— <i>retusa</i>	<i>Ait.</i>	lign.	frig.
— — <i>tatarica</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	<i>Myrsiphyllum angustifo-</i>			
— <i>intermedia</i>	<i>Perrot.</i>	lign.	s. d.	— — <i>lium W.</i>	<i>per.</i>	frig.	
— <i>nigra</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>asparagoides</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.
— <i>scabra</i>	<i>Moret.</i>	lign.	s. d.	<i>Myrtus belgica</i>	<i>Mill.</i>	lign.	frig.
— <i>rubra</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>boetica</i>	<i>Mill.</i>	lign.	frig.
— — <i>canadensis</i>	<i>Poir.</i>	lign.	s. d.	— <i>communis</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.
— — <i>pennsylvanica</i>	<i>Nois.</i>	lign.	s. d.	— <i>italica</i>	<i>Mill.</i>	lign.	frig.
<i>Morysia dentata</i>	<i>DC.</i>	lign.	frig.	— <i>moschata</i>	<i>Hort.</i>	lign.	frig.
<i>Moscharia pinnatifida</i>	<i>R. P.</i>	bien.	tep.	— <i>tarentina</i>	<i>Mill.</i>	lign.	frig.
<i>Moschosma ocyroides</i>	<i>Bth.</i>	ann.	s. d.	— <i>Willdenowii</i>	<i>Spr.</i>	lign.	cal.
— <i>polystachyum</i>	<i>Bth.</i>	ann.	s. d.				
<i>Mozinna spathulata</i>	<i>Orteg.</i>	lign.	tep.	<i>Nabalus suavis</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.
<i>Muhlenbergia foliosa</i>	<i>Trin.</i>	per.	s. d.	<i>Najas marina</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>glomerata</i>	<i>Trin.</i>	per.	s. d.	<i>Nandina domestica</i>	<i>Thunb.</i>	lign.	s. d.
<i>Mulgedium alpinum</i>	<i>Cass.</i>	per.	s. d.	<i>Narcissus biflorus</i>	<i>Curt.</i>	per.	s. d.
— <i>floridanum</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.	— <i>Bulbocodium</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>leucophaeum</i>	<i>DC.</i>	bien.	s. d.	— <i>dubius</i>	<i>Gou.</i>	per.	s. d.
— <i>sibiricum</i>	<i>Less.</i>	per.	s. d.	— <i>incomparabilis</i>	<i>Curt.</i>	per.	s. d.
<i>Murraya exotica</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.	— <i>Jonquilla</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
<i>Murucuja ocellata</i>	<i>Pers.</i>	lign.	cal.	— <i>odorus</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
<i>Musa chinensis</i>	<i>Sweet</i>	per.	cat.	— <i>poeticus</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>coccinea</i>	<i>Andr.</i>	per.	cal.	— <i>polyanthos</i>	<i>Loisl.</i>	per.	s. d.
— <i>Dacea</i>	<i>Hort.</i>	per.	cal.	— <i>præcox</i>	<i>Tenor.</i>	per.	s. d.
— <i>discolor</i>	<i>Hort.</i>	per.	cal.	— <i>Pseudo-Narcissus</i>	<i>L.</i>	per.	sp.

<i>Narcissus Tazetta</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Nicotiana chinensis Fisch.</i>	<i>lign.</i>	frig.
<i>Nardosmia fragrans</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>commutata F. et M.</i>	<i>per.</i>	frig.
<i>Nardus stricta</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>decurrens Agdh.</i>	<i>ann.</i>	s. d.
<i>Nasturtium amphibium</i>				— <i>dilatata Lk.</i>	<i>ann.</i>	s. d.
— <i>atrovirens R. Br.</i>		per.	sp.	— <i>fragrans Bernh.</i>	<i>ann.</i>	s. d.
— <i>Camelinae DC.</i>		ann.	s. d.	— <i>fruticosa L.</i>	<i>lign.</i>	frig.
— <i>erectum F. et M.</i>		ann.	s. d.	— <i>glauca Grah.</i>	<i>lign.</i>	frig.
— <i>officinale Trevir.</i>		ann.	s. d.	— <i>Langsdorffii Weinm.</i>	<i>ann.</i>	s. d.
— <i>palustre R. Br.</i>		per.	sp.	— <i>macrophylla Spr.</i>	<i>ann.</i>	s. d.
— <i>sylvestre DC.</i>		ann.	sp.	— <i>multivalvis Lindl.</i>	<i>ann.</i>	s. d.
— <i>sylvestre R. Br.</i>		per.	s. d.	— <i>noctiflora Hook.</i>	<i>ann.</i>	s. d.
<i>Neja gracilis Don</i>		<i>lign.</i>	cal.	— <i>paniculata L.</i>	<i>ann.</i>	s. d.
<i>Nelumbium luteum W.</i>		<i>per.</i>	frig.	— <i>plumbaginifolia Viv.</i>	<i>ann.</i>	s. d.
— <i>speciosum W.</i>		<i>per.</i>	frig.	— <i>rustica L.</i>	<i>ann.</i>	s. d.
<i>Nemesia floribunda Lehm.</i>		<i>ann.</i>	s. d.	— <i>sanguinea Lk. et O.</i>	<i>ann.</i>	s. d.
<i>Nemophila atomaria F. M.</i>		<i>ann.</i>	s. d.	— <i>Tabacum L.</i>	<i>ann.</i>	s. d.
— <i>insignis Benth.</i>		<i>ann.</i>	s. d.	<i>Nierembergia gracilis Hook.</i>	<i>per.</i>	tep.
— <i>parviflora Dougl.</i>		<i>ann.</i>	s. d.	<i>Nigella arvensis L.</i>	<i>ann.</i>	sp.
— <i>phacelioides Bart.</i>		<i>ann.</i>	s. d.	— <i>coarctata Gmel.</i>	<i>ann.</i>	s. d.
<i>Neottia procera Ker</i>		<i>per.</i>	cal.	— <i>damascena L.</i>	<i>ann.</i>	sp.
<i>Nepenthes Phyllamphora W.</i>		<i>per.</i>	cal.	— <i>orientalis L.</i>	<i>ann.</i>	s. d.
<i>Nepeta botryoides Ait.</i>		<i>per.</i>	s. d.	— <i>sativa L.</i>	<i>ann.</i>	s. d.
— <i>Cataria L.</i>		<i>per.</i>	sp.	<i>Nigritella fragrans Rchb.</i>	<i>per.</i>	s. d.
— <i>cyanea Stev.</i>		<i>per.</i>	s. d.	<i>Nissolia fruticosa L.</i>	<i>lign.</i>	cal.
— <i>fissa Mey.</i>		<i>per.</i>	s. d.	<i>Nolana atriplicifolia D. Don</i>	<i>ann.</i>	s. d.
— <i>Glechoma Benth.</i>		<i>per.</i>	sp.	— <i>prostrata L.</i>	<i>ann.</i>	s. d.
— <i>granatensis Boiss.</i>		<i>per.</i>	s. d.	<i>Nonea lutea DC.</i>	<i>ann.</i>	s. d.
— <i>grandiflora Bieb.</i>		<i>per.</i>	s. d.	— <i>pulla Moench.</i>	<i>ann.</i>	s. d.
— <i>lavandulacea L. fil.</i>		<i>per.</i>	s. d.	— <i>vesicaria Rchb.</i>	<i>ann.</i>	s. d.
— <i>macrantha Fisch.</i>		<i>per.</i>	s. d.	<i>Notobasis syriaca Cass.</i>	<i>ann.</i>	s. d.
— <i>madagascariensis Lam.</i>		<i>per.</i>	frig.	<i>Notoceras canariense R. Br.</i>	<i>ann.</i>	s. d.
— <i>melissaefolia Lam.</i>		<i>per.</i>	s. d.	<i>Nuphar luteum Sm.</i>	<i>per.</i>	sp.
— <i>Mussini Bieb.</i>		<i>per.</i>	s. d.	<i>Nymphæa alba L.</i>	<i>per.</i>	cal.
— <i>Nepetella L.</i>		<i>per.</i>	s. d.	— <i>coerulea Savign.</i>	<i>per.</i>	cal.
— <i>nuda L.</i>		<i>per.</i>	s. d.	— <i>odorata Ait.</i>	<i>per.</i>	frig.
— <i>pannonica L.</i>		<i>per.</i>	s. d.	<i>Obeliscaria columnaris DC.</i>	<i>per.</i>	s. d.
— <i>obtusata E. Mey.</i>		<i>per.</i>	s. d.	— <i>pinnata DC.</i>	<i>per.</i>	s. d.
— <i>spathacea H. Gor.</i>		<i>per.</i>	s. d.	<i>Ocimum acutum Thunb.</i>	<i>ann.</i>	s. d.
— <i>tuberosa L.</i>		<i>per.</i>	s. d.	— <i>atrovirens H. Kew.</i>	<i>per.</i>	cal.
— <i>ucranica L.</i>		<i>per.</i>	s. d.	— <i>Basilicum L.</i>	<i>ann.</i>	s. d.
<i>Nerium flavescens Spin.</i>		<i>lign.</i>	frig.	— <i>anisatum Hort.</i>	<i>ann.</i>	s. d.
— <i>odorum Ait.</i>		<i>lign.</i>	frig.	— <i>bullatum Lam.</i>	<i>ann.</i>	s. d.
— <i>splendens Hort.</i>		<i>lign.</i>	frig.	— <i>laciniatum Hort.</i>	<i>ann.</i>	s. d.
— <i>Oleander L.</i>		<i>lign.</i>	s. d.	— <i>pilosum W.</i>	<i>ann.</i>	s. d.
— <i>album Desf.</i>		<i>lign.</i>	frig.	— <i>purpureum Hort.</i>	<i>ann.</i>	s. d.
— <i>tinctorium Rottl.</i>		<i>lign.</i>	tep.	— <i>carnosum Lk.</i>	<i>per.</i>	cal.
<i>Nesaea triflora Humb.</i>		<i>per.</i>	tep.	— <i>citriodorum Vis.</i>	<i>bien.</i>	s. d.
— <i>verticillata Humb.</i>		<i>per.</i>	s. d.	— <i>gratissimum L.</i>	<i>lign.</i>	s. d.
<i>Neslia paniculata Desv.</i>		<i>ann.</i>	sp.	— <i>viride W.</i>	<i>ann.</i>	s. d.
<i>Nicandra anomala Lk.</i>		<i>per.</i>	s. d.	<i>Octadenia lybica R. Br.</i>	<i>ann.</i>	s. d.
— <i>physalodes Gaertn.</i>		<i>ann.</i>	s. d.	<i>Oedera prolifera L.</i>	<i>lign.</i>	frig.
<i>Nicotiana alata Lk. et O.</i>		<i>per.</i>	frig.	<i>Oenanthe apiifolia Brot.</i>	<i>per.</i>	s. d.
— <i>angustifolia R. et P.</i>		<i>ann.</i>	s. d.	— <i>crocata L.</i>	<i>per.</i>	s. d.
— <i>auriculata Agdh.</i>		<i>per.</i>	frig.	— <i>fistulosa L.</i>	<i>per.</i>	sp.
				— <i>Jordani Tenor.</i>	<i>per.</i>	s. d.

Oenanthe Lachenalii Gmel.	per.	s. d.	Onobrychis conferta Desv.	per.	s. d.	
— Phellandrium Lam.	bien.	sp.	— Crista galli Lam.	ann.	s. d.	
— pimpinelloides L.	per.	sp.	— gracilis Bess.	per.	s. d.	
— silatifolia Bieb.	per.	s. d.	— incurvata DC.	per.	s. d.	
Oenothera acaulis Cav.	bien.	s. d.	— Michauxii DC.	per.	s. d.	
— biennis L.	bien.	sp.	— Pallasii Bieb.	per.	s. d.	
— chilensis Desf.	ann.	s. d.	— petraea Desv.	per.	s. d.	
— chrysantha Michx.	per.	s. d.	— procumbens Fisch.	per.	s. d.	
— concinna Don	ann.	s. d.	— radiata Bieb.	per.	s. d.	
— Cominiana Lehm.	ann.	s. d.	— sativa Lam.	per.	sp.	
— corymbosa Lam.	s. d.		— tatarica Fisch.	per.	s. d.	
— cruciata Nutt.	bien.	s. d.	— saxatilis Lam.	per.	s. d.	
— cuspidata Steud.	bien.	s. d.	Ononis alopecuroides L.	ann.	s. d.	
— decumbens Dougl.	ann.	s. d.	— arachnoidea Lap.	per.	s. d.	
— densiflora Lindl.	ann.	s. d.	— Bernhardii Vis.	lign.	s. d.	
— Drummondii Hook.	per.	s. d.	— breviflora DC.	ann.	s. d.	
— elata Humb.	per.	s. d.	— Cherleri L.	per.	s. d.	
— erosa Lehm.	ann.	s. d.	— Columnae All.	per.	s. d.	
— Fraseri Pursh.	per.	s. d.	— fruticosa L.	lign.	s. d.	
— fruticosa L.	lign.	s. d.	— hircina Jacq.	lign.	s. d.	
— gauroides Horn.	bien.	s. d.	— minutissima L.	per.	sp.	
— hybrida Michx.	per.	s. d.	— Natrix L.	per.	sp.	
— lepidia Steud.	ann.	s. d.	— pinguis L.	per.	sp.	
— Lindleyana Dougl.	ann.	s. d.	— pendula Desf.	ann.	s. d.	
— nervosa Horn.	per.	s. d.	— pubescens L.	ann.	s. d.	
— nocturna Jacq.	ann.	s. d.	— ramosissima Desf.	per.	s. d.	
— odorata Jacq.	per.	s. d.	— repens L.	lign.	s. d.	
— purpurea Curt.	ann.	s. d.	— sicula Gusson.	ann.	s. d.	
— rhizocarpa Spr.	per.	s. d.	— spinosa L.	lign.	sp.	
— Romanzoffii Ledeb.	ann.	s. d.	Onopordon Acanthium L.	per.	sp.	
— rosea Ait.	ann.	s. d.	— graecum L.	ann.	s. d.	
— rubicunda Steud.	ann.	s. d.	— heteracanthum Mey.	bien.	s. d.	
— Simsiana Ser.	bien.	tep.	— horridum Vivian.	bien.	s. d.	
— spectabilis Horn.	bien.	tep.	— macracanthum			
— speciosa Nutt.	per.	s. d.		Schousb.	ann.	s. d.
— stricta Ledeb.	ann.	s. d.	Onosma stellulata W. et K.	per.	sp.	
— suaveolens Desf.	bien.	s. d.	— Visianii Clement.	per.	s. d.	
— tetraptera Cav.	per.	tep.	Ophiopogon japonicus Ker.	per.	s. d.	
— triloba Nutt.	ann.	s. d.	— spicatus Ker.	per.	s. d.	
Olea americana L.	lign.	frig.	Ophrys apifera Huds.	per.	sp.	
— capensis L.	lign.	frig.	— arachnites Hoffm.	per.	sp.	
— excelsa Ait.	lign.	frig.	— myodes Jacq.	per.	sp.	
— fragrans Thunb.	lign.	frig.	Opopanax Chironium Koch.	per.	s. d.	
— Oleaster Lk.	lign.	s. d.	Oporinia autumnalis Don	per.	s. d.	
— sativa L.	lign.	s. d.	Opuntia albicans Salm.	lign.	tep.	
— undulata Jacq.	lign.	frig.	— amyclaea Tenor.	lign.	tep.	
Omalothea supina Cass.	per.	s. d.	— andicola H. Angl.	lign.	tep.	
Omphalodes linifolia Mneh.	ann.	s. d.	— aurantiaca Gill.	lign.	tep.	
— verna Moench.	per.	s. d.	— brasilensis Haw.	lign.	tep.	
Oncidium bifolium Sims.	per.	cal.	— spinosior Salm.			
— Papilio Lindl.	per.	cal.	— candelabriformis H.			
Oncoba spinosa Forsh.	lign.	cal.		Mon.	lign.	tep.
Onobroma flavescens Spr.	ann.	s. d.	— catacantha H. Berol.	lign.	tep.	
Onobrychis alba Desv.	per.	s. d.	— clavarioides H. Ber.	lign.	tep.	
— Caput galli Lam.	per.	s. d.	— corrugata Gill.	lign.	tep.	
— carpathica DC.	per.	s. d.	— crassa Haw.	lign.	tep.	

<i>Opuntia curassavica</i>	Mill.	lign.	tep.	<i>Opuntia vulgaris</i>	Mill.	lign.	s. d.
— cylindrica	DC.	lign.	tep.	— nana	DC.	lign.	sp.
— decipiens	DC.	lign.	tep.	<i>Orchis coriophora</i>	L.	per.	sp.
— decumana	Haw.	lign.	tep.	— fragrans	Pollin.	per.	sp.
— decumbens	Salm.	lign.	tep.	— fusca	Jacq.	per.	sp.
— dejecta	Salm.	lign.	tep.	— galeata	Lam.	per.	sp.
— Dillenii	DC.	lign.	tep.	— latifolia	L.	per.	sp.
— elata	H. Berol.	lign.	tep.	— laxiflora	Lam.	per.	sp.
— exuviata	DC.	lign.	tep.	— palustris	Jacq.	per.	sp.
— ferox	Haw.	lign.	tep.	— maculata	L.	per.	sp.
— Ficus indica	Mill.	lign.	tep.	— mascula	L.	per.	sp.
— foliosa	Salm.	lign.	tep.	— militaris	L.	per.	sp.
— fragilis	Haw.	lign.	tep.	— Morio	L.	per.	sp.
— fulvispina	Salm.	lign.	tep.	— papilionacea	L.	per.	sp.
— glaucescens	H. Ber.	lign.	tep.	— pyramidalis	L.	per.	sp.
— glaucophylla	Wendl.	lign.	tep.	— Simia	Lam.	per.	sp.
— glomerata	Haw.	lign.	tep.	— variegata	Jacq.	per.	sp.
— horrida	Salm.	lign.	tep.	<i>Oreodaphne foetens</i>	Nees	lign.	frig.
— imbricata	DC.	lign.	tep.	<i>Oreomyrrhis eriopoda</i>	Endl.	per.	frig.
— intermedia	Salm.	lign.	tep.	<i>Origanum Dictamnus</i>	L.	lign.	frig.
— Kleiniae	DC.	lign.	tep.	— fortuitum	Savi	per.	s. d.
— lanceolata	Haw.	lign.	tep.	— heracleoticum	L.	per.	s. d.
— leptocaulis	DC.	lign.	tep.	— vulgare	L.	per.	sp.
— leucantha	Lk.	lign.	tep.	— humile	Poir.	per.	s. d.
— leucosticta	Wendl.	lign.	tep.	— virens	Hoffmsg.	per.	s. d.
— leucotricha	DC.	lign.	tep.	<i>Ornithogalum arabicum</i>	L.	per.	frig.
— megacantha	Salm.	lign.	tep.	— caudatum	Ait.	per.	frig.
— microdasys	Lehm.	lign.	tep.	— fol. varieg.	Hort.	per.	frig.
— pulvinata	DC.	lign.	tep.	— coarctatum	Jacq.	per.	frig.
— missouriensis	DC.	lign.	tep.	— comosum	L.	per.	s. d.
— minor	Salm.	lign.	tep.	— exscapum	Tenor.	per.	s. d.
— monacantha	Haw.	lign.	tep.	— gramineum	Sims	per.	frig.
— nigricans	Haw.	lign.	tep.	— Gussoni	Tenor.	per.	s. d.
— oblongata	Wendl.	lign.	tep.	— lacteum	Jacq.	per.	frig.
— orbiculata	Salm.	lign.	tep.	— latifolium	L.	per.	frig.
— Poëppigii	Otto	lign.	tep.	— longebracteatum	Jacq.	per.	frig.
— polyantha	Haw.	lign.	tep.	— narbonense	L.	per.	sp.
— pseudo-Tuna	Salm.	lign.	tep.	— pyrenaicum	L.	per.	sp.
— puberula	H. Vind.	lign.	tep.	— Rudolphi	Jacq.	per.	frig.
— pubescens	Wendl.	lign.	tep.	— scilloides	Jacq.	per.	frig.
— pusilla	Salm.	lign.	tep.	— thyrsoides	Jacq.	per.	frig.
— ramulifera	Salm.	lign.	tep.	— umbellatum	L.	per.	sp.
— rosea	DC.	lign.	tep.	<i>Ornithopus compressus</i>	L.	ann.	s. d.
— rubescens	Salm.	lign.	tep.	<i>Orobanche cruenta</i>	Bertol.	per.	sp.
— Salmiana	Parment.	lign.	tep.	— elatior	Sutton	per.	sp.
— sericea	G. Don	lign.	tep.	— Galii	Duby	per.	sp.
— spinosissima	Mill.	lign.	tep.	— major	L.	per.	sp.
— spinulifera	Salm.	lign.	tep.	— minor	Sutton	per.	sp.
— Stapelia	DC.	lign.	tep.	— ramosa	L.	per.	sp.
— stricta	Haw.	lign.	tep.	<i>Orobis atropurpureus</i>	Desf.	per.	s. d.
— sulphurea	G. Don	lign.	tep.	— canescens	L. fil.	per.	s. d.
— tomentosa	Salm.	lign.	tep.	— Clusii	Spr.	per.	s. d.
— triacantha	DC.	lign.	tep.	— Fischeri	Sweet	per.	s. d.
— tuberculata	Haw.	lign.	tep.	— flaccidus	Kit.	per.	s. d.
— Tuna	Mill.	lign.	tep.	— gracilis	Gaud.	per.	s. d.
— tunicata	H. Berol.	lign.	tep.	— lathyroides	L.	per.	s. d.

<i>Orobolus luteus</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Oxalis variabilis</i>	<i>Jacq.</i>	per.	frig.
— <i>niger</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>vegeta</i>	<i>Hort.</i>	per.	frig.
— <i>ochroleucus</i>	<i>W. et K.</i>	per.	s. d.	— <i>versicolor</i>	<i>L.</i>	per.	frig.
— <i>saxatilis</i>	<i>Vent.</i>	ann.	s. d.	<i>Oxybaphus chilensis</i>	<i>Steud.</i>	per.	frig.
— <i>stenophyllus</i>	<i>Steud.</i>	per.	s. d.	— <i>glabrifolius</i>	<i>Vahl</i>	per.	frig.
— <i>tuberosus</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>viscosus</i>	<i>Herit.</i>	per.	frig.
— <i>vernus</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	<i>Oxylobium cordifolium</i>	<i>Andr.</i>	lign.	frig.
<i>Ortega dichotoma</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>ellipticum</i>	<i>R. Br.</i>	lign.	frig.
<i>Oryza sativa</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	<i>Oxytropis ambigua</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.
— <i>mutica</i>	<i>Lour.</i>	ann.	s. d.	— <i>ammophila</i>	<i>Turez.</i>	per.	s. d.
<i>Osmunda regalis</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>argyrea</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.
<i>Osteospermum glandulosum</i>	<i>DC.</i>	per.	tep.	— <i>baicalia</i>	<i>Pers.</i>	per.	s. d.
— <i>moniliferum</i>	<i>L.</i>	per.	frig.	— <i>campestris</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.
<i>Ostrya vulgaris</i>	<i>W.</i>	lign.	sp.	— <i>diffusa</i>	<i>Ledeb.</i>	per.	s. d.
<i>Othonna cheirifolia</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>montana</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.
— <i>pinnatifida</i>	<i>Thunb.</i>	ann.	s. d.	— <i>sulphurea</i>	<i>Ledeb.</i>	per.	s. d.
— <i>trifurcata</i>	<i>Less.</i>	lign.	frig.	<i>Oxyura chrysanthemoides</i>	<i>DC.</i>	ann.	s. d.
<i>Oxytropis sambuensis</i>	<i>Nees</i>	lign.	frig.	—			
<i>Oxalis Acetosella</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	<i>Pachypleurum cachroides</i>	<i>Ledeb.</i>	per.	s. d.
— <i>asinina</i>	<i>Jacq.</i>	per.	frig.	—			
— <i>bifida</i>	<i>Thunb.</i>	per.	frig.	<i>Paederia foetida</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.
— <i>Bowieana</i>	<i>Lodd.</i>	per.	frig.	<i>Paeonia albiflora</i>	<i>Pall.</i>	per.	s. d.
— <i>caprina</i>	<i>Thunb.</i>	per.	frig.	— <i>fragrans</i>	<i>Salisb.</i>	per.	s. d.
— <i>carnosa</i>	<i>Molin.</i>	per.	frig.	— <i>rubescens</i>	<i>Andrs.</i>	per.	s. d.
— <i>corniculata</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>arietina</i>	<i>Andrs.</i>	per.	s. d.
— <i>crassicaulis</i>	<i>Zuccar.</i>	lign.	frig.	— <i>caroliniana</i>	<i>H. Gryph.</i>	per.	s. d.
— <i>crenata</i>	<i>Hort.</i>	per.	tep.	— <i>commutata</i>	<i>Wender.</i>	per.	s. d.
— <i>cruentata</i>	<i>Jacq.</i>	per.	frig.	— <i>rosea</i>	<i>Hort.</i>	per.	s. d.
— <i>dentata</i>	<i>Jacq.</i>	per.	frig.	— <i>corallina</i>	<i>Retz.</i>	per.	s. d.
— <i>Deppei</i>	<i>Lodd.</i>	per.	tep.	— <i>daurica</i>	<i>Andr.</i>	per.	s. d.
— <i>fabaeifolia</i>	<i>Jacq.</i>	per.	frig.	— <i>decora</i>	<i>Andrs.</i>	per.	s. d.
— <i>lutea</i>	<i>Hort.</i>	per.	frig.	— <i>praecox</i>	<i>Andrs.</i>	per.	s. d.
— <i>flabellifolia</i>	<i>Jacq.</i>	per.	frig.	— <i>erecta</i>	<i>Sabin.</i>	per.	s. d.
— <i>flava</i>	<i>L.</i>	per.	frig.	— <i>humilis</i>	<i>Retz.</i>	per.	s. d.
— <i>floribunda</i>	<i>Lehm.</i>	per.	tep.	— <i>latifolia</i>	<i>Sabin.</i>	per.	s. d.
— <i>fuscata</i>	<i>Jacq.</i>	per.	frig.	— <i>lejocarpa</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.
— <i>hirta</i>	<i>L.</i>	per.	frig.	— <i>lanceolata</i>	<i>Salm.</i>	per.	s. d.
— <i>incarnata</i>	<i>L.</i>	per.	frig.	— <i>lobata</i>	<i>Desf.</i>	per.	s. d.
— <i>lateriflora</i>	<i>Jacq.</i>	per.	frig.	— <i>microcarpa</i>	<i>Salm.</i>	per.	s. d.
— <i>laxula</i>	<i>Jacq.</i>	per.	frig.	— <i>mollis</i>	<i>Andrs.</i>	per.	s. d.
— <i>leporina</i>	<i>Jacq.</i>	per.	frig.	— <i>Moutan</i>	<i>Sims.</i>	lign.	s. d.
— <i>macrorrhiza</i>	<i>Gill.</i>	per.	frig.	— <i>odorata</i>	<i>Hort.</i>	lign.	s. d.
— <i>megalorrhiza</i>	<i>Jacq.</i>	per.	frig.	— <i>papaveracea</i>	<i>Andr.</i>	lign.	s. d.
— <i>multiflora</i>	<i>Jacq.</i>	per.	frig.	— <i>officinalis</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>pentaphylla</i>	<i>Sims.</i>	per.	frig.	— <i>rosea</i>	<i>Hort.</i>	per.	s. d.
— <i>Piottoe</i>	<i>Colla.</i>	per.	frig.	— <i>rubra</i>	<i>Hort.</i>	per.	s. d.
— <i>polyphylla</i>	<i>Jacq.</i>	per.	frig.	— <i>paradoxa</i>	<i>Andrs.</i>	per.	s. d.
— <i>punctata</i>	<i>L.</i>	per.	frig.	— <i>Candollei</i>	<i>An-</i>	per.	s. d.
— <i>purpurea</i>	<i>Jacq.</i>	per.	frig.	— <i>ders.</i>		per.	s. d.
— <i>reptatrix</i>	<i>Jacq.</i>	per.	frig.	— <i>peregrina</i>	<i>Mill.</i>	per.	s. d.
— <i>rosacea</i>	<i>Jacq.</i>	per.	frig.	— <i>Grewillei</i>	<i>Andrs.</i>	per.	s. d.
— <i>rubella</i>	<i>Jacq.</i>	per.	frig.	— <i>pubens</i>	<i>Sims.</i>	per.	s. d.
— <i>stricta</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>Russi</i>	<i>Bivon.</i>	per.	s. d.
— <i>tenuifolia</i>	<i>Jacq.</i>	per.	frig.	— <i>splendens</i>	<i>Sabin.</i>	per.	s. d.
— <i>tetraphylla</i>	<i>Cav.</i>	per.	frig.				

<i>Paeonia tenuifolia</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Parthenium Hysterophorus</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— — hybrida	<i>Pall.</i>	per.	s. d.	— integrifolium	<i>L.</i>	per.	s. d.
<i>Palafoxia linearis</i>	<i>Lagasc.</i>	lign.	tep.	<i>Pascalina glauca</i>	<i>Orteg.</i>	per.	s. d.
<i>Paliurus australis</i>	<i>Gaertn.</i>	lign.	sp.	<i>Paspalum dilatatum</i>	<i>Poir.</i>	ann.	s. d.
<i>Pallenis spinosa</i>	<i>Cass.</i>	ann.	s. d.	— elegans	<i>Flügg.</i>	per.	s. d.
<i>Panax aculeatum</i>	<i>Ait.</i>	lign.	frig.	— stoloniferum	<i>Bosc.</i>	per.	tep.
— trifolium	<i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Passerina annua</i>	<i>Wickstr.</i>	ann.	sp.
<i>Pancratium amoenum</i>	<i>Sal.</i>	per.	cal.	— filiformis	<i>L.</i>	lign.	frig.
— calathiforme	<i>Red.</i>	per.	cal.	— hirta	<i>Hort.</i>	lign.	frig.
— caribaeum	<i>L.</i>	per.	cal.	— laxa	<i>L.</i>	lign.	frig.
— Chlidanthus	<i>Steud.</i>	per.	cal.	<i>Passiflora alata</i>	<i>Ait.</i>	lign.	cal.
— illyricum	<i>L.</i>	per.	s. d.	— alba	<i>Lk. et O.</i>	lign.	cal.
— littorale	<i>Jacq.</i>	per.	cal.	— angustifolia	<i>Sw.</i>	lign.	cal.
— maritimum	<i>L.</i>	per.	s. d.	— biflora	<i>Lam.</i>	lign.	cal.
— speciosum	<i>Salisb.</i>	per.	cal.	— capsularis	<i>L.</i>	lign.	cal.
— zeylanicum	<i>L.</i>	per.	cal.	— coerulea	<i>L.</i>	lign.	s. d.
<i>Pandanus utilis</i>	<i>Bory.</i>	lign.	cal.	— filamentosa	<i>Cav.</i>	lign.	cal.
<i>Pandera pilosa</i>	<i>F. et M.</i>	ann.	s. d.	— foetida	<i>Cav.</i>	per.	cal.
<i>Panicum bulbosum</i>	<i>Humb.</i>	per.	frig.	— glauca	<i>Humb.</i>	lign.	cal.
— capillare	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— gracilis	<i>Link.</i>	ann.	s. d.
— ciliare	<i>Retz.</i>	ann.	s. d.	— hirsuta	<i>L.</i>	lign.	cal.
— Crus galli	<i>L.</i>	ann.	sp.	— holosericea	<i>L.</i>	lign.	cal.
— jumentorum	<i>Pers.</i>	per.	tep.	— incarnata	<i>L.</i>	lign.	cal.
— miliaceum	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— kermesina	<i>Lk. et O.</i>	lign.	cal.
— pilosum	<i>Sw.</i>	per.	tep.	— laurifolia	<i>L.</i>	lign.	cal.
— plicatum	<i>Lam.</i>	per.	tep.	— littoralis	<i>Humb.</i>	lign.	cal.
— sanguinale	<i>L.</i>	ann.	sp.	— Loudonii	<i>Sweet.</i>	lign.	frig.
— undulatifolium	<i>Ar.</i>	ann.	sp.	— lutea	<i>L.</i>	per.	cal.
<i>Papaver alpinum</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— minima	<i>L.</i>	lign.	cal.
— Argemone	<i>L.</i>	per.	sp.	— mucronata	<i>Lam.</i>	lign.	cal.
— bracteatum	<i>Lindl.</i>	per.	s. d.	— pedata	<i>L.</i>	lign.	cal.
— caucasicum	<i>Bieb.</i>	ann.	s. d.	— perfoliata	<i>L.</i>	lign.	cal.
— croceum	<i>Ledeb.</i>	per.	s. d.	— pubescens	<i>Humb.</i>	lign.	cal.
— davuricum	<i>Fisch.</i>	ann.	s. d.	— quadrangularis	<i>L.</i>	lign.	cal.
— dubium	<i>L.</i>	ann.	sp.	— racemosa	<i>Brot.</i>	lign.	tep.
— floribundum	<i>Desf.</i>	ann.	s. d.	— rubra	<i>L.</i>	lign.	cal.
— hybridum	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— sanguinea	<i>Colla.</i>	lign.	frig.
— intermedium	<i>Beck.</i>	ann.	s. d.	— serratifolia	<i>L.</i>	lign.	cal.
— nudicaule	<i>L.</i>	per.	s. d.	— sexflora	<i>Juss.</i>	lign.	cal.
— obtusifolium	<i>Desf.</i>	ann.	s. d.	— suberosa	<i>L.</i>	lign.	cal.
— orientale	<i>L.</i>	per.	s. d.	— subpeltata	<i>Orteg.</i>	lign.	cal.
— persicum	<i>Lindl.</i>	ann.	s. d.	— tuberosa	<i>Jacq.</i>	lign.	cal.
— ramosissimum	<i>Brnh.</i>	ann.	s. d.	<i>Pastinaca divaricata</i>	<i>Desf.</i>	per.	s. d.
— Rhoeas	<i>L.</i>	ann.	sp.	— Fleischmanni	<i>Hldn.</i>	bien.	s. d.
— setigerum	<i>DC.</i>	ann.	s. d.	— latifolia	<i>DC.</i>	per.	s. d.
— somniferum	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— pimpinellifolia	<i>Bieb.</i>	bien.	s. d.
— tauricum	<i>Bieb.</i>	ann.	s. d.	— sativa	<i>L.</i>	bien.	sp.
<i>Pardanthus chinensis</i>	<i>Ker.</i>	per.	frig.	— — incisa	<i>Hort.</i>	bien.	s. d.
<i>Parietaria diffusa</i>	<i>M. et K.</i>	per.	sp.	<i>Patrinia rupestris</i>	<i>Juss.</i>	per.	s. d.
— filiformis	<i>Tenor.</i>	ann.	s. d.	— scabiosaeifolia	<i>Link.</i>	per.	s. d.
<i>Paris quadrifolia</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— sibirica	<i>Juss.</i>	per.	s. d.
<i>Paroassia palustris</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	<i>Paullinia carthagenensis</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	cal.
<i>Paronychia arabica</i>	<i>Juss.</i>	ann.	s. d.	<i>Pavonia Columella</i>	<i>Cav.</i>	lign.	cal.
— bonariensis	<i>DC.</i>	per.	frig.	— hastata	<i>Cav.</i>	lign.	cal.
— capitata	<i>Lam.</i>	per.	s. d.				

<i>Pavonia pentacarpos</i>	<i>Poir.</i>	lign.	s. d.	<i>Pelargonium flavum</i>	<i>Ait.</i>	per.	tep.
— <i>praemorsa</i>	<i>W.</i>	lign.	cal.	— <i>Flora</i>	<i>Hort.</i>	lign.	frig.
— <i>spinifex</i>	<i>Cav.</i>	lign.	cal.	— <i>Fothergillii</i>	<i>Sweet</i>	lign.	frig.
<i>Pedicularis Barrelieri</i>	<i>Rchb.</i>	per.	s. d.	— <i>fragrans</i>	<i>W.</i>	lign.	frig.
— <i>verticillata</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>fulgens</i>	<i>Sweet</i>	lign.	frig.
<i>Pedilanthus carinatus</i>	<i>Spr.</i>	lign.	cal.	— <i>geniculatum</i>	<i>Hort.</i>	lign.	frig.
— <i>tithymaloides</i>	<i>Poit.</i>	lign.	cal.	— <i>gibbosum</i>	<i>W.</i>	lign.	frig.
<i>Peganum Harmala</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>glutinosum</i>	<i>Ait.</i>	lign.	frig.
<i>Pelargonium acerifolium</i>				— <i>gloriosum</i>	<i>Hoffmsg.</i>	lign.	frig.
— <i>Herit.</i>		lign.	frig.	— <i>Goffredi</i>	<i>Hort.</i>	lign.	frig.
— <i>acetosum</i>	<i>Ait.</i>	lign.	frig.	— <i>Gowerii</i>	<i>Hort.</i>	lign.	frig.
— <i>adulterinum</i>	<i>Herit.</i>	lign.	frig.	— <i>grandiflorum</i>	<i>W.</i>	lign.	frig.
— <i>chermesinum</i>	<i>Hrt.</i>	lign.	frig.	— <i>gratum</i>	<i>W.</i>	lign.	frig.
— <i>amoenum</i>	<i>Sw.</i>	per.	frig.	— <i>graveolens</i>	<i>Ait.</i>	lign.	frig.
— <i>amplissimum</i>	<i>W.</i>	lign.	frig.	— <i>hermannifolium</i>	<i>Jcq.</i>	lign.	frig.
— <i>anceps</i>	<i>Ait.</i>	per.	frig.	— <i>helenium</i>	<i>Hort.</i>	lign.	frig.
— <i>angulosum</i>	<i>Ait.</i>	lign.	frig.	— <i>Heritieri</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	frig.
— <i>Antonianum</i>	<i>Hort.</i>	lign.	frig.	— <i>hibiscinum</i>	<i>Klier</i>	lign.	frig.
— <i>ardens</i>	<i>Sweet</i>	lign.	frig.	— <i>holosericeum</i>	<i>Sweet</i>	lign.	frig.
— <i>articulatum</i>	<i>W.</i>	per.	frig.	— <i>humifusum</i>	<i>W.</i>	ann.	s. d.
— <i>augustum</i>	<i>Link.</i>	lign.	frig.	— <i>Jacquinianum</i>	<i>Hort.</i>	lign.	frig.
— <i>coccineum</i>	<i>Hort.</i>	lign.	frig.	— <i>jatrophaefolium</i>	<i>DC.</i>	lign.	frig.
— <i>australe</i>	<i>Jacq.</i>	per.	frig.	— <i>igneum</i>	<i>Hort.</i>	lign.	frig.
— <i>Balbisianum</i>	<i>Spin.</i>	lign.	frig.	— <i>inquians</i>	<i>Ait.</i>	lign.	frig.
— <i>balsameum</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	frig.	— <i>involutatum</i>	<i>Sweet</i>	lign.	frig.
— <i>Baumannianum</i>	<i>Hrt.</i>	lign.	frig.	— <i>lacerum</i>	<i>Jacq.</i>	ann.	s. d.
— <i>Bentinkianum</i>	<i>Hort.</i>	lign.	frig.	— <i>macranthum</i>	<i>Sweet</i>	lign.	frig.
— <i>betulinum</i>	<i>Ait.</i>	lign.	frig.	— <i>roseum</i>	<i>Hort.</i>	lign.	frig.
— <i>bicolor</i>	<i>Ait.</i>	lign.	frig.	— <i>Meleagris</i>	<i>Hort.</i>	lign.	frig.
— <i>Bristolianum</i>	<i>Hort.</i>	lign.	frig.	— <i>Metternickianum</i>			
— <i>Buffonianum</i>	<i>Hort.</i>	lign.	frig.	— <i>mirabile</i>	<i>Hort.</i>	lign.	frig.
— <i>Burdini</i>	<i>Colla</i>	lign.	frig.	— <i>multicaule</i>	<i>Jacq.</i>	bien.	frig.
— <i>Candolleianum</i>	<i>Hort.</i>	lign.	frig.	— <i>Nairnii</i>	<i>Sweet</i>	lign.	frig.
— <i>capitatum</i>	<i>Ait.</i>	lign.	frig.	— <i>nervosum</i>	<i>Sweet</i>	lign.	frig.
— <i>carolinianum</i>	<i>Hort.</i>	lign.	frig.	— <i>odoratissimum</i>	<i>Ait.</i>	lign.	frig.
— <i>citriodorum</i>	<i>Hort.</i>	lign.	frig.	— <i>palmatum</i>	<i>H. Paris.</i>	lign.	frig.
— <i>Colvillii</i>	<i>Sweet</i>	lign.	frig.	— <i>peltatum</i>	<i>Ait.</i>	lign.	frig.
— <i>conduplicatum</i>	<i>W.</i>	lign.	frig.	— <i>variegatum</i>	<i>Hort.</i>	lign.	frig.
— <i>cordatum</i>	<i>Ait.</i>	lign.	frig.	— <i>pictum</i>	<i>Pers.</i>	lign.	frig.
— <i>crispum</i>	<i>Herit.</i>	lign.	frig.	— <i>pinnatifidum</i>	<i>Hort.</i>	lign.	frig.
— <i>cucullatum</i>	<i>Ait.</i>	lign.	frig.	— <i>polyphyllum</i>	<i>Hort.</i>	lign.	frig.
— <i>Daveyanum</i>	<i>Sweet</i>	lign.	frig.	— <i>pumilum</i>	<i>W.</i>	lign.	frig.
— <i>delphinifolium</i>	<i>W.</i>	lign.	frig.	— <i>variegatum</i>	<i>Hort.</i>	lign.	frig.
— <i>dentatum</i>	<i>Andr.</i>	lign.	frig.	— <i>quercifolium</i>	<i>Ait.</i>	lign.	frig.
— <i>diadematum</i>	<i>Hort.</i>	lign.	frig.	— <i>quinquevulnerum</i>	<i>W.</i>	lign.	frig.
— <i>divergens</i>	<i>Sweet</i>	lign.	frig.	— <i>radula</i>	<i>Ait.</i>	lign.	frig.
— <i>Dobraeanum</i>	<i>Sweet</i>	lign.	frig.	— <i>roseum</i>	<i>W.</i>	lign.	frig.
— <i>dondiaefolium</i>	<i>Link.</i>	lign.	frig.	— <i>reniforme</i>	<i>Curt.</i>	lign.	frig.
— <i>Dumontianum</i>	<i>Hort.</i>	lign.	frig.	— <i>rhodopetalum</i>	<i>Sweet</i>	lign.	frig.
— <i>purpureum</i>	<i>Hort.</i>	lign.	frig.	— <i>sanguineum</i>	<i>Wendl.</i>	lign.	frig.
— <i>echinatum</i>	<i>Curt.</i>	lign.	frig.	— <i>saniculaefolium</i>	<i>W.</i>	lign.	frig.
— <i>rubrum</i>	<i>H. Angl.</i>	lign.	frig.	— <i>saturatum</i>	<i>Sweet</i>	lign.	frig.
— <i>elatum</i>	<i>Hort.</i>	lign.	frig.	— <i>scabrum</i>	<i>Ait.</i>	lign.	frig.
— <i>eximium</i>	<i>Sweet</i>	lign.	frig.	— <i>scandens</i>	<i>Ehrh.</i>	lign.	frig.
— <i>exstipulatum</i>	<i>Ait.</i>	lign.	frig.	— <i>scutatum</i>	<i>Sweet</i>	lign.	frig.
— <i>flammeum</i>	<i>Colvil.</i>	lign.	frig.				

<i>Pelargonium Smithii</i> Sweet	lign.	frig.	<i>Pereskia Bleo</i> DC.	lign.	cal.
— <i>grandiflorum</i> Hrt	lign.	frig.	— <i>grandifolia</i> Haw.	lign.	cal.
— <i>stenophyllum</i> Hort.	lign.	frig.	— <i>magnoliaefolia</i> Hort.	lign.	cal.
— <i>tenuifolium</i> Herit.	lign.	frig.	— <i>Piutache</i> Karw.	lign.	cal.
— <i>tetragonum</i> Herit.	lign.	frig.	<i>Perilla ocimoides</i> L.	ann.	s. d.
— <i>variegatum</i> Hort.	lign.	frig.	<i>Periploca angustifolia</i> Labil.	lign.	frig.
— <i>tomentosum</i> Jacq.	lign.	frig.	— <i>graeca</i> L.	lign.	s. d.
— <i>trilobatum</i> Schrad.	lign.	frig.	<i>Pernetia mucronata</i> Gaud.	lign.	frig.
— <i>tripartitum</i> W.	lign.	frig.	<i>Persea carolinensis</i> Nees	lign.	frig.
— <i>triste</i> Ait.	per.	frig.	— <i>indica</i> Spr.	lign.	frig.
— <i>velutinum</i> Herit.	lign.	frig.	<i>Petalostemum candidum</i>		
— <i>vitifolium</i> Ait.	lign.	frig.	— <i>Michx</i>	per.	s. d.
— <i>zonale</i> W.	lign.	frig.	<i>Petasites albus</i> Gaertn.	per.	s. d.
— <i>margatum</i> Lk.	lign.	frig.	— <i>spurius</i> Reichb.	per.	s. d.
— <i>roseum</i> Hort.	lign.	frig.	— <i>vulgaris</i> Desf.	per.	sp.
<i>Peltaria alliacea</i> L.	per.	s. d.	<i>Petiveria alliacea</i> L.	lign.	tep.
<i>Penaea mucronata</i> L.	lign.	frig.	<i>Petrocallis pyrenaica</i> R. Br.	lign.	s. d.
<i>Pennisetum alopecuroides</i>			<i>Petroselinum peregrinum</i>		
— <i>Stend.</i>	ann.	s. d.	— <i>Lagasc.</i>	bien.	s. d.
— <i>cenchroides</i> Rich.	ann.	s. d.	— <i>sativum</i> Hoffm.	bien.	s. d.
— <i>typhoides</i> Rich.	ann.	s. d.	— <i>selinoides</i> DC.	per.	s. d.
<i>Pentapetes phoenicea</i> L.	ann.	s. d.	<i>Petunia nyctaginiflora</i> Juss.	per.	frig.
<i>Pentastemum acuminatum</i>			— <i>violacea</i> Hook.	per.	frig.
— <i>Dougl.</i>	per.	s. d.	— <i>mirabilis</i> Hort.	per.	frig.
— <i>atropurpureum</i> Don.	per.	s. d.	<i>Peucedanum alsaticum</i> L.	per.	sp.
— <i>campanulatum</i> W.	per.	s. d.	— <i>venetum</i> Koch	per.	sp.
— <i>Cobaea</i> Nutt.	per.	s. d.	— <i>Besserianum</i> DC.	per.	s. d.
— <i>Colvillii</i> H. Dresd.	per.	s. d.	— <i>Cervaria</i> Lapeyr.	per.	sp.
— <i>diffusum</i> Dougl.	per.	s. d.	— <i>condensatum</i> Turcz.	per.	s. d.
— <i>Digitalis</i> Nutt.	per.	s. d.	— <i>officinale</i> L.	per.	s. d.
— <i>gentianoides</i> Poir.	per.	s. d.	— <i>Oreoselinum</i> Cuss.	per.	sp.
— <i>hirsutum</i> W.	per.	s. d.	— <i>Petteri</i> Vis.	per.	sp.
— <i>latifolium</i> Hort.	per.	s. d.	— <i>rablose</i> Koch	per.	s. d.
— <i>laevigatum</i> Ait.	per.	s. d.	— <i>terebinthaceum</i> Fisch	per.	s. d.
— <i>ovatum</i> Hook.	per.	s. d.	— <i>vaginatum</i> Ledeb.	per.	s. d.
— <i>pulchellum</i> Lindl.	per.	s. d.	— <i>verticillare</i> Koch	per.	s. d.
— <i>Richardsonii</i> Dougl.	per.	s. d.	<i>Peumus Boldus</i> Molin.	lign.	tep.
— <i>roseum</i> G. Don	per.	s. d.	<i>Phaca lapponica</i> Wahlb.	per.	s. d.
— <i>striatiflorum</i> H. Gry.	per.	s. d.	<i>Phacelia bipinnatifida</i> Michx.	ann.	s. d.
— <i>triphyllum</i> Dougl.	per.	s. d.	— <i>circinata</i> Jacq.	ann.	s. d.
— <i>venustum</i> Dougl.	per.	s. d.	— <i>congesta</i> Hook.	ann.	s. d.
<i>Peperomia blanda</i> Humb.	per.	cal.	— <i>simbrata</i> Michx.	ann.	s. d.
— <i>magnoliaefolia</i> Dietr.	lign.	cal.	— <i>peruviana</i> Spr.	per.	s. d.
— <i>obtusifolia</i> Dietr.	per.	cal.	— <i>tanacetifolia</i> Benth.	ann.	s. d.
— <i>clusiaefolia</i> Loud.	per.	cal.	— <i>tripinnatifida</i> Benth.	ann.	s. d.
— <i>pellucida</i> Humb.	ann.	cal.	<i>Phacocapnos Gracca</i> Bernh.	ann.	s. d.
— <i>pereskiaefolia</i> Humb.	per.	cal.	<i>Phaenocoma prolifera</i> Don	lign.	frig.
— <i>polystachya</i> Hook.	per.	cal.	<i>Phaenopus vimineus</i> Rehb.	bien.	s. d.
— <i>pulchella</i> Dietr.	per.	cal.	<i>Phagnalon rupestre</i> DC.	lign.	s. d.
— <i>reniformis</i> Dietr.	per.	cal.	— <i>saxatile</i> Cass.	lign.	s. d.
— <i>tomentosa</i> Dietr.	per.	cal.	<i>Phalacrologia Beyrichii</i> F.		
— <i>umbellata</i> Humb.	lign.	cal.	— <i>et M.</i>	bien.	s. d.
— <i>verticillata</i> Dietr.	per.	cal.	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	per.	sp.
<i>Pereskia aculeata</i> Mill.	lign.	cal.	— <i>— picta</i> Hort.	per.	s. d.
— <i>— acardia</i> Parment.	lign.	cal.	— <i>canariensis</i> L.	ann.	s. d.
— <i>— lanceolata</i> Pfeiff.	lign.	cal.	— <i>coerulescens</i> Desf.	per.	s. d.

<i>Phalaris minor</i>	<i>Retz</i>	ann.	s. d.	<i>Phleum asperum</i>	<i>Vill.</i>	ann.	s. d.
— <i>nigricans</i>	<i>Hort.</i>	per.	s. d.	— <i>Boehmeri</i>	<i>Wibel</i>	per.	sp.
— <i>nodosa</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>cuspidatum</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.
— <i>paradoxa</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>Michellii</i>	<i>All.</i>	per.	s. d.
<i>Phaseolus alatus</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>pratense</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>amoenus</i>	<i>Forst.</i>	ann.	s. d.	— <i>Bertolonii</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.
— <i>abyssinicus</i>	<i>Savi</i>	ann.	s. d.	— <i>nodosum</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>aureus</i>	<i>Zuccagn.</i>	ann.	s. d.	— <i>stoloniferum</i>	<i>Host</i>	per.	s. d.
— <i>bicolor</i>	<i>Zeyh.</i>	ann.	s. d.	— <i>tenue</i>	<i>Schrad.</i>	ann.	s. d.
— <i>Caracalla</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.	<i>Phloiodicarpus dahuricus</i>	<i>Turtzsch.</i>	per.	s. d.
— <i>chrysanthus</i>	<i>Savi</i>	ann.	s. d.	<i>Phlomis agraria</i>	<i>Ledeb.</i>	per.	s. d.
— <i>citrinus</i>	<i>Savi</i>	ann.	s. d.	— <i>alpina</i>	<i>Pall.</i>	per.	s. d.
— <i>eriospermus</i>	<i>Savi</i>	ann.	s. d.	— <i>angustifolia</i>	<i>DC.</i>	lign.	s. d.
— <i>gonospermus</i>	<i>Savi</i>	ann.	s. d.	— <i>ferruginea</i>	<i>Tenor.</i>	lign.	s. d.
— <i>pictus</i>	<i>Cav.</i>	ann.	s. d.	— <i>fruticosa</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>haematocarpus</i>	<i>Savi</i>	ann.	s. d.	— <i>angustifolia</i>	<i>Mill.</i>	lign.	s. d.
— <i>Hernandesii</i>	<i>Savi</i>	ann.	s. d.	— <i>herba venti</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>inamoenus</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>iberica</i>	<i>H. Paris.</i>	per.	s. d.
— <i>lepidospermus</i>	<i>Savi</i>	ann.	s. d.	— <i>lanata</i>	<i>W.</i>	lign.	s. d.
— <i>lathyroides</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>pungens</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.
— <i>limensis</i>	<i>Savi</i>	ann.	s. d.	— <i>Russeliana</i>	<i>Lagasc.</i>	per.	s. d.
— <i>lunatus</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>tuberosa</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>albus</i>	<i>Hort.</i>	ann.	s. d.	— <i>virens</i>	<i>DC.</i>	lign.	s. d.
— <i>helvolus</i>	<i>Hort.</i>	ann.	s. d.	<i>Phlox acuminata</i>	<i>Pursh</i>	per.	s. d.
— <i>niger</i>	<i>Hort.</i>	ann.	s. d.	— <i>carolina</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>rufus</i>	<i>Hort.</i>	ann.	s. d.	— <i>crassifolia</i>	<i>Lodd.</i>	per.	s. d.
— <i>marmoreus</i>	<i>Savi</i>	ann.	s. d.	— <i>divaricata</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>multiflorus</i>	<i>Lam.</i>	ann.	s. d.	— <i>Drummondii</i>	<i>Hook.</i>	per.	tep.
— <i>albiflorus</i>	<i>Lam.</i>	ann.	s. d.	— <i>glaberrima</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>coccineus</i>	<i>Hort.</i>	ann.	s. d.	— <i>maculata</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>fuliginosus</i>	<i>Hort.</i>	ann.	s. d.	— <i>paniculata</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>perennis</i>	<i>Walt.</i>	per.	s. d.	— <i>pilosa</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>Ricciardianus</i>	<i>Tenor.</i>	ann.	s. d.	— <i>reptans</i>	<i>Michx.</i>	per.	s. d.
— <i>saponaceus</i>	<i>Savi</i>	ann.	s. d.	— <i>Sickmanni</i>	<i>Lehm.</i>	per.	s. d.
— <i>semierectus</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>suaveolens</i>	<i>Ait.</i>	per.	s. d.
— <i>sphaericus</i>	<i>Savi</i>	ann.	s. d.	— <i>Weillii</i>	<i>Hort.</i>	per.	frig.
— <i>umbilicalis</i>	<i>Savi</i>	ann.	s. d.	— <i>— verna</i>	<i>Hort.</i>	per.	frig.
— <i>vexillatus</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	<i>Phoenix Berteri</i>	<i>H. Ripul.</i>	lign.	cal.
— <i>vulgaris</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>dactylifera</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.
— <i>nanus</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>leonensis</i>	<i>Lodd.</i>	lign.	cal.
<i>Philadelphus coronarius</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	<i>Phormium tenax</i>	<i>Forst.</i>	lign.	s. d.
— <i>— nanus</i>	<i>Mill.</i>	lign.	s. d.	<i>Photinia serrulata</i>	<i>Lindl.</i>	lign.	s. d.
— <i>floribundus</i>	<i>Schrad.</i>	lign.	s. d.	<i>Phragmites communis</i>	<i>Trin.</i>	per.	sp.
— <i>grandiflorus</i>	<i>W.</i>	lign.	s. d.	<i>Phylica axillaris</i>	<i>Lam.</i>	lign.	frig.
— <i>inodorus</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>buxifolia</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.
— <i>latifolius</i>	<i>Schrad.</i>	lign.	s. d.	— <i>ericoides</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.
— <i>laxus</i>	<i>Schrad.</i>	lign.	s. d.	— <i>rosmarinifolia</i>	<i>Lam.</i>	lign.	frig.
— <i>speciosus</i>	<i>Schrad.</i>	lign.	s. d.	<i>Phyllanthus cantoniensis</i>	<i>Horn.</i>	ann.	s. d.
<i>Phillyraea angustifolia</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>juglandifolius</i>	<i>W.</i>	lign.	cal.
— <i>divaricata</i>	<i>Vis.</i>	lign.	frig.	— <i>Niruri</i>	<i>N.</i>	ann.	s. d.
— <i>latifolia</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>nutans</i>	<i>Sw.</i>	lign.	cal.
— <i>media</i>	<i>Link.</i>	lign.	s. d.	— <i>ramiflorus</i>	<i>Pers.</i>	lign.	s. d.
<i>Philodendrum lacerum</i>	<i>Shott.</i>	lign.	cal.	<i>Phyllis Nobla</i>	<i>L.</i>	lign.	tep.
— <i>pinnatifidum</i>	<i>Schott.</i>	lign.	cal.	<i>Physalis Alkekengi</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
<i>Phleum alpinum</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.				
— <i>arenarium</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.				

<i>Physalis Alpinii</i>	<i>Jacq.</i>	ann.	s. d.	<i>Pinus coerulea</i>	<i>Lodd.</i>	lign.	s. d.
— <i>angulata</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>halepensis</i>	<i>Mill.</i>	lign.	s. d.
— <i>chenopodiifolia</i>	<i>Lam.</i>	per.	tep.	— <i>inops</i>	<i>Ait.</i>	lign.	s. d.
— <i>lanceifolia</i>	<i>Nees</i>	ann.	s. d.	— <i>Khutrow</i>	<i>Royl.</i>	lign.	cal.
— <i>obscura</i>	<i>Michx.</i>	ann.	s. d.	— <i>Larix</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>prostrata</i>	<i>Herit.</i>	ann.	s. d.	— <i>mexicana</i>	<i>Hort.</i>	lign.	frig.
— <i>pubescens</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>microcarpa</i>	<i>Lamb.</i>	lign.	s. d.
<i>Physostegia virginiana</i>	<i>Benth.</i>	ann.	s. d.	— <i>Mughus</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	s. d.
— <i>denticulata</i>	<i>G. Don</i>	ann.	s. d.	— <i>nigra</i>	<i>Ait.</i>	lign.	s. d.
— <i>imbricata</i>	<i>G. Don</i>	ann.	s. d.	— <i>palustris</i>	<i>Mill.</i>	lign.	frig.
— <i>speciosa</i>	<i>G. Don</i>	ann.	s. d.	— <i>Picea</i>	<i>L.</i>	lign.	sp.
<i>Phyteuma betonicaefolium</i>	<i>Vill.</i>	per.	s. d.	— <i>candicans</i>	<i>Lk.</i>	lign.	s. d.
— <i>canescens</i>	<i>W. et K.</i>	per.	s. d.	— <i>Pinaster</i>	<i>Ait.</i>	lign.	s. d.
— <i>limonifolium</i>	<i>Sibth.</i>	per.	s. d.	— <i>Pinea</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>orbiculare</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>fragilis</i>	<i>Duh.</i>	lign.	s. d.
— <i>pulchellum</i>	<i>F. et M.</i>	per.	s. d.	— <i>Pumilio</i>	<i>Haenk.</i>	lign.	s. d.
— <i>stylosum</i>	<i>Bess.</i>	per.	s. d.	— <i>Romania</i>	<i>Hort.</i>	lign.	s. d.
<i>Phytolacca abyssinica</i>	<i>Hffm.</i>	lign.	cal.	— <i>sanguinea</i>	<i>Lapeyr.</i>	lign.	s. d.
— <i>acinosa</i>	<i>Roxb.</i>	ann.	s. d.	— <i>sinensis</i>	<i>Lamb.</i>	lign.	frig.
— <i>decandra</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>Strobis</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>icosandra</i>	<i>L.</i>	per.	cal.	— <i>sylvestris</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>stricta</i>	<i>Hoffm.</i>	per.	cal.	— <i>rigensis</i>	<i>Lodd.</i>	lign.	s. d.
<i>Picridium arabicum</i>	<i>Hochst.</i>	bien.	frig.	— <i>rubra</i>	<i>Mill.</i>	lign.	s. d.
— <i>ligulatum</i>	<i>Vent.</i>	lign.	frig.	— <i>variabilis</i>	<i>Michx.</i>	lign.	s. d.
— <i>tingitanum</i>	<i>Desf.</i>	per.	frig.	<i>Piper aduncum</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.
— <i>vulgare</i>	<i>Desf.</i>	ann.	sp.	— <i>bullatum</i>	<i>Vahl.</i>	lign.	cal.
<i>Picris hieracioides</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>glandulosum</i>	<i>Opiz.</i>	lign.	cal.
— <i>laciniata</i>	<i>Vis.</i>	bien.	s. d.	— <i>marginatum</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	cal.
— <i>laevis</i>	<i>Mey.</i>	per.	s. d.	— <i>nodosum</i>	<i>Hort.</i>	lign.	cal.
— <i>Sprengeriana</i>	<i>Lam.</i>	per.	sp.	— <i>plantagineum</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.
— <i>strigosa</i>	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.	— <i>spurium</i>	<i>Link.</i>	lign.	cal.
<i>Piddlingtonia nummularia</i>	<i>DC.</i>	per.	cal.	— <i>umbellatum</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.
<i>Pimelea decussata</i>	<i>R. Br.</i>	lign.	frig.	— <i>ungiculatum</i>	<i>R. P.</i>	lign.	cal.
— <i>drupacea</i>	<i>Labill.</i>	lign.	frig.	<i>Piqueria trinervia</i>	<i>Cav.</i>	lign.	tep.
<i>Pimpinella Anisum</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	<i>Pisonia aculeata</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.
— <i>aurea</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.	— <i>fragrans</i>	<i>Desf.</i>	lign.	cal.
— <i>bubonoides</i>	<i>Brot.</i>	per.	s. d.	<i>Pistacia Lentiscus</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.
— <i>magna</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>Terebinthus</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>laciniata</i>	<i>Thor.</i>	per.	sp.	— <i>vera</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.
— <i>peregrina</i>	<i>L.</i>	bien.	s. d.	<i>Pisum arvense</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>Saxifraga</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>biflorum</i>	<i>Rafin.</i>	ann.	s. d.
— <i>nigra</i>	<i>W.</i>	per.	sp.	— <i>sativum</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
<i>Pinguicula alpina</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Pitcairnia bromeliaefolia</i>	<i>Ait.</i>	per.	cal.
— <i>grandiflora</i>	<i>Lam.</i>	per.	s. d.	— <i>furfuracea</i>	<i>Sims.</i>	per.	cal.
<i>Pinus Abies</i>	<i>L.</i>	lign.	sp.	— <i>speciosa</i>	<i>Hort.</i>	per.	cal.
— <i>clanbrasiliensis</i>	<i>Hort.</i>	lign.	s. d.	— <i>staminea</i>	<i>Lodd.</i>	per.	cal.
— <i>austriaca</i>	<i>Trattin.</i>	lign.	s. d.	<i>Pittosporum coriaceum</i>	<i>Ait.</i>	lign.	frig.
— <i>Banksiana</i>	<i>Lamb.</i>	lign.	s. d.	— <i>revolutum</i>	<i>DC.</i>	lign.	frig.
— <i>brutia</i>	<i>Tenor.</i>	lign.	s. d.	— <i>Tobira</i>	<i>Ait.</i>	lign.	s. d.
— <i>canadensis</i>	<i>Ait.</i>	lign.	s. d.	— <i>fol. varieg.</i>	<i>Hort.</i>	lign.	frig.
— <i>canariensis</i>	<i>Sweet.</i>	lign.	s. d.	— <i>undulatum</i>	<i>Vent.</i>	lign.	frig.
— <i>Cedrus</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>viridiflorum</i>	<i>Sims.</i>	lign.	frig.
— <i>Cembra</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	<i>Plagiobothrys rufescens</i>	<i>F.</i>	ann.	s. d.
					<i>et M.</i>	ann.	s. d.
				<i>Planera Richardi</i>	<i>Michx.</i>	lign.	s. d.
				<i>Plantago afra</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.

<i>Plantago altissima</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Plumieria bicolor</i>	<i>R. et P.</i>	lign.	cal.
— irrigua	<i>Fisch.</i>	per.	s. d.	— macrophylla	<i>Lodd.</i>	lign.	cal.
— arenaria	<i>W. et K.</i>	ann.	s. d.	— pudica	<i>Jacq.</i>	lign.	cal.
— asiatica	<i>L.</i>	per.	s. d.	— rubra	<i>L.</i>	lign.	cal.
— Bellardi	<i>All.</i>	ann.	s. d.	<i>Poa annua</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— camtschatica	<i>Link.</i>	per.	s. d.	— arundinacea	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.
— cordata	<i>Lam.</i>	per.	s. d.	— badensis	<i>Haenk.</i>	per.	s. d.
— Cornuti	<i>Gou.</i>	per.	s. d.	— bulbosa	<i>L.</i>	per.	sp.
— Coronopus	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— — crispa	<i>Thuill.</i>	per.	sp.
— crassa	<i>W.</i>	per.	s. d.	— compressa	<i>L.</i>	per.	sp.
— cylindrica	<i>Forsh.</i>	per.	s. d.	— concinna	<i>Gaud.</i>	per.	s. d.
— Cynops	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— fasciculata	<i>Torr.</i>	per.	s. d.
— Cummingiana	<i>F. M.</i>	per.	frig.	— fertilis	<i>Host.</i>	per.	sp.
— divaricata	<i>Zuccar.</i>	ann.	s. d.	— gigantea	<i>Hort.</i>	per.	s. d.
— Durvillei	<i>Delil.</i>	per.	s. d.	— Kitaibelii	<i>Kunth.</i>	per.	s. d.
— eriostachya	<i>Tenor.</i>	ann.	s. d.	— maritima	<i>Huds.</i>	per.	s. d.
— gentianoides	<i>Sibth.</i>	per.	s. d.	— nemoralis	<i>L.</i>	per.	sp.
— Hookeriana	<i>F. et M.</i>	ann.	s. d.	— pratensis	<i>L.</i>	per.	sp.
— lanceolata	<i>L.</i>	per.	sp.	— sudetica	<i>Haenk.</i>	per.	s. d.
— linearis	<i>Humb.</i>	per.	frig.	— trivialis	<i>L.</i>	per.	sp.
— Loefflingii	<i>L.</i>	ann.	s. d.	<i>Pocockia cretica</i>	<i>DC.</i>	ann.	s. d.
— major	<i>L.</i>	per.	sp.	<i>Podocarpus chinensis</i>	<i>Sweet.</i>	lign.	frig.
— — bracteata	<i>Mnch.</i>	per.	s. d.	— elongatus	<i>Herit.</i>	lign.	frig.
— maritima	<i>L.</i>	per.	sp.	— macrophyllus	<i>Wall.</i>	lign.	frig.
— media	<i>L.</i>	per.	sp.	— nucifer	<i>Loud.</i>	lign.	frig.
— montana	<i>Lam.</i>	per.	s. d.	— tenuifolius	<i>H. Pat.</i>	lign.	frig.
— parviflora	<i>Desf.</i>	ann.	s. d.	<i>Podolepis gracilis</i>	<i>Grah.</i>	ann.	s. d.
— Psyllium	<i>L.</i>	ann.	s. d.	<i>Podophyllum peltatum</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— salsa	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.	<i>Podospermum calcitrapifo-</i>			
— saxatilis	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.	— — lium	<i>DC.</i>	per.	s. d.
— Serraria	<i>L.</i>	per.	s. d.	— canum	<i>Mey.</i>	per.	s. d.
— xorulensis	<i>Humb.</i>	per.	frig.	— laciniatum	<i>DC.</i>	bien.	s. d.
<i>Platanthera bifolia</i>	<i>Reichb.</i>	per.	sp.	— — muricatum	<i>DC.</i>	bien.	s. d.
<i>Platanus acerifolia</i>	<i>W.</i>	lign.	s. d.	— octangulare	<i>Roth.</i>	bien.	s. d.
— — occidentalis	<i>L.</i>	lign.	s. d.	<i>Pogonostylis squarrosus</i>			
— — orientalis	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— — Bertol.		ann.	s. d.
— — umbraculifera				<i>Poinciana Gillesii</i>	<i>Hook.</i>	lign.	tep.
	<i>Hort.</i>	lign.	s. d.	<i>Poirrea coccinea</i>	<i>DC.</i>	lign.	cal.
<i>Platycodon grandiflorum</i>	<i>DC. fil.</i>	per.	s. d.	<i>Polemonium coeruleum</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
<i>Platystemon californicum</i>				— — gracile	<i>W.</i>	per.	s. d.
	<i>Benth.</i>	ann.	s. d.	— — lacteum	<i>Lehm.</i>	per.	s. d.
<i>Platanthus australis</i>	<i>R. Br.</i>	ann.	s. d.	— — mexicanum	<i>Cervnt.</i>	per.	s. d.
— fruticosus	<i>Herit.</i>	lign.	frig.	— — pulcherrimum	<i>Hook.</i>	per.	s. d.
— parviflorus	<i>W.</i>	lign.	frig.	— — reptans	<i>L.</i>	per.	s. d.
— punctatus	<i>Herit.</i>	bien.	frig.	— — Richardsons	<i>Grah.</i>	per.	s. d.
<i>Platanthus ventosa</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.	<i>Polyanthes tuberosa</i>	<i>L.</i>	per.	frig.
<i>Pluchea Dioscoridis</i>	<i>DC.</i>	lign.	frig.	<i>Polycarpaea latifolia</i>	<i>Poir.</i>	ann.	s. d.
<i>Plumbago auriculata</i>	<i>Lam.</i>	lign.	cal.	— — Teneriffae	<i>Lam.</i>	ann.	s. d.
— — capensis	<i>Thunb.</i>	lign.	frig.	<i>Polycarpon alsinifolium</i>	<i>DC.</i>	ann.	s. d.
— — corulea	<i>Humb.</i>	per.	cal.	— — tetraphyllum	<i>L. fil.</i>	ann.	sp.
— — europaea	<i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Polycnemum arvense</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— — rosea	<i>L.</i>	lign.	cal.	<i>Polygala amara</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— — scandens	<i>L.</i>	lign.	cal.	— — cordifolia	<i>Thunb.</i>	lign.	frig.
— — zeylanica	<i>L.</i>	lign.	cal.	— — myrtifolia	<i>L.</i>	lign.	frig.
<i>Plumieria alba</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.	— — speciosa	<i>Sims.</i>	lign.	frig.
				— — virgata	<i>Thunb.</i>	lign.	frig.

<i>Polygala vulgaris</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	<i>Porophyllum coloratum</i>	<i>DC.</i>	ann.	s. d.
— <i>Zeyheri</i>	<i>Spr.</i>	lign.	tep.	— <i>ellipticum</i>	<i>Cass.</i>	ann.	s. d.
<i>Polygonum acetosum</i>	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.	— <i>linifolium</i>	<i>DC.</i>	lign.	cal.
— <i>acutatum</i>	<i>Lehm.</i>	ann.	s. d.	<i>Portlandia grandiflora</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.
— <i>amphibium</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	<i>Portulaca Gillesii</i>	<i>Hook.</i>	per.	cal.
— <i>— natans</i>	<i>W.</i>	per.	sp.	— <i>— coccinea</i>	<i>Hort.</i>	per.	cal.
— <i>— terrestre</i>	<i>W.</i>	per.	sp.	— <i>megalantha</i>	<i>Steud.</i>	per.	cal.
— <i>aviculare</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>oleracea</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>Bistorta</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>pilosa</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>chinense</i>	<i>L.</i>	per.	frig.	— <i>quadrifida</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>Convolvulus</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	<i>Portulacaria afra</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	cal.
— <i>dumetorum</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	<i>Potamogeton crispus</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>elegans</i>	<i>Tenor.</i>	per.	s. d.	— <i>fluitans</i>	<i>Roth</i>	per.	sp.
— <i>emarginatum</i>	<i>Roth</i>	per.	frig.	— <i>lucens</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>Fagopyrum</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>natans</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>flagellare</i>	<i>Bertol.</i>	per.	s. d.	— <i>pectinatus</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>herniarioides</i>	<i>Delil.</i>	lign.	tep.	— <i>perfoliatus</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>Hydropiper</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>pusillus</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>laphathifolium</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	<i>Potentilla alba</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>maritimum</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>anserina</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>minus</i>	<i>Ait.</i>	ann.	sp.	— <i>argentea</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>monticolum</i>	<i>Steud.</i>	per.	sp.	— <i>astracanica</i>	<i>Jacq.</i>	per.	s. d.
— <i>orientale</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>atrosanguinea</i>	<i>Don</i>	per.	s. d.
— <i>Persicaria</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>aurea</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>Roberti</i>	<i>Loisl.</i>	per.	s. d.	— <i>bifurca</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>salignum</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.	— <i>calabra</i>	<i>Tenor.</i>	per.	s. d.
— <i>tataricum</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>canadensis</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>tinctorium</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>canescens</i>	<i>Bess.</i>	per.	s. d.
— <i>virginianum</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>chrysantha</i>	<i>Trev.</i>	per.	s. d.
— <i>viviparum</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>Comarum</i>	<i>Scop.</i>	per.	s. d.
<i>Polymnia Uvedalia</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>dasyphylla</i>	<i>Bung.</i>	per.	s. d.
<i>Polypodium aureum</i>	<i>L.</i>	per.	cal.	— <i>dealbata</i>	<i>Bung.</i>	per.	s. d.
— <i>Dryopteris</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>Dethomasii</i>	<i>Tenor.</i>	per.	s. d.
— <i>elegans</i>	<i>Cav.</i>	per.	cal.	— <i>elegans</i>	<i>Schlecht.</i>	per.	s. d.
— <i>mollicomum</i>	<i>Blum.</i>	per.	cal.	— <i>Fragariastrum</i>	<i>Ehrh.</i>	per.	s. d.
— <i>Paradisaeae</i>	<i>Fisch.</i>	per.	cal.	— <i>fruticosa</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>phymatodes</i>	<i>L.</i>	per.	cal.	— <i>gariensis</i>	<i>Eckl.</i>	per.	s. d.
— <i>vulgare</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>gelida</i>	<i>C. A. Mey.</i>	per.	s. d.
— <i>— cambricum</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.	— <i>Hippiana</i>	<i>Lehm.</i>	per.	s. d.
<i>Polypogon maritimus</i>	<i>W.</i>	ann.	s. d.	— <i>hirta</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>monspeiliensis</i>	<i>Desf.</i>	ann.	sp.	— <i>iberica</i>	<i>H. Paris.</i>	per.	s. d.
<i>Pomaderris apetala</i>	<i>Labill.</i>	lign.	frig.	— <i>incisa</i>	<i>Desf.</i>	per.	s. d.
— <i>elliptica</i>	<i>Labill.</i>	lign.	frig.	— <i>insignis</i>	<i>H. Hafn.</i>	per.	s. d.
<i>Pontederia cordata</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>intermedia</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
<i>Populus alba</i>	<i>L.</i>	lign.	sp.	— <i>Millegrana</i>	<i>Dougl.</i>	per.	s. d.
— <i>balsamifera</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>missurica</i>	<i>Schrad.</i>	per.	s. d.
— <i>canescens</i>	<i>DC.</i>	lign.	s. d.	— <i>mollissima</i>	<i>Lehm.</i>	per.	s. d.
— <i>dilatata</i>	<i>Ait.</i>	lign.	sp.	— <i>multioida</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>graeca</i>	<i>Ait.</i>	lign.	s. d.	— <i>nepalensis</i>	<i>Hook.</i>	per.	s. d.
— <i>heterophylla</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>nitida</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>monilifera</i>	<i>Ait.</i>	lign.	s. d.	— <i>nivea</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>nigra</i>	<i>L.</i>	lign.	sp.	— <i>obscura</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.
— <i>pannonica</i>	<i>Hort.</i>	lign.	s. d.	— <i>ontopoda</i>	<i>Dougl.</i>	per.	s. d.
— <i>tremula</i>	<i>L.</i>	lign.	sp.	— <i>pulcherrima</i>	<i>Lehm.</i>	per.	s. d.
<i>Porana racemosa</i>	<i>Jacq. fil.</i>	ann.	s. d.	— <i>recta</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
<i>Portiera hygrometrica</i>	<i>R. P.</i>	lign.	frig.	— <i>reptans</i>	<i>L.</i>	per.	sp.

<i>Potentilla rubens</i>	<i>All.</i>	per.	s. d.	<i>Prunus divaricata</i>	<i>Ledeb.</i>	lign.	s. d.
— <i>rupestris</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>domestica</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>Russelliana</i>	<i>Hort.</i>	per.	s. d.	— <i>duracina</i>	<i>Hort.</i>	lign.	sp.
— <i>Salesovii</i>	<i>Steph.</i>	lign.	s. d.	— <i>humilis</i>	<i>Bung.</i>	lign.	s. d.
— <i>splendens</i>	<i>Ramond</i>	per.	s. d.	— <i>japonica</i>	<i>Thunb.</i>	lign.	sp.
— <i>Sprengeliana</i>	<i>Lehm.</i>	per.	s. d.	— <i>pumila</i>	<i>Steud.</i>	lign.	s. d.
— <i>stolonifera</i>	<i>Lehm.</i>	per.	s. d.	— <i>Laurocerasus</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>subpinnata</i>	<i>Ledeb.</i>	per.	s. d.	— <i>lusitanica</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>supina</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>Mahaleb</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>thuringiaca</i>	<i>Bernh.</i>	per.	s. d.	— <i>Marasca</i>	<i>Vis.</i>	lign.	s. d.
— <i>Tormentilla</i>	<i>Schrk.</i>	per.	sp.	— <i>Padus</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>tridentata</i>	<i>Ait.</i>	per.	s. d.	— <i>pensylvanica</i>	<i>Ait.</i>	lign.	s. d.
— <i>verna</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>persicifolia</i>	<i>Desf.</i>	lign.	s. d.
— <i>vinosa</i>	<i>Lodd.</i>	per.	s. d.	— <i>pumila</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>viscosa</i>	<i>Don</i>	per.	s. d.	— <i>reclinata</i>	<i>Bosc.</i>	lign.	s. d.
<i>Poterium agrimonifolium</i>				— <i>sempervirens</i>	<i>Ehrh.</i>	lign.	s. d.
— <i>caudatum</i>	<i>Cav.</i>	per.	s. d.	— <i>serotina</i>	<i>Ehrh.</i>	lign.	s. d.
— <i>garganicum</i>	<i>Tenor.</i>	per.	s. d.	— <i>spinosa</i>	<i>L.</i>	lign.	sp.
— <i>polygamum</i>	<i>W. et K.</i>	per.	s. d.	— <i>virginiana</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>Sanguisorba</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	<i>Psiadia glutinosa</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	cal.
— <i>glaucescens</i>	<i>Reichb.</i>	per.	s. d.	<i>Psidium aromaticum</i>	<i>Aubl.</i>	lign.	cal.
— <i>spinosum</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.	— <i>cartilagineum</i>	<i>Labill.</i>	lign.	cal.
— <i>verrucosum</i>	<i>Ehrh.</i>	per.	s. d.	— <i>Cattleyanum</i>	<i>Sabin.</i>	lign.	cal.
<i>Pothos acaulis</i>				— <i>cuneifolium</i>	<i>Tenor.</i>	lign.	cal.
— <i>cordata</i>	<i>L.</i>	per.	cal.	— <i>montanum</i>	<i>Sw.</i>	lign.	frig.
— <i>digitata</i>	<i>Jacq.</i>	per.	cal.	— <i>pomiferum</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.
— <i>microphylla</i>	<i>Hook.</i>	per.	cal.	— <i>pyrifera</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.
— <i>trinervata</i>	<i>Hort.</i>	per.	cal.	<i>Psilotum triquetrum</i>	<i>Sw.</i>	lign.	cal.
— <i>violacea</i>	<i>Sw.</i>	per.	cal.	<i>Psilurus nardoides</i>	<i>Trin.</i>	ann.	sp.
<i>Prasium majus</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.	<i>Psophocarpus tetragonolobus</i>	<i>DC.</i>	ann.	s. d.
<i>Prenanthes purpurea</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	<i>Psoralea altissima</i>	<i>Bertol.</i>	lign.	frig.
<i>Primula acaulis</i>	<i>Jacq.</i>	per.	sp.	— <i>aphylla</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.
— <i>Auricula</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>arborea</i>	<i>Sims.</i>	lign.	frig.
— <i>Columnae</i>	<i>Tenor.</i>	per.	s. d.	— <i>argentea</i>	<i>Thunb.</i>	lign.	frig.
— <i>cortusoides</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>bituminosa</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>elator</i>	<i>Jacq.</i>	per.	s. d.	— <i>bracteata</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.
— <i>calycantha</i>	<i>Retz.</i>	per.	s. d.	— <i>decumbens</i>	<i>Ait.</i>	per.	frig.
— <i>integrifolia</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>dentata</i>	<i>DC.</i>	lign.	frig.
— <i>Palinuri</i>	<i>Petagn.</i>	per.	frig.	— <i>frutescens</i>	<i>Poir.</i>	lign.	frig.
— <i>praenitens</i>	<i>Ker.</i>	per.	frig.	— <i>glandulosa</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.
— <i>veris</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>hirta</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.
<i>Prosopis juliflora</i>	<i>DC.</i>	lign.	frig.	— <i>lathyrifolia</i>	<i>Balb.</i>	per.	frig.
<i>Prostanthera violacea</i>	<i>R. B.</i>	lign.	frig.	— <i>macrostachya</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.
<i>Protea cynaroides</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.	— <i>odoratissima</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	frig.
<i>Prunella equinoctialis</i>	<i>Hmb.</i>	per.	cal.	— <i>palaestina</i>	<i>L.</i>	per.	frig.
— <i>grandiflora</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>pinnata</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.
— <i>hyssopifolia</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>plumosa</i>	<i>Reichb.</i>	per.	s. d.
— <i>laciniata</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>pubescens</i>	<i>Balb.</i>	lign.	tep.
— <i>pensylvanica</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.	— <i>sempervirens</i>	<i>H. Bon.</i>	lign.	frig.
— <i>vulgaris</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>sericea</i>	<i>Poir.</i>	lign.	frig.
— <i>longifolia</i>	<i>Pers.</i>	per.	s. d.	<i>Psychotria undata</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	cal.
<i>Prunus Avium</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	<i>Ptarmica atrata</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.
— <i>caroliniana</i>	<i>Ait.</i>	lign.	s. d.	— <i>biserrata</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.
— <i>Cerasus</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>Clavennae</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.
— <i>depressa</i>	<i>Pursh.</i>	lign.	s. d.	— <i>cristata</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.

<i>Ptarmica grandiflora</i>	DC.	per.	s. d.	<i>Pyrgosea tomentosa</i>	Haw.	per.	cal.
— mongolica	DC.	per.	s. d.	<i>Pyrula secunda</i>	L.	per.	s. d.
— Thomasiana	DC.	per.	s. d.	<i>Pyrus amygdaliformis</i>	Vill.	lign.	s. d.
— vallesiaca	DC.	per.	s. d.	— Aria	Ehrh.	lign.	s. d.
— vulgaris	DC.	per.	s. d.	— astracantha	H. Modét	lign.	s. d.
— cartilaginea	Led.	per.	s. d.	— Aucuparia	Gaertn.	lign.	s. d.
<i>Ptelea trifoliata</i>	L.	lign.	s. d.	— baccata	L.	lign.	s. d.
<i>Pteris aquilina</i>	L.	per.	sp.	— communis	L.	lign.	s. d.
— auriculata	Sw.	per.	frig.	— crataegifolia	Savi	lign.	s. d.
— chinensis	Hort.	per.	frig.	— depressa	Lindl.	lign.	s. d.
— cretica	L.	per.	s. d.	— elaeagnifolia	Pall.	lign.	s. d.
— elegans	Poir.	per.	frig.	— horizontalis	H. Vind.	lign.	s. d.
— longifolia	L.	per.	frig.	— intermedia	Ehrh.	lign.	s. d.
— serrulata	L.	per.	frig.	— latifolia	Lindl.	lign.	s. d.
<i>Pterocephalus palaestinus</i>				— Malus	L.	lign.	s. d.
— Coultr.	ann.	s. d.		— Michauxii	Bosc	lign.	s. d.
— Sibthorpius	Bert.	ann.	s. d.	— microcarpa	Spr.	lign.	s. d.
<i>Pteroneuron graecum</i>	DC.	ann.	s. d.	— pinnatifida	Ehrh.	lign.	s. d.
<i>Pterospermum acerifolium</i>	W.	lign.	cal.	— sinaica	Thouin	lign.	s. d.
<i>Pterotheca bifida</i>	F. et M.	ann.	s. d.	— Sorbus	Gaertn.	lign.	s. d.
<i>Ptychotis coptica</i>	DC.	ann.	s. d.	— spectabilis	Ait.	lign.	s. d.
— verticillata	Duby	ann.	s. d.	— terminalis	Ehrh.	lign.	s. d.
<i>Pulicaria dysenterica</i>	Gärtn.	per.	sp.	<i>Quamoclit vulgaris</i>	Chois.	ann.	s. d.
— odora	Reichb.	per.	s. d.	<i>Quercus alba</i>	L.	lign.	s. d.
— undulata	DC.	ann.	s. d.	— aquatica	Walt.	lign.	s. d.
— vulgaris	Gaertn.	per.	sp.	— Ballota	Desf.	lign.	s. d.
<i>Pulmonaria angustifolia</i>	L.	per.	sp.	— castanea	W.	lign.	s. d.
— azurea	Bess.	per.	s. d.	— Cerris	L.	lign.	s. d.
— officinalis	L.	per.	sp.	— coccifera	L.	lign.	s. d.
— saccharata	Mill.	per.	s. d.	— coccinea	Wngm	lign.	s. d.
<i>Pulsatilla alpina</i>	Spr.	per.	s. d.	— dentata	Thunb.	lign.	s. d.
— Hackelii	Reichb.	per.	s. d.	— heterophylla	Michx.	lign.	s. d.
— pratensis	Mill.	per.	s. d.	— Ilex	L.	lign.	sp.
<i>Pultanea tenuifolia</i>	R. Br.	lign.	frig.	— lusitanica	Lam.	lign.	s. d.
<i>Punica Granatum</i>	L.	lign.	s. d.	— lyrata	Walt.	lign.	s. d.
<i>Pycnanthemum lanceola-</i>				— macrocarpa	Michx.	lign.	s. d.
— tum	Pursh	per.	s. d.	— macrophylla	Nee	lign.	s. d.
<i>Pyrethrum alpinum</i>	W.	per.	s. d.	— Michauxii	Nutt.	lign.	s. d.
— arvense	Salzm.	ann.	s. d.	— Novi Genabii	Hort.	lign.	frig.
— Balsamita	W.	per.	s. d.	— pedunculata	W.	lign.	sp.
— carneum	Bieb.	per.	s. d.	— Phellos	L.	lign.	s. d.
— caucasicum	W.	per.	s. d.	— Prinus	L.	lign.	s. d.
— cinerariaefolium	Trv.	per.	s. d.	— pubescens	W.	lign.	sp.
— Clusii	Fisch.	per.	s. d.	— Robur	W.	lign.	sp.
— corymbosum	W.	per.	sp.	— rubra	L.	lign.	s. d.
— decipiens	F. et M.	per.	s. d.	— rugosa	Nee	lign.	frig.
— macrophyllum	W.	per.	s. d.	— Tauzin	Pers.	lign.	s. d.
— millefolium	W.	per.	s. d.	— tomentosa	W.	lign.	s. d.
— myriophyllum	Mey.	per.	s. d.	<i>Queria hispanica</i>	L.	ann.	s. d.
— niveum	Lagasc.	per.	s. d.	<i>Quisqualis pubescens</i>	Burm.	lign.	cal.
— Parthenium	Sm.	per.	s. d.				
— petraeum	F. et M.	per.	s. d.	<i>Ranunculus abortivus</i>	L.	per.	s. d.
— sinense	DC.	per.	s. d.	— aconitifolius	L.	per.	s. d.
— tanacetoides	DC.	per.	s. d.	— acris	L.	per.	sp.
<i>Pyrgosea linguafolia</i>	Haw.	per.	frig.	— alpestris	L.	per.	s. d.

<i>Ranunculus angulatus</i> <i>Prest</i>	per.	s. d.	<i>Renanthera coccinea</i> <i>Lour.</i>	per.	cal.
— <i>angustifolius</i> <i>DC.</i>	per.	s. d.	<i>Reseda abyssinica</i> <i>Fresen.</i>	ann.	s. d.
— <i>aquaticus</i> <i>L.</i>	per.	sp.	— <i>alba</i> <i>L.</i>	bien.	s. d.
— <i>capillaceus</i> <i>Thuil.</i>	per.	sp.	— <i>crispata</i> <i>Link</i>	ann.	s. d.
— <i>arvensis</i> <i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>lutea</i> <i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>auricomus</i> <i>L.</i>	per.	sp.	— <i>Luteola</i> <i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>brutius</i> <i>Tenor.</i>	per.	s. d.	— <i>macroserpa</i> <i>Rechb.</i>	ann.	s. d.
— <i>bulbosus</i> <i>L.</i>	per.	sp.	— <i>odorata</i> <i>L.</i>	lign.	frig.
— <i>bracteatus</i> <i>Schleich</i>	per.	s. d.	— <i>Phyteuma</i> <i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>caucasicus</i> <i>Bieb.</i>	per.	s. d.	<i>Rhagadiolus edulis</i> <i>Gaertn.</i>	ann.	sp.
— <i>chius</i> <i>DC.</i>	ann.	s. d.	— <i>stellatus</i> <i>Gaertn.</i>	ann.	sp.
— <i>coronatus</i> <i>Ehrnb.</i>	per.	s. d.	<i>Rhagodia nutans</i> <i>R. Br.</i>	per.	s. d.
— <i>crassicaulis</i> <i>H. Chels.</i>	per.	s. d.	<i>Rhamnus Alaternus</i> <i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>fumariaefolius</i> <i>Desf.</i>	per.	s. d.	— <i>catharticus</i> <i>L.</i>	lign.	sp.
— <i>illyricus</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>Clusii</i> <i>W.</i>	lign.	frig.
— <i>lanuginosus</i> <i>L.</i>	per.	sp.	— <i>variegatus</i> <i>Hort.</i>	lign.	frig.
— <i>Lingua</i> <i>L.</i>	per.	sp.	— <i>crenulatus</i> <i>Ait.</i>	lign.	frig.
— <i>lomatacarpus</i> <i>F. M.</i>	ann.	s. d.	— <i>Erythroxylon</i> <i>Pall.</i>	lign.	s. d.
— <i>millefoliatus</i> <i>Vahl</i>	per.	s. d.	— <i>Frangula</i> <i>L.</i>	lign.	sp.
— <i>monspehiacus</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>lanceolatus</i> <i>Pursh</i>	lign.	s. d.
— <i>napellifolius</i> <i>DC.</i>	per.	s. d.	— <i>longifolius</i> <i>Desf.</i>	lign.	frig.
— <i>nemorosus</i> <i>DC.</i>	per.	sp.	— <i>monspehiacus</i> <i>Hort.</i>	lign.	s. d.
— <i>parviflorus</i> <i>L.</i>	per.	sp.	— <i>prinoides</i> <i>Herit.</i>	lign.	frig.
— <i>pedatus</i> <i>W. et K.</i>	per.	s. d.	— <i>pumilus</i> <i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>pensylvanicus</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>surinamensis</i> <i>Scop.</i>	lign.	frig.
— <i>peucedanifolius</i> <i>All.</i>	per.	sp.	— <i>tinctoriis</i> <i>W. et K.</i>	lign.	s. d.
— <i>philonotis</i> <i>Retz</i>	ann.	sp.	— <i>Wicklins</i> <i>Hort.</i>	lign.	s. d.
— <i>propinquus</i> <i>C. A. M.</i>	per.	s. d.	— <i>Wulfenii</i> <i>Hopp.</i>	lign.	s. d.
— <i>repens</i> <i>L.</i>	per.	sp.	<i>Rhapis flabelliformis</i> <i>L. fil.</i>	lign.	cal.
— <i>rheodifolius</i> <i>DC.</i>	per.	frig.	<i>Rhaponticum atriplicifolium</i> <i>DC.</i>	per.	s. d.
— <i>sceleratus</i> <i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>carinatum</i> <i>Less.</i>	per.	s. d.
— <i>Schraderianus</i> <i>F. M.</i>	ann.	s. d.	— <i>centauroides</i> <i>F. M.</i>	per.	s. d.
— <i>Seguieri</i> <i>Vill.</i>	per.	s. d.	— <i>coronatum</i> <i>Less.</i>	per.	s. d.
— <i>Stevenii</i> <i>Bess.</i>	per.	s. d.	— <i>pulchrum</i> <i>F. et M.</i>	per.	s. d.
— <i>Thomasii</i> <i>Tenor.</i>	per.	s. d.	— <i>quinquefolium</i> <i>Less.</i>	per.	s. d.
— <i>Thora</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Rheum australe</i> <i>Don</i>	per.	frig.
— <i>trachycarpus</i> <i>F. M.</i>	ann.	s. d.	— <i>caspicum</i> <i>W.</i>	per.	s. d.
— <i>trilobus</i> <i>Desf.</i>	per.	s. d.	— <i>compactum</i> <i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>Villarsii</i> <i>DC.</i>	per.	s. d.	— <i>crassinervium</i> <i>Mart.</i>	per.	s. d.
<i>Raphanus Landra</i> <i>Morett.</i>	bien.	s. d.	— <i>crispum</i> <i>Andr.</i>	per.	s. d.
— <i>Raphanistrum</i> <i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>Rhaponticum</i> <i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>rostratus</i> <i>DC.</i>	ann.	s. d.	— <i>tataricum</i> <i>L. fil.</i>	per.	s. d.
— <i>sativus</i> <i>L.</i>	bien.	s. d.	— <i>undulatum</i> <i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>Gayanus</i> <i>Sweet</i>	bien.	s. d.	<i>Rhinanthus major</i> <i>Ehrh.</i>	ann.	sp.
— <i>niger</i> <i>Mill.</i>	bien.	s. d.	— <i>minor</i> <i>Ehrh.</i>	ann.	sp.
<i>Raphiolepis indica</i> <i>Lindl.</i>	lign.	frig.	— <i>villosus</i> <i>Pers.</i>	ann.	sp.
— <i>rubra</i> <i>Lindl.</i>	lign.	frig.	<i>Rhipsalis Cassythia</i> <i>Gaertn.</i>	lign.	cal.
<i>Rapistrum orientale</i> <i>DC.</i>	ann.	s. d.	— <i>crispata</i> <i>Pfeiff.</i>	lign.	cal.
— <i>perenne</i> <i>Berg.</i>	per.	s. d.	— <i>—</i> <i>latior</i> <i>Salm</i>	lign.	cal.
— <i>rugosum</i> <i>All.</i>	ann.	sp.	— <i>dichotoma</i> <i>Hort.</i>	lign.	cal.
<i>Rauwolfia canescens</i> <i>L.</i>	lign.	cal.	— <i>fasciculata</i> <i>Haw.</i>	lign.	cal.
— <i>spinosa</i> <i>Cav.</i>	lign.	cal.	— <i>floccosa</i> <i>Salm</i>	lign.	cal.
— <i>tomentosa</i> <i>Jacq.</i>	lign.	cal.	— <i>funalis</i> <i>Salm</i>	lign.	cal.
<i>Ravenala madagascariensis</i> <i>Sonner.</i>	lign.	cal.	— <i>mesembryanthoides</i> <i>Haw.</i>	lign.	cal.
<i>Reboulea gracilis</i> <i>Kunth</i>	per.	s. d.			

<i>Rhipsalis pachyptera</i>	<i>Pfeiff.</i>	lign.	cal.	<i>Ribes triflorum</i>	<i>W.</i>	lign.	s. d.
— <i>ramulosa</i>	<i>Pfeiff.</i>	lign.	cal.	— <i>triste</i>	<i>Pall.</i>	lign.	s. d.
— <i>rhombea</i>	<i>Pfeiff.</i>	lign.	cal.	— <i>Uva crispa</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>undulata</i>	<i>Pfeiff.</i>	lign.	cal.	<i>Richardia scabra</i>	<i>L.</i>	per.	frig.
<i>Rhodanthe Mangesii</i>	<i>Lindl.</i>	ann.	s. d.	<i>Ricinus africanus</i>	<i>Mill.</i>	ann.	s. d.
<i>Rhododendron arboreum</i>				— <i>communis</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— — pl. variet.	<i>Sm.</i>	lign.	frig.	— <i>lividus</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	cal.
— <i>Chamaecistus</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.	— <i>rutilans</i>	<i>H. Berol.</i>	ann.	s. d.
— <i>ferrugineum</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>viridis</i>	<i>W.</i>	ann.	s. d.
— <i>hirsutum</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	<i>Riedleia corchorifolia</i>	<i>DC.</i>	ann.	s. d.
— <i>indicum</i>	<i>Sweet</i>	lign.	frig.	<i>Rivina brasiliensis</i>	<i>Nocca</i>	lign.	cal.
— — pl. variet.	<i>Hort.</i>	lign.	frig.	— <i>humilis</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.
— <i>maximum</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>laevis</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.
— — pl. variet.	<i>Hort.</i>	lign.	s. d.	— <i>octandra</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.
— <i>ponticum</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	<i>Robertia taraxacoides</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.
— — pl. variet.	<i>Hort.</i>	lign.	s. d.	<i>Robinia dubia</i>	<i>Fouc.</i>	lign.	s. d.
— <i>purpureum</i>	<i>G. Don</i>	lign.	s. d.	— <i>hispida</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
<i>Rhus Coriaria</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>Pseudacacia</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>Cotinus</i>	<i>L.</i>	lign.	sp.	— — <i>crispa</i>	<i>Hort.</i>	lign.	s. d.
— <i>glauca</i>	<i>Desf.</i>	lign.	frig.	— — <i>inermis</i>	<i>Dumont</i>	lign.	s. d.
— <i>heterophylla</i>	<i>DC.</i>	lign.	frig.	— — <i>sophoraefolia</i>	<i>Hrt</i>	lign.	s. d.
— <i>lucida</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.	— — <i>spectabilis</i>	<i>Dmnt</i>	lign.	s. d.
— <i>radicans</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>suberosa</i>	<i>Hort.</i>	lign.	s. d.
— <i>suaveolens</i>	<i>Ait.</i>	lign.	s. d.	— <i>tortuosa</i>	<i>Hoffmsg.</i>	lign.	s. d.
— <i>tomentosa</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.	— <i>viscosa</i>	<i>Vent.</i>	lign.	s. d.
— <i>Toxicodendron</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	<i>Rochea coccinea</i>	<i>DC.</i>	lign.	frig.
— <i>typhina</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>cymosa</i>	<i>DC.</i>	lign.	frig.
— <i>undulata</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	frig.	— <i>salcata</i>	<i>DC.</i>	lign.	frig.
— <i>venenata</i>	<i>DC.</i>	lign.	s. d.	— <i>perfoliata</i>	<i>DC.</i>	lign.	frig.
— <i>viminalis</i>	<i>Vahl</i>	lign.	frig.	<i>Rodigia commutata</i>	<i>Spr.</i>	ann.	s. d.
<i>Rhynchanthera grandiflora</i>	<i>DC.</i>	lign.	cal.	<i>Roemeria hybrida</i>	<i>DC.</i>	ann.	s. d.
<i>Rhynchosidium sessiliflorum</i>	<i>DC.</i>	ann.	s. d.	<i>Rohdea japonica</i>	<i>Roth</i>	per.	s. d.
— — <i>lateriflorum</i>	<i>Less.</i>	ann.	s. d.	<i>Romulea coelestina</i>	<i>Vu.</i>	per.	frig.
<i>Rhynchosia minima</i>	<i>DC.</i>	lign.	cal.	— <i>Columnae</i>	<i>Sebast.</i>	per.	frig.
<i>Ribes aciculare</i>	<i>Sm.</i>	lign.	s. d.	— <i>purpurascens</i>	<i>Tenor.</i>	per.	s. d.
— <i>aureum</i>	<i>Pursh</i>	lign.	s. d.	— <i>ramiflora</i>	<i>Tenor.</i>	per.	s. d.
— — <i>flavum</i>	<i>Colla</i>	lign.	s. d.	<i>Rondeletia americana</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.
— — <i>palmatum</i>	<i>Desf.</i>	lign.	s. d.	<i>Rosa alba</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— — <i>praecox</i>	<i>Lindl.</i>	lign.	s. d.	— <i>alpina</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>Cynosbati</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>arvensis</i>	<i>Huds.</i>	lign.	sp.
— <i>Discantha</i>	<i>L. fil.</i>	lign.	s. d.	— <i>Banksiae</i>	<i>R. Br.</i>	lign.	s. d.
— <i>floridum</i>	<i>Herit.</i>	lign.	s. d.	— — <i>flava</i>	<i>Hort.</i>	lign.	s. d.
— <i>nigrum</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>blanda</i>	<i>Ait.</i>	lign.	s. d.
— <i>odoratum</i>	<i>Wendl.</i>	lign.	s. d.	— <i>bracteata</i>	<i>Wendl.</i>	lign.	s. d.
— <i>opulifolium</i>	<i>Loud.</i>	lign.	s. d.	— <i>caesia</i>	<i>Sm.</i>	lign.	s. d.
— <i>oxyacanthoides</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>camtschatica</i>	<i>Vent.</i>	lign.	s. d.
— <i>petraeum</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	s. d.	— <i>canina</i>	<i>L.</i>	lign.	sp.
— — <i>tauricum</i>	<i>Hort.</i>	lign.	s. d.	— <i>carolina</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>recurvatum</i>	<i>Michx.</i>	lign.	s. d.	— <i>caucasica</i>	<i>Bieb.</i>	lign.	s. d.
— <i>rubrum</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>centifolia</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>sanguineum</i>	<i>Pursh</i>	lign.	s. d.	— <i>cinnamomea</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>saxatile</i>	<i>Pall.</i>	lign.	s. d.	— <i>collina</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	s. d.
— <i>tenuiflorum</i>	<i>Lindl.</i>	lign.	s. d.	— <i>cuspidata</i>	<i>Bieb.</i>	lign.	s. d.
				— <i>damascena</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
				— <i>dumetorum</i>	<i>Thuill.</i>	lign.	s. d.
				— <i>Eglanteria</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.

<i>Rosa Eglanteria bicolor</i> Jacq.	lign.	s. d.	<i>Ruellia grandiflora</i> Poir.	per.	frig.
— floribunda Stev.	lign.	s. d.	— lactea Cav.	per.	frig.
— gallica L.	lign.	sp.	— ovata Cav.	per.	tep.
— — pumila Jacq.	lign.	sp.	— pallida Vahl	lign.	tep.
— — provincialis Ait.	lign.	s. d.	— paniculata L.	per.	tep.
— — hybrida Koch	lign.	s. d.	— strepens L.	per.	s. d.
— — pl. variet. Hort.	lign.	s. d.	— tuberosa L.	per.	tep.
— japonica Waitz	lign.	s. d.	<i>Ruizia variabilis</i> W.	lign.	cal.
— indica L.	lign.	s. d.	<i>Rumex abyssinicus</i> Jacq.	lign.	tep.
— — pl. variet. Hort.	lign.	s. d.	— Acetosella L.	per.	sp.
— Lawrenceana Sweet	lign.	s. d.	— Acetosella L.	per.	sp.
— lucida Ehrh.	lign.	s. d.	— alpinus L.	per.	s. d.
— microphylla Roxb.	lign.	s. d.	— aquaticus L.	per.	sp.
— moschata Ait.	lign.	s. d.	— arifolius L.	lign.	frig.
— ochroleuca Sw.	lign.	s. d.	— Brownianus Campd.	per.	frig.
— parviflora Ehrh.	lign.	s. d.	— bucephalophorus L.	ann.	s. d.
— persica Lodd.	lign.	s. d.	— campestris Gusson.	per.	s. d.
— pimpinellifolia L.	lign.	s. d.	— chrysocarpus Moris	per.	s. d.
— — altaica W.	lign.	s. d.	— cordifolius Horn.	per.	s. d.
— — myriacantha Lindl.	lign.	s. d.	— crispus L.	per.	sp.
— — spinosissima L.	lign.	s. d.	— cristatus DC.	per.	s. d.
— — reversa W. et K.	lign.	s. d.	— cuneifolius Campd.	per.	tep.
— rubiginosa L.	lign.	sp.	— dentatus L.	ann.	s. d.
— — agrestis Savi	lign.	sp.	— Fischeri Reichb.	per.	s. d.
— sepium Thuill.	lign.	s. d.	— Gmelini Turtsch.	per.	s. d.
— setigera Michx.	lign.	s. d.	— hamatus Trev.	per.	frig.
— stylosa Desv.	lign.	s. d.	— — uncatus Steud.	per.	frig.
— tomentosa Sm.	lign.	s. d.	— hastatus Don	per.	frig.
— villosa L.	lign.	s. d.	— Hydrolapathum Hds.	per.	sp.
— Woodsii Lindl.	lign.	s. d.	— intermedius DC.	per.	s. d.
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	lign.	s. d.	— longifolius Humb.	per.	tep.
<i>Royena lucida</i> L.	lign.	frig.	— Lunaria L.	lign.	frig.
<i>Rubia cordifolia</i> L.	per.	s. d.	— maritimus L.	ann.	s. d.
— — Olivieri Rich.	per.	s. d.	— maximus Schreb.	per.	s. d.
— tinctorum L.	per.	sp.	— Nemolapathum Ehrh.	per.	sp.
<i>Rubus caesius</i> L.	lign.	sp.	— nemorosus Schrad.	per.	s. d.
— corylifolius Sm.	lign.	sp.	— orientalis Bernh.	bien.	s. d.
— fruticosus L.	lign.	sp.	— Patientia L.	per.	s. d.
— idaeus L.	lign.	sp.	— — confertus Hort.	per.	s. d.
— — albus Ait.	lign.	s. d.	— polygonifolius Loud.	per.	s. d.
— laciniatus W.	lign.	s. d.	— pulcher L.	per.	sp.
— nepalensis Hort.	lign.	s. d.	— reticulatus Bess.	ann.	s. d.
— occidentalis L.	lign.	s. d.	— retroflexus Lagasc.	per.	s. d.
— odoratus L.	lign.	s. d.	— salicifolius Weinm.	per.	s. d.
— rosaeifolius Sm.	lign.	s. d.	— sanguineus L.	per.	s. d.
— tomentosus W.	lign.	sp.	— scutatus L.	per.	sp.
<i>Rudbeckia fulgida</i> Ait.	per.	s. d.	— — hastaeifolius Bieb.	per.	s. d.
— hirta L.	per.	s. d.	— verticillatus L.	per.	s. d.
— laciniata L.	per.	s. d.	<i>Ruscus aculeatus</i> L.	lign.	sp.
— speciosa Wender.	per.	s. d.	— Hypoglossum L.	lign.	s. d.
— triloba L.	per.	s. d.	— racemosus L.	lign.	s. d.
<i>Ruellia anisophylla</i> Wall.	per.	frig.	<i>Russelia juncea</i> Zuccar.	lign.	tep.
— biflora L.	per.	s. d.	— multiflora Sims	lign.	tep.
— flava Juss.	per.	cal.	<i>Ruta graveolens</i> L.	lign.	s. d.
— formosa Andr.	lign.	cal.	— patavina L.	per.	sp.

<i>Rytidophyllum prasinatum</i>				<i>Salvia hirsuta</i>	<i>Jacq.</i>	ann.	s. d.
— <i>tomentosum</i>	<i>Mart.</i>	lign.	cal.	— <i>hispanica</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
		lign.	cal.	— <i>Horminum</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
<i>Sabal Adansonii</i>	<i>Guerns.</i>	lign.	tep.	— <i>indica</i>	<i>L.</i>	per.	tep.
<i>Saccharum cylindricum</i>	<i>Lm.</i>	per.	s. d.	— <i>interrupta</i>	<i>Schousb.</i>	lign.	tep.
— <i>officinatum</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.	— <i>japonica</i>	<i>Thunb.</i>	ann.	s. d.
— <i>violaceum</i>	<i>Juss.</i>	per.	cal.	— <i>lamiifolia</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	s. d.
<i>Sagina apetala</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>lanata</i>	<i>Roxb.</i>	per.	tep.
— <i>procumbens</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>lanigera</i>	<i>Desf.</i>	bien.	s. d.
<i>Sagittaria sagittifolia</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>leonuroides</i>	<i>Gloxin.</i>	lign.	cal.
<i>Salix alba</i>	<i>L.</i>	lign.	sp.	— <i>leucantha</i>	<i>Cav.</i>	ligno.	frig.
— <i>vitellina</i>	<i>L.</i>	lign.	sp.	— <i>limbata</i>	<i>Mey.</i>	per.	s. d.
— <i>amygdalina</i>	<i>L.</i>	lign.	sp.	— <i>lyrata</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>aurita</i>	<i>L.</i>	lign.	sp.	— <i>mexicana</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.
— <i>babylonica</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>micrantha</i>	<i>Vahl</i>	per.	tep.
— <i>crispa</i>	<i>Hort.</i>	lign.	s. d.	— <i>napifolia</i>	<i>Jacq.</i>	per.	s. d.
— <i>Caprea</i>	<i>L.</i>	lign.	sp.	— <i>nilotica</i>	<i>Murr.</i>	per.	s. d.
— <i>cinerea</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>nivea</i>	<i>Thunb.</i>	lign.	frig.
— <i>variegata</i>	<i>Hort.</i>	lign.	s. d.	— <i>officinalis</i>	<i>L.</i>	lign.	sp.
— <i>herbacea</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>angustifol.</i>	<i>Hort.</i>	lign.	s. d.
— <i>purpurea</i>	<i>L.</i>	lign.	sp.	— <i>aurita</i>	<i>Schult.</i>	lign.	sp.
— <i>reticulata</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>variegata</i>	<i>Hort.</i>	lign.	s. d.
— <i>viminialis</i>	<i>L.</i>	lign.	sp.	— <i>paniculata</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.
<i>Salmea scandens</i>	<i>DC.</i>	lign.	cal.	— <i>patens</i>	<i>Cav.</i>	per.	tep.
<i>Salpiglossis linearis</i>	<i>Hook.</i>	ann.	s. d.	— <i>pendula</i>	<i>Vahl</i>	per.	s. d.
— <i>straminea</i>	<i>Hook.</i>	ann.	s. d.	— <i>pinnata</i>	<i>L.</i>	bien.	s. d.
<i>Salsola foliosa</i>	<i>Schult.</i>	ann.	s. d.	— <i>pomifera</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>Kali</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>pratensis</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>radiata</i>	<i>Desf.</i>	ann.	s. d.	— <i>pseudococcinea</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	cal.
— <i>Soda</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>pulchella</i>	<i>DC.</i>	lign.	cal.
— <i>Tragus</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>pyrenaica</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
<i>Salvia Aethiopis</i>	<i>L.</i>	bien.	s. d.	— <i>rectiflora</i>	<i>Vis.</i>	lign.	cal.
— <i>amarissima</i>	<i>Orteg.</i>	per.	frig.	— <i>rhombifolia</i>	<i>R. et P.</i>	per.	cal.
— <i>amplexicaulis</i>	<i>Lam.</i>	per.	s. d.	— <i>Sclaraea</i>	<i>L.</i>	bien.	sp.
— <i>angustifolia</i>	<i>Cav.</i>	per.	tep.	— <i>Sibthorpii</i>	<i>Sm.</i>	per.	s. d.
— <i>argentea</i>	<i>L.</i>	bien.	s. d.	— <i>Simisiana</i>	<i>Schult.</i>	per.	s. d.
— <i>aurea</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.	— <i>speciosa</i>	<i>Presl</i>	lign.	frig.
— <i>austriaca</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>Spielmanni</i>	<i>Scop.</i>	ann.	s. d.
— <i>azurea</i>	<i>Lam.</i>	per.	frig.	— <i>spinosa</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>canariensis</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.	— <i>splendens</i>	<i>Ker</i>	lign.	cal.
— <i>candidissima</i>	<i>Vahl</i>	per.	frig.	— <i>sylvestris</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>cardinalis</i>	<i>Humb.</i>	per.	tep.	— <i>sylicola</i>	<i>Burch.</i>	per.	cal.
— <i>ceratophylla</i>	<i>L.</i>	bien.	frig.	— <i>Tenorii</i>	<i>Schrk</i>	per.	s. d.
— <i>chamaedryoides</i>	<i>Cav.</i>	lign.	tep.	— <i>tingitana</i>	<i>Ettling.</i>	lign.	frig.
— <i>clandestina</i>	<i>L.</i>	bien.	s. d.	— <i>triloba</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>multifida</i>	<i>Sibth.</i>	bien.	s. d.	— <i>variegata</i>	<i>W. et K.</i>	per.	s. d.
— <i>coccinea</i>	<i>L.</i>	per.	tep.	— <i>verbascifolia</i>	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.
— <i>corymbosa</i>	<i>Wall.</i>	per.	frig.	— <i>Verbenaca</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>Forskahlei</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>verbenacoides</i>	<i>Brot.</i>	per.	s. d.
— <i>glutinosa</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>verticillata</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>Grahami</i>	<i>Benth.</i>	lign.	tep.	— <i>virgata</i>	<i>Ait.</i>	per.	s. d.
— <i>grandiflora</i>	<i>Ettling.</i>	lign.	s. d.	<i>Sambucus Ebulus</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>Habliziana</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.	— <i>nigra</i>	<i>L.</i>	lign.	sp.
— <i>Halleri</i>	<i>Fisch.</i>	per.	s. d.	— <i>lacinata</i>	<i>Mill.</i>	lign.	s. d.
— <i>hastaeifolia</i>	<i>E. Mey.</i>	per.	cal.	— <i>rotundifolia</i>	<i>Lodd.</i>	lign.	s. d.
				— <i>pubens</i>	<i>Michx.</i>	lign.	s. d.

Samolus Valerandi	<i>L.</i>	ann.	sp.	Saxifraga rotundifolia	<i>L.</i>	per.	s. d.
Sanguinaria canadensis	<i>L.</i>	per.	frig.	— sarmentosa	<i>L.</i>	per.	s. d.
Sanguisorba angustifolia				— Sternbergii	<i>W.</i>	per.	s. d.
— bracteosa	<i>Fisch.</i>	per.	s. d.	— tridactylites	<i>L.</i>	ann.	sp.
— carnea	<i>Bess.</i>	per.	s. d.	— exilis	<i>Pollin.</i>	ann.	sp.
— officinalis	<i>Fisch.</i>	per.	s. d.	Scabiosa arvensis	<i>L.</i>	per.	sp.
— tenuifolia	<i>Fisch.</i>	per.	s. d.	— dipsacifolia	<i>Schott.</i>	per.	s. d.
Sanicula europaea	<i>L.</i>	per.	sp.	— reversa	<i>Ledeb.</i>	per.	s. d.
Sanseviella carnea	<i>Reichb.</i>	per.	frig.	— sylvatica	<i>L.</i>	per.	sp.
Sansevieria fulvocincta	<i>Haw.</i>	per.	cal.	— venusta	<i>H. Monsp.</i>	per.	s. d.
— guineensis	<i>W.</i>	per.	cal.	Scandix australis	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— zeylanica	<i>W.</i>	per.	cal.	— brachycarpa	<i>Gusson.</i>	ann.	s. d.
Santolina Chamaecyparissus	<i>L.</i>	lign.	sp.	— grandiflora	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— ericoides	<i>Poir.</i>	lign.	s. d.	— Pecten Veneris	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— tomentosa	<i>Pers.</i>	lign.	s. d.	Schaueria calicotricha	<i>Nees</i>	lign.	cal.
— pinnata	<i>Viv.</i>	lign.	s. d.	Schinus Molle	<i>L.</i>	lign.	frig.
— viridis	<i>W.</i>	lign.	s. d.	Schiwerekia podolica	<i>An-drz.</i>	per.	s. d.
Sanvitalia procumbens	<i>Lam.</i>	ann.	s. d.	Schizanthus heterophyllus			
Sapindus marginatus	<i>W.</i>	lign.	cal.	— pinnatus	<i>R. et P.</i>	ann.	s. d.
— Saponaria	<i>L.</i>	lign.	cal.	— porrigens	<i>Hook.</i>	ann.	s. d.
Sapium aucuparium	<i>Jacq.</i>	lign.	cal.	— retusus	<i>Hook.</i>	ann.	s. d.
Saponaria cerastoides	<i>Fisch.</i>	ann.	s. d.	Schizogyne sericea	<i>DC.</i>	lign.	cal.
— depressa	<i>Bivon.</i>	per.	s. d.	Schizopetalum Walkeri	<i>Sms.</i>	ann.	s. d.
— ocimoides	<i>L.</i>	per.	sp.	Schkuhria abrotanoides	<i>Rth.</i>	ann.	s. d.
— officinalis	<i>L.</i>	per.	sp.	Schoberia altissima	<i>Mey.</i>	ann.	s. d.
— porrigens	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— fruticosa	<i>Mey.</i>	lign.	s. d.
— Vaccaria	<i>L.</i>	ann.	sp.	— spicata	<i>Mey.</i>	ann.	s. d.
Saracha biflora	<i>R. et P.</i>	per.	cal.	— trigyna	<i>Mey.</i>	ann.	s. d.
— contorta	<i>R. et P.</i>	ann.	s. d.	Schoenus mucronatus	<i>L.</i>	per.	s. d.
— Jaltomata	<i>Schlecht.</i>	per.	s. d.	— nigricans	<i>L.</i>	per.	sp.
— procumbens	<i>R. et P.</i>	ann.	s. d.	Schotia speciosa	<i>Jacq.</i>	lign.	frig.
— viscosa	<i>Schrad.</i>	per.	frig.	Scilla amethystina	<i>Vis.</i>	per.	s. d.
Sarcostemma viminale	<i>R. B.</i>	lign.	cal.	— amoena	<i>L.</i>	per.	sp.
Sassafras officinale	<i>Nees</i>	lign.	s. d.	— autumnalis	<i>L.</i>	per.	sp.
Satureja hortensis	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— bifolia	<i>L.</i>	per.	sp.
— intermedia	<i>C. A. M.</i>	lign.	s. d.	— campanulata	<i>Ait.</i>	per.	s. d.
— montana	<i>L.</i>	lign.	sp.	— Cupaniana	<i>Gusson.</i>	per.	s. d.
— variegata	<i>Host</i>	lign.	s. d.	— hyacinthoides	<i>L.</i>	per.	s. d.
— mutica	<i>Fisch.</i>	lign.	s. d.	— lusitanica	<i>L.</i>	per.	frig.
— subspicata	<i>Bartl.</i>	lign.	s. d.	— maritima	<i>L.</i>	per.	s. d.
— Thymbra	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— nutans	<i>Sm.</i>	per.	s. d.
Saururus cernuus	<i>L.</i>	per.	s. d.	— obtusifolia	<i>Poir.</i>	per.	frig.
Saussurea elongata	<i>DC.</i>	per.	s. d.	— peruviana	<i>L.</i>	per.	s. d.
— pulchella	<i>Fisch.</i>	per.	s. d.	— fl. albo	<i>Hort.</i>	per.	s. d.
Saxifraga Aizoon	<i>L.</i>	per.	s. d.	— Sieboldii	<i>Zuccar.</i>	per.	frig.
— androsacea	<i>L.</i>	per.	s. d.	— undulata	<i>Desf.</i>	per.	frig.
— Burseriana	<i>L.</i>	per.	s. d.	— verna	<i>Huds.</i>	per.	s. d.
— caesia	<i>L.</i>	per.	s. d.	Scleranthus annuus	<i>L.</i>	ann.	sp.
— crassifolia	<i>L.</i>	per.	s. d.	Sclerocarpus africanus	<i>Jcq.</i>	ann.	s. d.
— hirsuta	<i>L.</i>	per.	s. d.	Scolopendrium officinarum			
— muscoides	<i>Wulf.</i>	per.	s. d.	— —	<i>Sw.</i>	per.	sp.
— moschata	<i>Wulf.</i>	per.	s. d.	— crispum	<i>W.</i>	per.	s. d.
— mutata	<i>L.</i>	per.	s. d.	— daedaleum	<i>W.</i>	per.	s. d.
— oppositifolia	<i>L.</i>	per.	s. d.	Scolymus hispanicus	<i>L.</i>	per.	sp.

<i>Scolymus maculatus</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	<i>Secale montanum</i>	<i>Gusson.</i>	per.	s. d.
<i>Scoparia dulcis</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— perenne	<i>Hort.</i>	per.	s. d.
<i>Scopolia carnioica</i>	<i>Jacq.</i>	per.	s. d.	<i>Securigera Coronilla</i>	<i>DC.</i>	ann.	s. d.
<i>Scorpiurus muricata</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	<i>Sedum acre</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— subvillosa	<i>L.</i>	per.	s. d.	— Aizoon	<i>L.</i>	per.	s. d.
— sulcata	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— album	<i>L.</i>	per.	sp.
<i>Scorzonera austriaca</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.	— altaicum	<i>Don</i>	per.	s. d.
— deliciosa	<i>Gusson.</i>	per.	s. d.	— altissimum	<i>Poir.</i>	per.	s. d.
— criosperma	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.	— ochroleucum	<i>Sm.</i>	per.	s. d.
— grandiflora	<i>Lapeyr.</i>	per.	s. d.	— atratum	<i>L.</i>	ann.	sp.
— hirsuta	<i>L.</i>	per.	s. d.	— bifidum	<i>Bieb.</i>	ann.	s. d.
— hispanica	<i>L.</i>	per.	s. d.	— caespitosum	<i>DC.</i>	ann.	s. d.
— humilis	<i>L.</i>	per.	s. d.	— calabricum	<i>Tenor.</i>	bien.	s. d.
— lanata	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.	— Cepaea	<i>L.</i>	ann.	sp.
— macrosperma	<i>Turcz.</i>	per.	s. d.	— galioides	<i>All.</i>	ann.	sp.
— nervosa	<i>Trevir.</i>	per.	s. d.	— cruciatum	<i>Desf.</i>	per.	s. d.
— parviflora	<i>Jacq.</i>	per.	s. d.	— dasyphyllum	<i>L.</i>	per.	s. d.
— purpurea	<i>L.</i>	per.	s. d.	— Forsterianum	<i>Sm.</i>	per.	s. d.
— rumicifolia	<i>Jacq. fil.</i>	per.	s. d.	— glaucum	<i>W. et K.</i>	bien.	s. d.
— taurica	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.	— hirsutum	<i>All.</i>	bien.	s. d.
— villosa	<i>Scop.</i>	per.	s. d.	— hispanicum	<i>L.</i>	per.	sp.
<i>Scrophularia aquatica</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— hybridum	<i>L.</i>	per.	s. d.
— betonicifolia	<i>L.</i>	per.	s. d.	— ibericum	<i>Stev.</i>	per.	s. d.
— biserrata	<i>W.</i>	per.	s. d.	— involucreatum	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.
— canina	<i>L.</i>	per.	sp.	— littoreum	<i>Gusson.</i>	ann.	s. d.
— pubescens	<i>Hort.</i>	per.	s. d.	— lividum	<i>W.</i>	per.	s. d.
— divaricata	<i>Bung.</i>	per.	s. d.	— maximum	<i>Reich.</i>	per.	s. d.
— grandidentata	<i>Tenor.</i>	per.	s. d.	— neglectum	<i>Tenor.</i>	per.	s. d.
— marilandica	<i>L.</i>	per.	s. d.	— oppositifolium	<i>Sims.</i>	per.	s. d.
— nodosa	<i>L.</i>	per.	sp.	— populifolium	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— obtusifolia	<i>Kit.</i>	per.	s. d.	— pulchellum	<i>Michx.</i>	per.	s. d.
— orientalis	<i>L.</i>	per.	s. d.	— reflexum	<i>L.</i>	lign.	sp.
— peregrina	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— collinum	<i>W.</i>	per.	s. d.
— rivularis	<i>Moris.</i>	per.	s. d.	— cristatum	<i>Schrd.</i>	per.	s. d.
— rupestris	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.	— Rhodiola	<i>DC.</i>	per.	s. d.
— Scopoli	<i>Hoppe.</i>	per.	s. d.	— roseum	<i>Stev.</i>	per.	s. d.
— Smithii	<i>Horn.</i>	lign.	frig.	— rubens	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— trifoliata	<i>L.</i>	per.	s. d.	— decandrum	<i>DC.</i>	ann.	s. d.
— vernalis	<i>L.</i>	bien.	s. d.	— rupestre	<i>L.</i>	per.	s. d.
<i>Scutellaria albida</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— pensylvanicum	<i>H.</i>		
— alpina	<i>L.</i>	per.	s. d.		<i>Crac.</i>	per.	s. d.
— altissima	<i>L.</i>	per.	s. d.	— sempervivoides	<i>Fsch.</i>	per.	s. d.
— canescens	<i>Nutt.</i>	per.	s. d.	— sexangulare	<i>L.</i>	per.	sp.
— galericulata	<i>L.</i>	per.	sp.	— sexfidum	<i>Bieb.</i>	ann.	s. d.
— integrifolia	<i>L.</i>	per.	s. d.	— Sieboldi	<i>Hort.</i>	per.	s. d.
— lateriflora	<i>L.</i>	per.	s. d.	— stellatum	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— lupulina	<i>L.</i>	per.	s. d.	— telephioides	<i>Michx.</i>	per.	s. d.
— macrantha	<i>Fisch.</i>	per.	s. d.	— Telephium	<i>L.</i>	per.	sp.
— orientalis	<i>L.</i>	per.	s. d.	— purpureum	<i>Lk.</i>	per.	s. d.
— pallida	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.	— fol. varieg.	<i>Hort.</i>	per.	s. d.
— peregrina	<i>L.</i>	per.	s. d.	— ternatum	<i>Michx.</i>	per.	s. d.
— polybothrya	<i>Bernh.</i>	per.	s. d.	— villosum	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— viscida	<i>Spr. fil.</i>	per.	s. d.	<i>Selago corymbosa</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.
<i>Secale cereale</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	<i>Selinum Carvifolia</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— creticum	<i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Sempervivum arachnoi-</i>			
— fragile	<i>Bieb.</i>	bien.	s. d.	— deum	<i>L.</i>	per.	sp.

<i>Sempervivum arboreum</i> <i>L.</i>	lign.	tep.	<i>Senecio umbrosus</i> <i>W. et K.</i>	per.	s. d.
— <i>purpureum</i> <i>Hort.</i>	lign.	tep.	— <i>verbenaeifolius</i> <i>Jacq.</i>	ann.	s. d.
— <i>variegatum</i> <i>Hort.</i>	lign.	tep.	— <i>vernalis</i> <i>W. et K.</i>	ann.	s. d.
— <i>barbatum</i> <i>C. Sm.</i>	lign.	tep.	— <i>viscosus</i> <i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>arboreum</i> <i>H. Fnd.</i>	lign.	tep.	— <i>vulgaris</i> <i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>hybridum</i> <i>Salm.</i>	lign.	tep.	<i>Serapias Lingua</i> <i>L.</i>	per.	sp.
— <i>canariense</i> <i>L.</i>	lign.	tep.	— <i>longipetala</i> <i>Polln.</i>	per.	sp.
— <i>subtabulaeforme</i>			<i>Serissa foetida</i> <i>Commers.</i>	lign.	frig.
— <i>Salm.</i>	lign.	tep.	<i>Serratula coronata</i> <i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>ciliatum</i> <i>Brouss.</i>	lign.	tep.	— <i>heterophylla</i> <i>Desf.</i>	per.	s. d.
— <i>flagelliforme</i> <i>Fisch.</i>	per.	s. d.	— <i>nudicaulis</i> <i>DC.</i>	per.	s. d.
— <i>globiferum</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>radiata</i> <i>Bieb.</i>	per.	s. d.
— <i>glutinosum</i> <i>Ait.</i>	lign.	tep.	— <i>tinctoria</i> <i>L.</i>	per.	sp.
— <i>hirtum</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>arguta</i> <i>Fisch.</i>	per.	s. d.
— <i>molle</i> <i>Vis.</i>	bien.	tep.	— <i>indivisa</i> <i>Poir.</i>	per.	sp.
— <i>monanthum</i> <i>Ait.</i>	per.	tep.	<i>Sesbania aculeata</i> <i>Pers.</i>	ann.	s. d.
— <i>tectorum</i> <i>L.</i>	per.	sp.	— <i>exasperata</i> <i>Humb.</i>	per.	cal.
— <i>tortuosum</i> <i>Ait.</i>	per.	tep.	— <i>fusca</i> <i>Desf.</i>	ann.	s. d.
— <i>uribicum</i> <i>Lindl.</i>	lign.	tep.	<i>Scaseli annuum</i> <i>L.</i>	bien.	sp.
<i>Senebiera Coronopus</i> <i>Poir.</i>	ann.	sp.	— <i>dichotomum</i> <i>Bieb.</i>	per.	s. d.
— <i>didyma</i> <i>Pers.</i>	ann.	s. d.	— <i>globiferum</i> <i>Vis.</i>	per.	s. d.
<i>Senecio abrotanifolius</i> <i>L.</i>	per.	sp.	— <i>gracile</i> <i>W. et K.</i>	per.	s. d.
— <i>adenotrichius</i> <i>DC.</i>	lign.	frig.	— <i>gummiferum</i> <i>Sm.</i>	bien.	s. d.
— <i>ambiguus</i> <i>DC.</i>	lign.	s. d.	— <i>Hippomarathrum</i> <i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>ceratophyllus</i> <i>Ten.</i>	lign.	s. d.	— <i>leucospermum</i> <i>W. K.</i>	per.	s. d.
— <i>aquaticus</i> <i>Huds.</i>	per.	s. d.	— <i>Pallasii</i> <i>Bess.</i>	per.	s. d.
— <i>arabicus</i> <i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>tomentosum</i> <i>Vis.</i>	per.	s. d.
— <i>arachnoideus</i> <i>Sieb.</i>	per.	s. d.	— <i>varium</i> <i>Trevir.</i>	per.	s. d.
— <i>chrysanthemifolius</i>			<i>Sealeria coerulea</i> <i>Arduin.</i>	per.	sp.
— <i>Poir.</i>	ann.	s. d.	— <i>cylindrica</i> <i>DC.</i>	per.	s. d.
— <i>Cineraria</i> <i>DC.</i>	lign.	s. d.	— <i>virgata</i> <i>H. Prag.</i>	per.	s. d.
— <i>cruentus</i> <i>DC.</i>	per.	tep.	<i>Sesuvium longifolium</i> <i>Humb.</i>	ann.	s. d.
— <i>grandiflorus</i> <i>Hort.</i>	per.	tep.	— <i>revolutifolium</i> <i>Orteg.</i>	per.	cal.
— <i>Kingii</i> <i>Hort.</i>	per.	tep.	<i>Setaria glauca</i> <i>Beauv.</i>	ann.	sp.
— <i>Watherousianus</i>			— <i>italica</i> <i>Beauv.</i>	ann.	sp.
— <i>Hort.</i>	per.	tep.	— <i>verticillata</i> <i>Beauv.</i>	ann.	sp.
— <i>discolor</i> <i>DC.</i>	lign.	tep.	— <i>viridis</i> <i>Beauv.</i>	ann.	sp.
— <i>Doria</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Shepherdia canadensis</i> <i>Nutt.</i>	lign.	s. d.
— <i>Doronicum</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Sherardia arvensis</i> <i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>erraticus</i> <i>Bertol.</i>	per.	sp.	<i>Sicyos angulata</i> <i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>erucaefolius</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>Baderoa</i> <i>Hook.</i>	ann.	s. d.
— <i>tenuifolius</i> <i>Jacq.</i>	per.	s. d.	<i>Sida Abutilon</i> <i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>flammeus</i> <i>DC.</i>	per.	s. d.	— <i>asiatica</i> <i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>gibbosus</i> <i>DC.</i>	lign.	s. d.	— <i>atropurpurea</i> <i>Blum.</i>	lign.	cal.
— <i>Jacobaea</i> <i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>aurita</i> <i>Wall.</i>	lign.	cal.
— <i>ilicifolius</i> <i>Thunb.</i>	per.	frig.	— <i>carpinifolia</i> <i>L. fil.</i>	lign.	cal.
— <i>ilacinus</i> <i>Link.</i>	lign.	frig.	— <i>cordifolia</i> <i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>lycopifolius</i> <i>Desf.</i>	per.	s. d.	— <i>crenatiflora</i> <i>Pers.</i>	ann.	s. d.
— <i>paludosus</i> <i>L.</i>	per.	sp.	— <i>crispa</i> <i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>Petasites</i> <i>DC.</i>	lign.	tep.	— <i>cuneifolia</i> <i>Tenor.</i>	lign.	cal.
— <i>populifolius</i> <i>DC.</i>	lign.	tep.	— <i>hernandioides</i> <i>Herit.</i>	lign.	cal.
— <i>praecaltus</i> <i>Bertol.</i>	per.	sp.	— <i>heterosperma</i> <i>Vis.</i>	lign.	cal.
— <i>praecox</i> <i>DC.</i>	lign.	tep.	— <i>mollis</i> <i>Orteg.</i>	lign.	cal.
— <i>Pseudo-elegans</i> <i>Less.</i>	per.	tep.	— <i>Napaea</i> <i>Cav.</i>	lign.	s. d.
— <i>rupestris</i> <i>W. et K.</i>	ann.	s. d.	— <i>nutans</i> <i>Herit.</i>	lign.	cal.
— <i>sinuatilobus</i> <i>DC.</i>	lign.	tep.	— <i>occidentalis</i> <i>L.</i>	ann.	s. d.

<i>Sida periptera</i>	<i>Sims</i>	lign.	cal.	<i>Silene livida</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.
— permollis	<i>W.</i>	lign.	cal.	— longicaulis	<i>Pourr.</i>	ann.	s. d.
— populifolia	<i>Lam.</i>	ann.	s. d.	— longiflora	<i>Ehrh.</i>	per.	s. d.
— Sellowiana	<i>H. Berol.</i>	lign.	cal.	— marginata	<i>Schott.</i>	per.	frig.
— Sonneratiana	<i>Cav.</i>	ann.	s. d.	— multiflora	<i>Pers.</i>	ann.	s. d.
— spinosa	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— muscipula	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— tiliaefolia	<i>Fisch.</i>	ann.	s. d.	— nemoralis	<i>W. et K.</i>	bien.	s. d.
— triloba	<i>Thunb.</i>	per.	frig.	— nicaeensis	<i>All.</i>	ann.	s. d.
— triquetra	<i>L.</i>	lign.	cal.	— nocturna	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— ulmifolia	<i>Cav.</i>	lign.	cal.	— nutans	<i>L.</i>	per.	sp.
— umbellata	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— obtusifolia	<i>W.</i>	ann.	s. d.
— vesicaria	<i>Cav.</i>	lign.	cal.	— Otites	<i>Pers.</i>	per.	sp.
— virgata	<i>Cav.</i>	lign.	cal.	— pachyphylla	<i>H. Ber.</i>	ann.	s. d.
<i>Sideritis hirsuta</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— paradoxa	<i>L.</i>	per.	s. d.
— libanotica	<i>Labill.</i>	lign.	frig.	— pendula	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— montana	<i>L.</i>	per.	sp.	— petraea	<i>W. et K.</i>	per.	s. d.
— pyrenaica	<i>Poir.</i>	per.	s. d.	— pilosa	<i>Spr.</i>	bien.	s. d.
— romana	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— portensis	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— scordioides	<i>L.</i>	per.	s. d.	— Pseudotites	<i>Bess.</i>	per.	s. d.
— — hirsuta	<i>Lam.</i>	per.	s. d.	— repens	<i>Patrin.</i>	per.	s. d.
— sicula	<i>Ucria</i>	per.	s. d.	— reticulata	<i>Desf.</i>	ann.	s. d.
— spinosa	<i>Lam.</i>	per.	s. d.	— saponariaefolia	<i>Scht.</i>	ann.	s. d.
— taurica	<i>W.</i>	lign.	s. d.	— saxatilis	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.
<i>Siegesbeckia flosculosa</i>	<i>Hrit.</i>	ann.	s. d.	— Saxifraga	<i>L.</i>	per.	sp.
— orientalis	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— sericea	<i>All.</i>	ann.	sp.
<i>Silene Besseri</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.	— spergulaefolia	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.
— longifolius	<i>Ledeb.</i>	per.	s. d.	— stylosa	<i>Bung.</i>	per.	s. d.
— macrocarpus	<i>Rehb.</i>	per.	s. d.	— suavis	<i>Schrad.</i>	ann.	s. d.
— pratensis	<i>Bess.</i>	per.	s. d.	— subvinosa	<i>Delil.</i>	ann.	s. d.
— tenuifolius	<i>DC.</i>	per.	s. d.	— tatarica	<i>Pers.</i>	per.	s. d.
<i>Silene acaulis</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— tenuis	<i>W.</i>	per.	s. d.
— altaica	<i>Ledeb.</i>	per.	s. d.	— vallesia	<i>L.</i>	per.	s. d.
— apetala	<i>W.</i>	ann.	s. d.	— — caucasica	<i>Hort.</i>	per.	s. d.
— aprica	<i>Turcz.</i>	ann.	s. d.	— velutina	<i>Pourr.</i>	per.	s. d.
— Armeria	<i>L.</i>	ann.	sp.	— vespertina	<i>Retz.</i>	ann.	s. d.
— blanda	<i>Reichb.</i>	ann.	s. d.	— viscosa	<i>Pers.</i>	bien.	s. d.
— bupleuroides	<i>L.</i>	per.	frig.	— Zavadzki	<i>Herb.</i>	per.	s. d.
— cerastoides	<i>L.</i>	ann.	sp.	<i>Silphium perfoliatum</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— compacta	<i>Horn.</i>	bien.	s. d.	— terebinthinaceum	<i>L.</i>	per.	s. d.
— conica	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— —	<i>fil.</i>	per.	s. d.
— cretica	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— ternatum	<i>Retz.</i>	per.	s. d.
— decumbens	<i>Bivon.</i>	ann.	s. d.	— — atropurpureum	<i>Retz.</i>	per.	s. d.
— dichotoma	<i>Ehrh.</i>	ann.	s. d.	<i>Silybum marianum</i>	<i>Gaertn.</i>	ann.	sp.
— funbriata	<i>Sims</i>	per.	s. d.	<i>Sinapis alba</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— flavescens	<i>W. et K.</i>	per.	s. d.	— arvensis	<i>L.</i>	ann.	sp.
— fruticosa	<i>L.</i>	lign.	frig.	— assurgens	<i>Delil.</i>	ann.	s. d.
— gallica	<i>L.</i>	ann.	sp.	— dissecta	<i>Lagasc.</i>	ann.	s. d.
— gigantea	<i>L.</i>	bien.	frig.	— hispida	<i>Schousb.</i>	ann.	s. d.
— graeca	<i>Zuccar.</i>	bien.	s. d.	— incana	<i>L.</i>	bien.	s. d.
— halopetala	<i>Ledeb.</i>	ann.	s. d.	— juncea	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— hispida	<i>Desf.</i>	ann.	s. d.	— laevigata	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— inaperta	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— nigra	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— inflata	<i>Sm.</i>	per.	sp.	<i>Siphocampylus bicolor</i>	<i>G.</i>	lign.	s. d.
— — maritima	<i>With.</i>	per.	s. d.	— spicatus	<i>H. Cels.</i>	lign.	tep.
— italica	<i>Pers.</i>	per.	sp.				
— juvenalis	<i>Delil.</i>	ann.	s. d.				

<i>Sison Amomum</i>	<i>L.</i>	bien.	sp.	<i>Solanum elaeagnifolium</i>	<i>Cav.</i>	lign.	frig.
<i>Sisymbrium austriacum</i>	<i>Jacq.</i>	bien.	s. d.	— <i>esculentum</i>	<i>Dun.</i>	ann.	s. d.
— <i>bursifolium</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>etuberosum</i>	<i>Lindl.</i>	per.	frig.
— <i>canescens</i>	<i>Nutt.</i>	ann.	s. d.	— <i>fastigiatum</i>	<i>W.</i>	lign.	frig.
— <i>Columnae</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>fuscatum</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>fugax</i>	<i>Lagasc.</i>	per.	s. d.	— <i>giganteum</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	frig.
— <i>Irio</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>Gilò</i>	<i>Raddi</i>	ann.	s. d.
— <i>Loeselii</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>glaberrimum</i>	<i>Dun.</i>	lign.	frig.
— <i>millefolium</i>	<i>Ait.</i>	lign.	frig.	— <i>glaucophyllum</i>	<i>Desf.</i>	lign.	frig.
— <i>— quadrilobum</i>	<i>H. Pt.</i>	lign.	frig.	— <i>gracile</i>	<i>Otto</i>	per.	frig.
— <i>officinale</i>	<i>Scop.</i>	ann.	sp.	— <i>grandiflorum</i>	<i>R. et P.</i>	lign.	tep.
— <i>pannonicum</i>	<i>Jacq.</i>	ann.	s. d.	— <i>heterophyllum</i>	<i>Lam.</i>	lign.	tep.
— <i>polyceratum</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>indicum</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>Sophia</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>lanceolatum</i>	<i>Cav.</i>	lign.	frig.
— <i>taraxacifolium</i>	<i>DC.</i>	bien.	s. d.	— <i>Lichtensteinii</i>	<i>W.</i>	lign.	frig.
<i>Sisyrinchium anceps</i>	<i>Lam.</i>	per.	s. d.	— <i>lycioides</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.
— <i>Bermudiana</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>macrocarpum</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.
— <i>californicum</i>	<i>Spr.</i>	per.	s. d.	— <i>marginatum</i>	<i>L. fil.</i>	lign.	frig.
— <i>chilense</i>	<i>Hook.</i>	per.	s. d.	— <i>miniatum</i>	<i>Bernh.</i>	ann.	sp.
— <i>convolutum</i>	<i>Nocca</i>	per.	s. d.	— <i>monodynamum</i>	<i>Vis.</i>	lign.	frig.
— <i>iridifolium</i>	<i>Humb.</i>	per.	s. d.	— <i>nigrum</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>striatum</i>	<i>Sm.</i>	per.	s. d.	— <i>nodiflorum</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	frig.
— <i>sulphureum</i>	<i>H. Paris</i>	per.	s. d.	— <i>ovigerum</i>	<i>Dun.</i>	ann.	s. d.
— <i>tenuifolium</i>	<i>Humb.</i>	per.	frig.	— <i>persicum</i>	<i>W.</i>	lign.	s. d.
<i>Sium angustifolium</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>Pseudocapsicum</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.
— <i>latifolium</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>pteroaulon</i>	<i>Dun.</i>	ann.	s. d.
<i>Smilacina bifolia</i>	<i>Ker.</i>	per.	s. d.	— <i>pyracanthum</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	frig.
— <i>racemosa</i>	<i>Desf.</i>	per.	s. d.	— <i>racemiflorum</i>	<i>Dun.</i>	ann.	s. d.
— <i>stellata</i>	<i>Desf.</i>	per.	s. d.	— <i>rostratum</i>	<i>Dun.</i>	ann.	s. d.
<i>Smilax aspera</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>sanctum</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.
— <i>— angustifolia</i>	<i>H. Pt.</i>	lign.	s. d.	— <i>spinosissimum</i>	<i>Lodd.</i>	lign.	frig.
— <i>Pseudosarsa</i>	<i>Vis.</i>	lign.	s. d.	— <i>suffruticosum</i>	<i>Schsb.</i>	lign.	frig.
— <i>rotundifolia</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>Thonningianum</i>	<i>Jacq. fil.</i>	lign.	frig.
<i>Smyrniolum Olusatrum</i>	<i>L.</i>	bien.	sp.	— <i>torvum</i>	<i>Sw.</i>	lign.	frig.
— <i>perfoliatum</i>	<i>L.</i>	bien.	s. d.	— <i>triquetrum</i>	<i>Cav.</i>	lign.	frig.
<i>Sogalgina trilobata</i>	<i>Cass.</i>	ann.	s. d.	— <i>Trongum</i>	<i>Poir.</i>	per.	frig.
<i>Soja hispida</i>	<i>Moench</i>	ann.	s. d.	— <i>tuberosum</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
<i>Solandra grandiflora</i>	<i>Sw.</i>	lign.	cal.	— <i>verbascifolium</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.
— <i>guttata</i>	<i>Don</i>	lign.	cal.	— <i>verrucosum</i>	<i>Schlecht</i>	lign.	frig.
<i>Solanum aethiopicum</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>Vespertilio</i>	<i>Ait.</i>	lign.	frig.
— <i>argenteum</i>	<i>Dun.</i>	lign.	tep.	— <i>villosum</i>	<i>Lam.</i>	ann.	s. d.
— <i>asperum</i>	<i>Vahl</i>	lign.	frig.	— <i>Zuccagnianum</i>	<i>Dun.</i>	ann.	s. d.
— <i>astroites</i>	<i>Jacq.</i>	ann.	s. d.	<i>Soldanella alpina</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>atropurpureum</i>	<i>Shrk</i>	lign.	tep.	— <i>pusilla</i>	<i>Baumg.</i>	per.	s. d.
— <i>Balbisi</i>	<i>Dun.</i>	per.	tep.	<i>Solea verticillata</i>	<i>Spr.</i>	per.	frig.
— <i>betaceum</i>	<i>Cav.</i>	lign.	frig.	<i>Solidago altissima</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>bonariense</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.	— <i>arguta</i>	<i>Ait.</i>	per.	s. d.
— <i>campechiense</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.	— <i>canadensis</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>ciliatum</i>	<i>Lam.</i>	per.	frig.	— <i>complanata</i>	<i>H. Prag.</i>	per.	s. d.
— <i>cinereum</i>	<i>R. Br.</i>	ann.	s. d.	— <i>confertiflora</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.
— <i>coagulans</i>	<i>Forsk.</i>	lign.	tep.	— <i>fragrans</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.
— <i>coccineum</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	frig.	— <i>lanceolata</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.
— <i>coriaceum</i>	<i>Dun.</i>	lign.	frig.	— <i>latifolia</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>diphyllum</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.	— <i>limonifolia</i>	<i>Pers.</i>	per.	s. d.
— <i>Dulcamara</i>	<i>L.</i>	lign.	sp.	— <i>lithospermifolia</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.
— <i>littorale</i>	<i>Lk.</i>	lign.	s. d.				

<i>Solidago macrophylla</i> Prsh	per.	s. d.	<i>Spigelia marilandica</i> L.	per.	s. d.
— nutans Desf	per.	s. d.	<i>Spilanthes Acmella</i> L.	ann.	s. d.
— recurvata W.	per.	s. d.	— oleracea L.	ann.	s. d.
— rigida L.	per.	s. d.	— repens Michx	per.	s. d.
— rugosa Mill	per.	s. d.	<i>Spinacia glabra</i> Mill	ann.	s. d.
— sempervirens L.	per.	s. d.	— spinosa Moench	ann.	s. d.
— serotina Ait.	per.	s. d.	<i>Spiraea argentea</i> L. fil.	lign.	tep.
— ulnifolia Mühlb.	per.	s. d.	— Aruncus L.	per.	s. d.
— undulata H. Prag.	per.	s. d.	— bella Sims	lign.	frig.
— virgata Michx	per.	s. d.	— caua W. et K.	lign.	s. d.
— Virgaurea L.	per.	sp.	— corymbosa Rafn.	lign.	s. d.
<i>Sonchus arvensis</i> L.	per.	sp.	— crenata L.	lign.	s. d.
— asper Vill.	ann.	sp.	— filipendula L.	per.	sp.
— ciliatus Lam.	ann.	sp.	— flexuosa Fisch.	lign.	s. d.
— laevigatus W.	lign.	frig.	— hypericifolia L.	lign.	s. d.
— longifolius Trevir.	ann.	s. d.	— laevigata L.	lign.	s. d.
— maritimus L.	per.	s. d.	— lobata Murr.	per.	s. d.
— palustris L.	per.	sp.	— oblongifolia W. et K.	lign.	s. d.
<i>Sophora alopecuroides</i> L.	per.	s. d.	— opulifolia L.	lign.	s. d.
— flavesceus Ait.	per.	s. d.	— pannonica Hort.	lign.	s. d.
— japonica L.	lign.	s. d.	— salicifolia L.	lign.	s. d.
— pendula Hort.	lign.	s. d.	— — carnea Hort.	lign.	s. d.
— tomentosa L.	lign.	frig.	— sorbifolia L.	lign.	s. d.
<i>Sorghum caffrorum</i> Beauv.	ann.	s. d.	— tomentosa L.	lign.	s. d.
— cernuum W.	ann.	s. d.	— triloba L.	lign.	s. d.
— halepense Pers.	per.	sp.	— Ulmaria L.	per.	sp.
— saccharatum Mnch	ann.	s. d.	<i>Spiranthes autumnalis</i> Rich.	per.	sp.
— vulgare Pers.	ann.	s. d.	<i>Sponia crassifolia</i> G. Don	lign.	s. d.
<i>Spadostyles linoides</i> H. Hügl.	lign.	frig.	<i>Stachys angustifolia</i> Bieb.	per.	s. d.
<i>Spananthe paniculata</i> Jacq.	ann.	s. d.	— annua L.	ann.	s. d.
<i>Sparaxis bulbifera</i> Ker	per.	frig.	— arenaria Vahl	per.	s. d.
— grandiflora Ker	per.	frig.	— arvensis L.	ann.	sp.
— tricolor Ker	per.	frig.	— circinata Herit.	lign.	s. d.
<i>Sparganium ramosum</i> Sm.	per.	sp.	— coerulea Burch.	per.	frig.
<i>Sparmannia africana</i> L.	lign.	frig.	— decumbens Pers.	per.	s. d.
<i>Spartianthus junceus</i> Link	lign.	sp.	— densiflora Benth.	per.	s. d.
<i>Spartina cynosuroides</i> W.	per.	s. d.	— germanica L.	per.	sp.
<i>Specularia biflora</i> F. et M.	ann.	s. d.	— hirta L.	per.	s. d.
— cordata Vis.	ann.	s. d.	— intermedia Ait.	per.	s. d.
— falcata DC. fil.	ann.	s. d.	— italica Mill.	per.	s. d.
— hybrida DC.	ann.	sp.	— lavandulaefolia Vhl	per.	s. d.
— pentagonia DC.	ann.	s. d.	— menthaefolia Vis.	per.	s. d.
— perfoliata DC.	ann.	s. d.	— palaestina L.	lign.	frig.
— Speculum DC.	ann.	sp.	— palustris L.	per.	sp.
<i>Spergula arvensis</i> L.	ann.	sp.	— — ambigua Sm.	per.	sp.
— glabra W.	per.	s. d.	— pubescens Tenor.	per.	s. d.
— nodosa L.	per.	s. d.	— ramosissima Rochel	per.	sp.
<i>Spermacoce hispida</i> L.	ann.	s. d.	— recta L.	per.	sp.
— tenuior L.	ann.	s. d.	— sericea Wall.	per.	s. d.
<i>Spermadietyon scabrum</i> Spr.	lign.	frig.	— setifera C. A. Mey.	per.	s. d.
<i>Sphaeranthus senegalensis</i> DC.	ann.	s. d.	— sylvatica L.	per.	sp.
<i>Sphallerocarpus Cyminum</i> Bess.	ann.	s. d.	<i>Stachytarpheta aristata</i> Vhl	lign.	cal.
<i>Spigelia Anthelmia</i> L.	ann.	s. d.	— jamaicensis Vahl	ann.	s. d.
			— mutabilis Vahl	lign.	cal.
			— orubica Vahl	lign.	cal.
			— prismatica Vahl	bien.	cal.

<i>Stanhopea insignis</i>	<i>Hook.</i>	per.	cal.	<i>Statice scoparia</i>	<i>Pall.</i>	per.	s. d.
— <i>ugrion</i>	<i>Bathem.</i>	per.	cal.	— <i>sinuata</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
<i>Stapelia ambigua</i>	<i>Mass.</i>	lign.	frig.	— <i>Smithii</i>	<i>Tenor.</i>	per.	s. d.
— <i>anguinea</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	frig.	— <i>speciosa</i>	<i>L.</i>	bien.	s. d.
— <i>bisulca</i>	<i>Don.</i>	lign.	frig.	— <i>tatarica</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>brevirostris</i>	<i>W.</i>	lign.	frig.	— <i>Thouini</i>	<i>Pivian.</i>	bien.	frig.
— <i>bufonia</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	frig.	— <i>virgata</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.
— <i>caespitosa</i>	<i>Mass.</i>	lign.	frig.	<i>Stellaria graminea</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>ciliata</i>	<i>Thunb.</i>	lign.	frig.	— <i>Holostea</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>clypeata</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	frig.	— <i>media</i>	<i>Vill.</i>	ann.	s. d.
— <i>conspurcata</i>	<i>W.</i>	lign.	frig.	— <i>nemorum</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>deflexa</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	frig.	— <i>scapigera</i>	<i>Ait.</i>	per.	s. d.
— <i>divaricata</i>	<i>Mass.</i>	lign.	frig.	— <i>uliginosa</i>	<i>Murr.</i>	ann.	s. d.
— <i>europaea</i>	<i>Gusson.</i>	lign.	frig.	— <i>viscida</i>	<i>Bieb.</i>	bien.	sp.
— <i>fuscata</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	frig.	<i>Stemodia chilensis</i>	<i>Benth.</i>	per.	frig.
— <i>glauca</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	frig.	<i>Stenactis annua</i>	<i>Cass.</i>	ann.	sp.
— <i>grandiflora</i>	<i>Mass.</i>	lign.	frig.	<i>Stephanotis floribunda</i>	<i>Dec.</i>	lign.	cal.
— <i>hamata</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	frig.	<i>Sterculia diversifolia</i>	<i>G. Don.</i>	lign.	frig.
— <i>hirsuta</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.	<i>Sternbergia lutea</i>	<i>Ker.</i>	per.	s. d.
— <i>hirtella</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	frig.	<i>Stevia conferta</i>	<i>DC.</i>	per.	frig.
— <i>maculosa</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	frig.	— <i>Eupatoria</i>	<i>W.</i>	per.	frig.
— <i>marmorata</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	frig.	— <i>glandulifera</i>	<i>Schlecht.</i>	per.	frig.
— <i>mixta</i>	<i>Mass.</i>	lign.	frig.	— <i>laxiflora</i>	<i>DC.</i>	per.	frig.
— <i>normalis</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	frig.	— <i>mollis</i>	<i>Schrad.</i>	per.	frig.
— <i>obliqua</i>	<i>W.</i>	lign.	frig.	— <i>monardaefolia</i>	<i>Hmb.</i>	per.	frig.
— <i>picta</i>	<i>Don.</i>	lign.	frig.	— <i>ovata</i>	<i>Lagasc.</i>	per.	frig.
— <i>planiflora</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	frig.	— <i>purpurea</i>	<i>Pers.</i>	per.	frig.
— <i>pulchella</i>	<i>Mass.</i>	lign.	frig.	— <i>rhombifolia</i>	<i>Humb.</i>	per.	frig.
— <i>reflexa</i>	<i>Haw.</i>	lign.	frig.	— <i>serrata</i>	<i>Cav.</i>	per.	frig.
— <i>replicata</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	frig.	— <i>suaveolens</i>	<i>Lagasc.</i>	per.	frig.
— <i>revoluta</i>	<i>Mass.</i>	lign.	frig.	<i>Stillingia sebifera</i>	<i>Michx.</i>	lign.	frig.
— <i>roriflua</i>	<i>Jacq.</i>	lign.	frig.	<i>Stipa altaica</i>	<i>Trin.</i>	per.	s. d.
— <i>rufa</i>	<i>Mass.</i>	lign.	frig.	— <i>Aristella</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>Sororia</i>	<i>Mass.</i>	lign.	frig.	— <i>Calamagrostis</i>	<i>Whlbrg.</i>	per.	s. d.
— <i>variegata</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.	— <i>capillata</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>verrucosa</i>	<i>Mass.</i>	lign.	frig.	— <i>gigantea</i>	<i>Lagasc.</i>	per.	s. d.
<i>Staphylea pinnata</i>	<i>L.</i>	lign.	sp.	— <i>pennata</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>trifolia</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>pubescens</i>	<i>R. Br.</i>	per.	s. d.
<i>Statice aegyptiaca</i>	<i>Pers.</i>	per.	frig.	— <i>splendens</i>	<i>Trin.</i>	per.	s. d.
— <i>bellidifolia</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.	— <i>tortilis</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>Besseriiana</i>	<i>Schult.</i>	per.	s. d.	<i>Stratiotes Aloides</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>caspia</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.	<i>Strelitzia humilis</i>	<i>Hort.</i>	per.	frig.
— <i>cordata</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>Reginae</i>	<i>Ait.</i>	per.	frig.
— <i>cuneata</i>	<i>Hort.</i>	per.	s. d.	<i>Streptocarpus Rexii</i>	<i>Lindl.</i>	per.	frig.
— <i>Echinus</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Strobilanthes Sabiniana</i>	<i>Nes.</i>	lign.	cal.
— <i>globulariaefolia</i>	<i>Dsf.</i>	per.	s. d.	<i>Strophanthus dichotomus</i>	<i>DC.</i>	lign.	cal.
— <i>graminaifolia</i>	<i>Ait.</i>	per.	s. d.	<i>Stylidium adnatum</i>	<i>R. Br.</i>	per.	s. d.
— <i>incana</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Styphelia Gnidium</i>	<i>Vent.</i>	lign.	frig.
— <i>lanceolata</i>	<i>Link.</i>	per.	s. d.	<i>Styrax officinale</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.
— <i>latifolia</i>	<i>Sm.</i>	per.	s. d.	<i>Succisa alpina</i>	<i>Spr.</i>	per.	s. d.
— <i>Limonium</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>joppica</i>	<i>Spr.</i>	ann.	s. d.
— <i>monopetala</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>leucantha</i>	<i>Spr.</i>	per.	s. d.
— <i>oblongifolia</i>	<i>H. Crac.</i>	per.	s. d.	— <i>pratensis</i>	<i>Moench.</i>	per.	sp.
— <i>olacaeifolia</i>	<i>Pourr.</i>	per.	s. d.	— <i>transylvanica</i>	<i>Spr.</i>	ann.	s. d.
— <i>primulaefolia</i>	<i>H. Bon.</i>	per.	s. d.				
— <i>reticulata</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.				

<i>Succowia balearica</i> DC.	ann.	s. d.	<i>Tarchonanthus camphora-</i>	lign.	frig.
<i>Suffrenia filiformis</i> Bellard.	ann.	sp.	<i>tus L.</i>	lign.	s. d.
<i>Sutherlandia frutescens</i> R. B.	lign.	frig.	<i>Taxodium distichum</i> Rich.	lign.	s. d.
<i>Swainsonia coronillaefolia</i>			— — <i>crispum</i> Hort.	lign.	s. d.
Salisb.	lign.	frig.	— <i>sinense</i> H. Pat.	lign.	s. d.
<i>Swietenia Mahagoni</i> L.	lign.	cal.	<i>Taxus baccata</i> L.	lign.	s. d.
<i>Symphoricarpos montanus</i>			— <i>hibernica</i> Hook.	lign.	s. d.
Humb.	lign.	s. d.	<i>Tecoma australis</i> R. Br.	lign.	frig.
— <i>racemosus</i> Michx.	lign.	s. d.	— <i>capensis</i> G. Don.	lign.	frig.
— <i>vulgaris</i> Michx.	lign.	s. d.	— <i>stans</i> Juss.	lign.	frig.
<i>Symphytum asperillum</i>			<i>Teesdalia nudicaulis</i> R. Rr.	ann.	s. d.
Bieb.	per.	s. d.	— <i>petraea</i> Reichb.	ann.	s. d.
— <i>bulbosum</i> Schimp.	per.	sp.	<i>Telekia cordifolia</i> DC.	per.	s. d.
— <i>caucasicum</i> Bieb.	per.	s. d.	<i>Telephium Imperati</i> L.	per.	s. d.
— <i>officinale</i> L.	per.	sp.	<i>Tellima grandiflora</i> Lindl.	per.	s. d.
— <i>purpureum</i> Pers.	per.	s. d.	<i>Templetonia retusa</i> R. Br.	lign.	frig.
— <i>orientale</i> L.	per.	s. d.	<i>Tephrosia biflora</i> DC.	lign.	frig.
— <i>tauricum</i> W.	per.	s. d.	— <i>cinerea</i> Pers.	ann.	s. d.
— <i>tuberosum</i> L.	per.	sp.	— <i>pusilla</i> Pers.	per.	frig.
<i>Syncephalanthia decipiens</i>			<i>Tetragonia echinata</i> Ait.	ann.	s. d.
Bartl.	ann.	s. d.	— <i>expansa</i> Ait.	ann.	s. d.
<i>Synedrella nodiflora</i> Gärtn.	ann.	s. d.	— <i>fruticosa</i> L.	lign.	frig.
<i>Syringa chinensis</i> W.	lign.	s. d.	<i>Tetragonolobus biflorus</i> Ser.	ann.	s. d.
— <i>grandiflora</i> Hort.	lign.	s. d.	— <i>conjugatus</i> Link.	ann.	s. d.
— <i>persica</i> L.	lign.	s. d.	— <i>purpureus</i> Moench.	ann.	s. d.
— <i>laciniata</i> Hort.	lign.	s. d.	— <i>Requieni</i> Fisch.	ann.	s. d.
— <i>varina</i> Dumont.	lign.	s. d.	— <i>siliquosus</i> Roth.	per.	sp.
— <i>vulgaris</i> L.	lign.	s. d.	<i>Tetraphyle lycopodioides</i>		
Tabernaemontana coronaria			Echl.	lign.	frig.
W.	lign.	cal.	<i>Tetrapoma barbareaefolium</i>		
<i>Tagetes coronopifolia</i> W.	ann.	s. d.	Turcz.	ann.	s. d.
— <i>daucoides</i> Schrad.	ann.	s. d.	<i>Teucrium abutiloides</i> Herit.	lign.	frig.
— <i>erecta</i> L.	ann.	s. d.	— <i>Arduini</i> L.	per.	s. d.
— <i>foetidissima</i> Sweet.	ann.	s. d.	— <i>betonicum</i> Herit.	lign.	frig.
— <i>glandulifera</i> Schrk.	ann.	s. d.	— <i>Botrys</i> L.	ann.	sp.
— <i>lucida</i> Cav.	lign.	frig.	— <i>cauam</i> F. et M.	per.	s. d.
— <i>patula</i> L.	ann.	s. d.	— <i>capitatum</i> L.	per.	s. d.
— <i>signata</i> Bartl.	ann.	s. d.	— <i>Chamaedrys</i> L.	per.	sp.
<i>Talinum cuneifolium</i> W.	lign.	tep.	— <i>cubense</i> L.	per.	frig.
— <i>patens</i> W.	lign.	tep.	— <i>euganeum</i> Vis.	per.	sp.
— <i>purpureum</i> Fisch.	ann.	s. d.	— <i>flavum</i> L.	per.	frig.
— <i>revolutum</i> Humb.	ann.	s. d.	— <i>fruticans</i> L.	per.	frig.
<i>Tamarindus indica</i> L.	lign.	cal.	— <i>hyrcanicum</i> L.	per.	s. d.
<i>Tamarix gallica</i> L.	lign.	s. d.	— <i>lucidum</i> L.	lign.	frig.
<i>Tamus communis</i> L.	per.	sp.	— <i>lusitanicum</i> Lam.	per.	frig.
<i>Tanacetum boreale</i> Fisch.	per.	s. d.	— <i>Marum</i> L.	lign.	frig.
— <i>pauciflorum</i> Richds.	ann.	s. d.	— <i>montanum</i> Mill.	per.	sp.
— <i>praecox</i> Fisch.	ann.	s. d.	— <i>supinum</i> L.	per.	sp.
— <i>vulgare</i> L.	per.	sp.	— <i>multiflorum</i> L.	per.	frig.
<i>Tapina barbata</i> Mart.	per.	cal.	— <i>orientale</i> L.	per.	s. d.
<i>Taraxacum armenium</i> Fisch.	per.	s. d.	— <i>Polium</i> L.	per.	s. d.
— <i>corniculatum</i> DC.	per.	s. d.	— <i>Pseudoscorodonia</i>		
— <i>dens leonis</i> Desf.	per.	sp.	Desf.	per.	s. d.
— <i>glaucescens</i> Reichb.	per.	s. d.	— <i>regium</i> Schreb.	lign.	frig.
— <i>palustre</i> DC.	per.	s. d.	— <i>scordioides</i> Schreb.	per.	s. d.
			— <i>Scordium</i> L.	per.	sp.

Teucrium Scorodonia	L.	per.	s. d.	Thomasia solanacea	Gay	lign.	frig.
— spinosum	L.	ann.	s. d.	Thrinicia hirta	DC.	per.	s. d.
Thalia dealbata	Fras.	per.	s. d.	— tuberosa	DC.	per.	s. d.
Thalictrum acutifolium	DC.	per.	s. d.	Thuja articulata	Vahl	lign.	s. d.
— ambiguum	Schleich.	per.	s. d.	— australis	Bosc	lign.	s. d.
— angustifolium	L.	per.	sp.	— occidentalis	L.	lign.	s. d.
— apiculatum	Hort.	per.	s. d.	— orientalis	L.	lign.	s. d.
— aquilegifolium	L.	per.	sp.	— pyramidalis	Tenor.	lign.	s. d.
— atropurpur.	Scg.	per.	s. d.	— sphaeroidalis	Rich.	lign.	s. d.
— Capellii	Kostl.	per.	s. d.	Thunbergia alata	Hort.	ann.	s. d.
— carolinianum	Bosc	per.	s. d.	— fragrans	Roxb.	lign.	cal.
— collinum	Wullr.	per.	s. d.	— grandiflora	Roxb.	lign.	cal.
— concinnum	W.	per.	s. d.	Thymus bracteosus	Vis.	per.	s. d.
— cuspidatum	Kostl.	per.	s. d.	— Serpyllum	L.	per.	sp.
— dichotomum	Hort.	per.	s. d.	— — montanus	W. K.	per.	s. d.
— exaltatum	Mey.	per.	s. d.	— vulgaris	L.	lign.	s. d.
— falcatum	Kostl.	per.	s. d.	Thysanocarpus pulchellus	F. et M.	ann.	s. d.
— flavum	L.	per.	sp.	Tiarella cordifolia	L.	per.	s. d.
— floribundum	Schrd.	per.	s. d.	Tiaridium indicum	L.	ann.	s. d.
— lucidum	Jacq.	per.	s. d.	Tigridia Pavonia	Pers.	per.	frig.
— microcarpum	Loud.	per.	s. d.	Tilia argentea	DC.	lign.	s. d.
— minus	L.	per.	s. d.	— asplenifolia	Hort.	lign.	s. d.
— nutans	Desf.	per.	s. d.	— ferruginea	H. Modt.	lign.	s. d.
— parvifolium	Kostl.	per.	s. d.	— flaccida	H. Vind.	lign.	s. d.
— patens	Tausch	per.	s. d.	— glabra	Vent.	lign.	s. d.
— petaloideum	L.	per.	s. d.	— grandifolia	Ehrh.	lign.	s. d.
— pyramidale	Tausch	per.	s. d.	— corallina	Sm.	lign.	s. d.
— repens	C. A. Mey.	per.	s. d.	— mississippiensis	Desf.	lign.	s. d.
— rigidum	Fisch.	per.	s. d.	— parvifolia	Ehrh.	lign.	s. d.
— rubens	Tausch	per.	s. d.	— rubra	DC.	lign.	s. d.
— rugosum	Ait.	per.	s. d.	Tillandsia angustifolia	Sw.	per.	cal.
— ruthenicum	Schrad.	per.	s. d.	— brasiliensis	Hort.	per.	cal.
— Schweiggeri	Spr.	per.	s. d.	— dianthoidea	Rossi	per.	cal.
— sibiricum	L.	per.	s. d.	— discolor	Hort.	per.	cal.
— sparsiflorum	F. M.	per.	s. d.	— Duratii	Vis.	per.	cal.
— speciosum	Pers.	per.	sp.	— latifolia	Meyen	per.	cal.
— squarrosus	Tausch	per.	s. d.	— racemosa	Hort.	per.	cal.
— trigynum	Fisch.	per.	s. d.	— speciosa	Hort.	per.	cal.
— tuberosum	L.	per.	s. d.	— suaveolens	Hort.	per.	cal.
Thapsia Aselepium	L.	per.	s. d.	Tithonia tubaeformis	Cass.	ann.	s. d.
Thea Bohea	L.	lign.	frig.	Tolpis barbata	Gaertn.	ann.	s. d.
— viridis	L.	lign.	frig.	— pectinata	DC.	lign.	tep.
Thelygonum Cynocrambe	L.	ann.	s. d.	— umbellata	Balb.	ann.	s. d.
Thermopsis sabacea	DC.	per.	s. d.	Tordylium apulum	L.	ann.	s. d.
— lanceolata	R. Br.	per.	s. d.	— Hasselquistiae	DC.	ann.	s. d.
Thesium Linophyllum	L.	per.	sp.	— maximum	L.	ann.	sp.
Thlaspi alliaceum	L.	ann.	s. d.	— officinale	L.	bien.	s. d.
— arvense	L.	ann.	s. d.	— syriacum	L.	ann.	s. d.
— baicalense	DC.	ann.	s. d.	Torilis Anthriscus	Gmel.	ann.	sp.
— ceratocarpum	L. fil.	ann.	s. d.	— helvetica	Gmel.	ann.	sp.
— montanum	L.	per.	sp.	— nodosa	Gaertn.	ann.	sp.
— perfoliatum	L.	ann.	sp.	Tournefortia Arguzia	R. B.	per.	s. d.
— platycarpum	F. M.	ann.	s. d.	— cymosa	L.	lign.	cal.
Thomasia dumosa	Cunningh.	lign.	frig.	— fruticosa	L.	lign.	cal.
— purpurea	Gay	lign.	frig.	— heliotropioides	Hook	per.	frig.

Tournefortia hirsutissima					Trifolium incarnatum	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>laurifolia</i>	<i>Sw.</i>	lign.	cal.		— <i>Molinerii</i>	<i>Balb.</i>	ann.	s. d.
— <i>nitida</i>	<i>Vent.</i>	lign.	cal.		— <i>intermedium</i>	<i>Gusson</i>	ann.	s. d.
Trachelium coeruleum	<i>L.</i>	per.	s. d.		— <i>latinum</i>	<i>Sebast.</i>	per.	s. d.
Tradescantia Crassula	<i>Lk. O.</i>	per.	cal.		— <i>libanoticum</i>	<i>Ehrbg.</i>	ann.	s. d.
— <i>discolor</i>	<i>Herit.</i>	per.	cal.		— <i>Lupinaster</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>erecta</i>	<i>Jacq.</i>	ann.	s. d.		— <i>medium</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>iridescens</i>	<i>Lindl.</i>	per.	tep.		— <i>Michelianum</i>	<i>Savi</i>	ann.	s. d.
— <i>Lyoni</i>	<i>H. Angl.</i>	per.	s. d.		— <i>montanum</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>rosea</i>	<i>Michx.</i>	per.	s. d.		— <i>ochroleucum</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>subaspera</i>	<i>Ker</i>	per.	s. d.		— <i>pallidum</i>	<i>W. et K.</i>	ann.	sp.
— <i>undata</i>	<i>Humb.</i>	ann.	s. d.		— <i>patens</i>	<i>Schreb.</i>	ann.	s. d.
— <i>virginica</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.		— <i>pensylvanicum</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.
Tragopogon coloratus	<i>Mey.</i>	bien.	s. d.		— <i>pratense</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>crocifolius</i>	<i>L.</i>	bien.	s. d.		— <i>procumbens</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>floccosus</i>	<i>W. et K.</i>	bien.	s. d.		— <i>purpureum</i>	<i>Loisl.</i>	ann.	s. d.
— <i>major</i>	<i>Jacq.</i>	per.	sp.		— <i>repens</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>mutabilis</i>	<i>Jacq.</i>	bien.	s. d.		— <i>resupinatum</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>porrifolius</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.		— <i>rubens</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>pratensis</i>	<i>L.</i>	bien.	sp.		— <i>Russelianum</i>	<i>Lindl.</i>	per.	s. d.
— <i>undulatus</i>	<i>Jacq.</i>	bien.	s. d.		— <i>scabrum</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>orientalis</i>	<i>L.</i>	bien.	s. d.		— <i>spadiceum</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
Tragopyrum lanceolatum					— <i>striatum</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
	<i>Bieb.</i>	lign.	s. d.		— <i>subterraneum</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
Trapa natans	<i>L.</i>	per.	sp.		— <i>succinctum</i>	<i>Vis.</i>	ann.	s. d.
Trevesia palmata	<i>Vis.</i>	lign.	cal.		— <i>trichocephalum</i>	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.
Trianthema monogyna	<i>L.</i>	ann.	s. d.		— <i>vesiculosum</i>	<i>Savi</i>	ann.	s. d.
Tribulus alatus	<i>Delil.</i>	ann.	s. d.		— <i>Wormskioldii</i>	<i>Lehm.</i>	per.	s. d.
— <i>terrestris</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.		Triglochin laxiflorum	<i>Guss.</i>	per.	s. d.
Trichodesma africanum					— <i>maritimum</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>indicum</i>	<i>Lehm.</i>	ann.	s. d.		— <i>palustre</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
	<i>Lehm.</i>	ann.	s. d.		Trigonella arcuata	<i>F. et M.</i>	ann.	s. d.
Trichosanthes Anguina	<i>L.</i>	ann.	s. d.		— <i>azurea</i>	<i>C. A. Mey.</i>	ann.	s. d.
Tridax procumbens	<i>L.</i>	ann.	s. d.		— <i>Besseriiana</i>	<i>Sering.</i>	ann.	s. d.
Trifolium agrarium	<i>L.</i>	ann.	sp.		— <i>calliceras</i>	<i>Fisch.</i>	ann.	s. d.
— <i>alatum</i>	<i>Bivon.</i>	per.	s. d.		— <i>cancellata</i>	<i>Desf.</i>	ann.	s. d.
— <i>albidum</i>	<i>Retz.</i>	ann.	s. d.		— <i>coerulea</i>	<i>Sering.</i>	ann.	s. d.
— <i>alpestre</i>	<i>L.</i>	per.	sp.		— <i>corniculata</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>angulatum</i>	<i>W. et K.</i>	per.	s. d.		— <i>ensifera</i>	<i>Trautv.</i>	ann.	s. d.
— <i>angustifolium</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.		— <i>Fischeriana</i>	<i>Sering.</i>	ann.	s. d.
— <i>armenium</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.		— <i>Foenum graecum</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>arvense</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.		— <i>gladiata</i>	<i>Stev.</i>	ann.	s. d.
— <i>badium</i>	<i>Schreb.</i>	per.	s. d.		— <i>glomerata</i>	<i>H. Pis.</i>	ann.	s. d.
— <i>Balbisianum</i>	<i>Serig.</i>	per.	s. d.		— <i>pinnatifida</i>	<i>Cav.</i>	ann.	s. d.
— <i>caespitosum</i>	<i>Reyn.</i>	per.	s. d.		— <i>polycerata</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>caupestire</i>	<i>Schreb.</i>	ann.	s. d.		— <i>prostrata</i>	<i>DC.</i>	ann.	s. d.
— <i>clypeatum</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.		— <i>spinosa</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>conicum</i>	<i>Pers.</i>	ann.	s. d.		— <i>striata</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>dalmaticum</i>	<i>Vis.</i>	per.	s. d.		— <i>tenuis</i>	<i>Fisch.</i>	ann.	s. d.
— <i>diffusum</i>	<i>Ehrh.</i>	ann.	s. d.		— <i>torta</i>	<i>Sm.</i>	ann.	s. d.
— <i>elegans</i>	<i>Savi</i>	per.	sp.		Trinia vulgaris	<i>DC.</i>	ann.	sp.
— <i>expansum</i>	<i>W. et K.</i>	per.	s. d.		Triodia decumbens	<i>Beauv.</i>	per.	sp.
— <i>filiforme</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.		Triplaris americana	<i>L.</i>	lign.	cal.
— <i>fragiferum</i>	<i>L.</i>	per.	sp.		Tripolium vulgare	<i>Nees</i>	per.	sp.
— <i>glomeratum</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.		Tripsacum monostrachyum	<i>W.</i>	per.	s. d.

<i>Trisetum carpathicum</i> <i>R. S.</i>	per.	s. d.	<i>Tulipa praecox</i> <i>Tenor.</i>	per.	s. d.
— <i>condensatum</i> <i>Presl</i>	ann.	s. d.	— — <i>Foxiana</i> <i>Reb.</i>	per.	s. d.
— <i>flavescens</i> <i>Beauv.</i>	per.	sp.	— <i>scrotina</i> <i>Reb.</i>	per.	s. d.
— <i>neglectum</i> <i>R. et S.</i>	ann.	s. d.	— <i>spathulata</i> <i>Bertol.</i>	per.	s. d.
<i>Tristania nerifolia</i> <i>R. Br.</i>	lign.	frig.	— <i>strangulata</i> <i>Reb.</i>	per.	s. d.
<i>Triticum caespitosum</i> <i>DC.</i>	per.	s. d.	— <i>suaveolens</i> <i>Roth</i>	per.	s. d.
— <i>caninum</i> <i>Schreb.</i>	per.	sp.	— <i>sylvestris</i> <i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>ciliatum</i> <i>DC.</i>	ann.	s. d.	<i>Tunica saxifraga</i> <i>Scop.</i>	per.	sp.
— <i>cristatum</i> <i>Schreb.</i>	per.	s. d.	— <i>stricta</i> <i>F. et M.</i>	bien.	s. d.
— <i>glaucum</i> <i>Desf.</i>	per.	s. d.	<i>Turgenia latifolia</i> <i>Hoffm.</i>	ann.	s. d.
— <i>hirtum</i> <i>H. Paris.</i>	per.	s. d.	<i>Turnera ulmifolia</i> <i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>juncum</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Turritis glabra</i> <i>L.</i>	bien.	sp.
— <i>monococcum</i> <i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>retrofracta</i> <i>Hook.</i>	ann.	s. d.
— <i>obtusiflorum</i> <i>DC.</i>	per.	s. d.	<i>Tussilago Farfara</i> <i>L.</i>	per.	sp.
— <i>pectinatum</i> <i>Bieb.</i>	per.	s. d.	<i>Tweedia coerulea</i> <i>G. Don</i>	per.	tep.
— <i>pinnatum</i> <i>Moench</i>	per.	sp.	<i>Typha angustifolia</i> <i>L.</i>	per.	sp.
— <i>pungens</i> <i>DC.</i>	per.	s. d.	— <i>latifolia</i> <i>L.</i>	per.	sp.
— <i>repens</i> <i>L.</i>	per.	sp.	— <i>minor</i> <i>Sm.</i>	per.	sp.
— <i>firmum</i> <i>Presl</i>	per.	s. d.	<i>Tyrimnus leucographus</i> <i>Cas</i>	ann.	s. d.
— <i>glaucum</i> <i>Pers.</i>	per.	sp.	—		
— <i>rigidum</i> <i>Schrad.</i>	per.	s. d.	<i>Ulex europaeus</i> <i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>sylvaticum</i> <i>Moench</i>	per.	sp.	<i>Ulmus americana</i> <i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>turgidum</i> <i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>campestris</i> <i>L.</i>	lign.	sp.
— <i>villosum</i> <i>Beauv.</i>	ann.	sp.	— <i>chinensis</i> <i>Desf.</i>	lign.	s. d.
— <i>vulgare</i> <i>Vill.</i>	ann.	s. d.	— <i>corylifolia</i> <i>Host</i>	lign.	s. d.
— <i>hybernum</i> <i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>crispa</i> <i>W.</i>	lign.	s. d.
<i>Tritoma Uvaria</i> <i>Link</i>	per.	frig.	— <i>glabra</i> <i>Mill.</i>	lign.	s. d.
<i>Tritonia crocata</i> <i>Ker</i>	per.	frig.	— <i>— vegeta</i> <i>Loud.</i>	lign.	s. d.
— <i>deusta</i> <i>Ker</i>	per.	frig.	— <i>macrophylla</i> <i>Hort.</i>	lign.	s. d.
— <i>fenestrata</i> <i>Ker</i>	per.	frig.	— <i>montana</i> <i>Sm.</i>	lign.	s. d.
— <i>lineata</i> <i>Ker</i>	per.	frig.	— <i>oxoniensis</i> <i>Hort.</i>	lign.	s. d.
— <i>longiflora</i> <i>Ker</i>	per.	frig.	— <i>— rugosa</i> <i>Hort.</i>	lign.	s. d.
— <i>refracta</i> <i>Ker</i>	per.	frig.	— <i>nodosa</i> <i>Hort.</i>	lign.	s. d.
— <i>securigera</i> <i>Ker</i>	per.	frig.	— <i>quercifolia</i> <i>Hort.</i>	lign.	s. d.
— <i>squalida</i> <i>Ker</i>	per.	frig.	— <i>suberosa</i> <i>Ehrh.</i>	lign.	sp.
— <i>viridis</i> <i>Ker</i>	per.	frig.	— <i>tiliaefolia</i> <i>Host</i>	lign.	s. d.
<i>Triumfetta althaeoides</i> <i>Lam.</i>	lign.	cal.	— <i>tortuosa</i> <i>Host</i>	lign.	s. d.
— <i>Lappula</i> <i>L.</i>	lign.	cal.	<i>Umbilicus pendulinus</i> <i>DC.</i>	per.	s. d.
— <i>oblongata</i> <i>Link</i>	ann.	s. d.	<i>Uniola latifolia</i> <i>Michx.</i>	per.	s. d.
— <i>trichoclada</i> <i>DC.</i>	ann.	s. d.	<i>Urachne coerulescens</i> <i>Trin.</i>	per.	s. d.
— <i>velutina</i> <i>Vahl</i>	lign.	cal.	— <i>parviflora</i> <i>Trin.</i>	per.	s. d.
<i>Trollius europaeus</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Uralespis cuprea</i> <i>Kunth</i>	per.	s. d.
<i>Tropaeolum majus</i> <i>L.</i>	ann.	s. d.	<i>Urena lobata</i> <i>L.</i>	lign.	cal.
— <i>minus</i> <i>L.</i>	ann.	s. d.	<i>Uropetalum glaucum</i> <i>Brch.</i>	per.	frig.
— <i>peregrinum</i> <i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>serotinum</i> <i>Ker</i>	per.	s. d.
— <i>trimaculatum</i> <i>Hort.</i>	ann.	s. d.	— <i>viride</i> <i>Ker</i>	per.	frig.
<i>Trymalium longifolium</i> <i>H. Hügel</i>	lign.	frig.	<i>Urospermum capense</i> <i>Spr.</i>	bien.	s. d.
<i>Tulipa Celsiana</i> <i>Red.</i>	per.	s. d.	— <i>Dalechampii</i> <i>Desf.</i>	bien.	s. d.
— <i>Clusiana</i> <i>Vent.</i>	per.	s. d.	— <i>picroides</i> <i>Desf.</i>	ann.	s. d.
— <i>Gesneriana</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Urtica baccifera</i> <i>L.</i>	lign.	cal.
— <i>maleolens</i> <i>Reboul</i>	per.	s. d.	— <i>canadensis</i> <i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>neglecta</i> <i>Reb.</i>	per.	s. d.	— <i>cannabina</i> <i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>oculus solis</i> <i>DC.</i>	per.	s. d.	— <i>convexa</i> <i>Horn.</i>	ann.	s. d.
— <i>odoratissima</i> <i>Vis.</i>	per.	s. d.	— <i>dioica</i> <i>L.</i>	per.	sp.
			— <i>Dodartii</i> <i>L.</i>	ann.	s. d.
			— <i>grandidentata</i> <i>Tenor</i>	per.	s. d.

<i>Urtica macrostachya</i> <i>Wall.</i>	lign.	cal.	<i>Verbascum nigrum</i> <i>L.</i>	per.	sp.
— <i>malastomoides</i> <i>Poir.</i>	lign.	cal.	— <i>niveum</i> <i>Tenor.</i>	bien.	s. d.
— <i>membranacea</i> <i>Poir.</i>	ann.	s. d.	— <i>orientale</i> <i>Bieb.</i>	per.	s. d.
— <i>nivea</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>phoeniceum</i> <i>L.</i>	bien.	sp.
— <i>palmata</i> <i>Forsk.</i>	per.	tep.	— <i>pulverulentum</i> <i>Vill.</i>	bien.	s. d.
— <i>urens</i> <i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>rotundifolium</i> <i>Tenor.</i>	bien.	s. d.
<i>Utricularia vulgaris</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>rubiginosum</i> <i>W. et K.</i>	bien.	s. d.
<i>Vaccinium Myrtillus</i> <i>L.</i>	lign.	sp.	— <i>sinuatum</i> <i>L.</i>	bien.	sp.
— <i>uliginosum</i> <i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>speciosum</i> <i>Schrad.</i>	bien.	s. d.
— <i>Vitis idaea</i> <i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>Thapsus</i> <i>L.</i>	bien.	sp.
<i>Valeriana dioica</i> <i>L.</i>	per.	sp.	— <i>vernale</i> <i>Wierzb.</i>	bien.	s. d.
— <i>montana</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Verbena alata</i> <i>Chamiss.</i>	per.	cal.
— <i>officinalis</i> <i>L.</i>	per.	sp.	— <i>Aubletia</i> <i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>Phu</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>bonariensis</i> <i>L.</i>	per.	tep.
<i>Valerianella auricula</i> <i>DC.</i>	ann.	s. d.	— <i>bracteosa</i> <i>Michx.</i>	per.	s. d.
— <i>brachystephana</i> <i>Std.</i>	ann.	s. d.	— <i>chamaedryfolia</i> <i>Juss.</i>	per.	tep.
— <i>coronata</i> <i>Dufr.</i>	ann.	s. d.	— <i>dentata</i> <i>Hort.</i>	lign.	s. d.
— <i>dentata</i> <i>DC.</i>	ann.	sp.	— <i>erinoides</i> <i>Lam.</i>	ann.	s. d.
— <i>echinata</i> <i>DC.</i>	ann.	sp.	— <i>gracilis</i> <i>Desf.</i>	ann.	s. d.
— <i>eriocarpa</i> <i>Desv.</i>	ann.	s. d.	— <i>hastata</i> <i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>hamata</i> <i>DC.</i>	ann.	sp.	— <i>hispida</i> <i>R. et P.</i>	per.	s. d.
— <i>olitoria</i> <i>Moench</i>	ann.	sp.	— <i>incisa</i> <i>Hook.</i>	per.	tep.
— <i>puberula</i> <i>DC.</i>	ann.	s. d.	— <i>Lamberti</i> <i>Ker.</i>	per.	s. d.
— <i>pumila</i> <i>DC.</i>	ann.	s. d.	— <i>littoralis</i> <i>Humb.</i>	per.	tep.
— <i>Szowitsiana</i> <i>F. et M.</i>	ann.	s. d.	— <i>officinalis</i> <i>L.</i>	per.	sp.
— <i>uncinata</i> <i>Dufr.</i>	ann.	s. d.	— <i>paniculata</i> <i>Lam.</i>	per.	s. d.
<i>Vallisneria Jacquini</i> <i>Sav.</i>	per.	s. d.	— <i>simplex</i> <i>Lehm.</i>	per.	s. d.
— <i>Micheli</i> <i>Sav.</i>	per.	cal.	— <i>stricta</i> <i>Vent.</i>	per.	s. d.
<i>Vanilla aromatica?</i> <i>Sw.</i>	per.	cal.	— <i>suaveolens</i> <i>Hort.</i>	per.	tep.
— <i>planifolia</i> <i>Andr.</i>	per.	cal.	— <i>Tweediana</i> <i>Hook.</i>	per.	tep.
<i>Velezia rigida</i> <i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>urticaefolia</i> <i>L.</i>	per.	frig.
<i>Vella annua</i> <i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>venosa</i> <i>Gill. et H.</i>	per.	tep.
<i>Veltheimia viridifolia</i> <i>Jacq.</i>	per.	frig.	— <i>Weilii</i> <i>Hort.</i>	per.	tep.
<i>Venidium Schraderi</i> <i>DC.</i>	per.	frig.	<i>Verbesina alata</i> <i>L.</i>	per.	cal.
<i>Veratrum album</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>atriplicifolia</i> <i>Desf.</i>	lign.	cal.
— <i>nigrum</i> <i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>buphthalmoides</i>		
<i>Verbascum aethiopicum</i>			— <i>Lk. et O.</i>	per.	cal.
— <i>australe</i> <i>Schrad.</i>	bien.	sp.	— <i>gigantea</i> <i>Jacq.</i>	lign.	cal.
— <i>austriacum</i> <i>Schott.</i>	per.	s. d.	— <i>Phaetusa</i> <i>Cass.</i>	per.	s. d.
— <i>bannaticum</i> <i>Schrad.</i>	per.	s. d.	— <i>serrata</i> <i>Cav.</i>	lign.	cal.
— <i>bicolor</i> <i>Badarr.</i>	bien.	s. d.	— <i>triplinervia</i> <i>Vis.</i>	lign.	cal.
— <i>Blattaria</i> <i>L.</i>	bien.	sp.	<i>Vernonia anthelmintica</i> <i>W.</i>	ann.	s. d.
— <i>Blattarioides</i> <i>Lam.</i>	ann.	sp.	— <i>noveboracensis</i> <i>W.</i>	per.	s. d.
— <i>bracteolatum</i> <i>Delil.</i>	bien.	s. d.	— <i>praealta</i> <i>Less.</i>	per.	s. d.
— <i>densiflorum</i> <i>Bertol.</i>	bien.	s. d.	<i>Veronica acinifolia</i> <i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>dentifolium</i> <i>Delil.</i>	bien.	s. d.	— <i>affinis</i> <i>Jan.</i>	per.	s. d.
— <i>floccosum</i> <i>W. et K.</i>	bien.	sp.	— <i>agrestis</i> <i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>holothyrsum</i> <i>Delil.</i>	bien.	s. d.	— <i>alpina</i> <i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>lanatum</i> <i>Schrad.</i>	per.	s. d.	— <i>Anagallis</i> <i>L.</i>	per.	sp.
— <i>longifolium</i> <i>Tenor.</i>	bien.	s. d.	— <i>anagalloides</i> <i>Guss.</i>	ann.	s. d.
— <i>Lychnitis</i> <i>L.</i>	per.	sp.	— <i>aphylla</i> <i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>majale</i> <i>DC.</i>	bien.	s. d.	— <i>argentea</i> <i>H. Cracov.</i>	per.	s. d.
— <i>micranthum</i> <i>Hoffm.</i>	bien.	s. d.	— <i>arguta</i> <i>Schrad.</i>	per.	s. d.
— <i>montanum</i> <i>Schrad.</i>	bien.	s. d.	— <i>arvensis</i> <i>L.</i>	ann.	sp.
			— <i>auriculata</i> <i>Tausch.</i>	per.	s. d.
			— <i>Bachofenii</i> <i>Heuff.</i>	per.	s. d.

<i>Veronica Beccabunga</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	<i>Viburnum Opulus</i>	<i>L.</i>	lign.	sp.
— <i>biloba</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>— rosaceum</i>	<i>Hort.</i>	lign.	s. d.
— <i>bractescens</i>	<i>Tausch</i>	per.	s. d.	— <i>prunifolium</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>Buxbaumii</i>	<i>Tenor.</i>	ann.	sp.	— <i>pyrifolium</i>	<i>Desf.</i>	lign.	s. d.
— <i>caucasica</i>	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.	— <i>rugosum</i>	<i>Pers.</i>	lign.	frig.
— <i>Chamaedrys</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>Tinus</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>comosa</i>	<i>Tausch</i>	per.	s. d.	<i>Vicia acutangula</i>	<i>Ledeb.</i>	per.	s. d.
— <i>crassifolia</i>	<i>Wierzb.</i>	per.	s. d.	— <i>altissima</i>	<i>Desf.</i>	per.	s. d.
— <i>crenulata</i>	<i>Hoffm.</i>	per.	s. d.	— <i>angustifolia</i>	<i>Roth</i>	ann.	sp.
— <i>cuneata</i>	<i>Tausch</i>	per.	s. d.	— <i>atropurpurea</i>	<i>Desf.</i>	per.	s. d.
— <i>falcata</i>	<i>Mart.</i>	per.	sp.	— <i>bithynica</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>fruticulosa</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>cassubica</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>gentianoides</i>	<i>Vahl</i>	per.	s. d.	— <i>cordata</i>	<i>Wulf.</i>	ann.	s. d.
— <i>hederacfolia</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>Cracca</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>incana</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>dasycarpa</i>	<i>Tenor.</i>	ann.	s. d.
— <i>laevigata</i>	<i>H. Genev.</i>	per.	s. d.	— <i>dumetorum</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>longifolia</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>ferruginea</i>	<i>Bess.</i>	ann.	s. d.
— <i>— acuta</i>	<i>Mart.</i>	per.	s. d.	— <i>galloprovincialis</i>	<i>Poir.</i>	per.	s. d.
— <i>maritima</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>grandiflora</i>	<i>Scop.</i>	bien.	s. d.
— <i>Michauxii</i>	<i>Lam.</i>	per.	s. d.	— <i>— sordida</i>	<i>Kit.</i>	bien.	sp.
— <i>micrantha</i>	<i>Hoffmsg.</i>	per.	s. d.	— <i>hirsutissima</i>	<i>Cyrill.</i>	ann.	s. d.
— <i>mollis</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.	— <i>hybrida</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>montana</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>lathyroides</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>nitida</i>	<i>Poir.</i>	per.	s. d.	— <i>lutea</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>officinalis</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>— hirta</i>	<i>Balb.</i>	ann.	sp.
— <i>peregrina</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>megalotropis</i>	<i>Ledeb.</i>	per.	s. d.
— <i>plicata</i>	<i>Pohl</i>	per.	s. d.	— <i>narbonensis</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>prostrata</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>— serratifolia</i>	<i>Jacq.</i>	ann.	sp.
— <i>pulverulenta</i>	<i>Tausch</i>	per.	s. d.	— <i>onobrychioides</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>racemosa</i>	<i>Kostl.</i>	per.	s. d.	— <i>pannonica</i>	<i>Jacq.</i>	ann.	s. d.
— <i>repens</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.	— <i>peregrina</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>saxatilis</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>pilosa</i>	<i>Bieb.</i>	ann.	s. d.
— <i>scutellata</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>pisiformis</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>serpyllifolia</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>Pseudocracca</i>	<i>Brtol.</i>	ann.	s. d.
— <i>speciosa</i>	<i>Tausch</i>	per.	sp.	— <i>Pseudorobus</i>	<i>F. M.</i>	per.	s. d.
— <i>spicata</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>rosea</i>	<i>Muller</i>	ann.	s. d.
— <i>spuria</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>sativa</i>	<i>L.</i>	bien.	sp.
— <i>squamosa</i>	<i>Presl</i>	per.	s. d.	— <i>sepium</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>tarpheia</i>	<i>Jan</i>	per.	s. d.	— <i>sylvatica</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>Teucrium</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>tricolor</i>	<i>Sebast.</i>	ann.	s. d.
— <i>triphyllus</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	— <i>triflora</i>	<i>Tenor.</i>	ann.	s. d.
— <i>tubiflora</i>	<i>F. et M.</i>	per.	s. d.	— <i>variegata</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.
— <i>virginica</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>villosa</i>	<i>Roth</i>	ann.	sp.
— <i>Waldsteiniana</i>	<i>Schtt</i>	per.	s. d.	— <i>virescens</i>	<i>H. Monsp.</i>	ann.	s. d.
<i>Vesicaria corymbosa</i>	<i>Grseb.</i>	bien.	s. d.	<i>Vilfa tenacissima</i>	<i>Humb.</i>	per.	tep.
— <i>cretica</i>	<i>Poir.</i>	lign.	s. d.	<i>Vilmorinia multiflora</i>	<i>DC.</i>	lign.	cal.
— <i>grandiflora</i>	<i>Hook.</i>	ann.	s. d.	<i>Viminaria denudata</i>	<i>Sm.</i>	lign.	frig.
— <i>reticulata</i>	<i>Lam.</i>	per.	s. d.	<i>Vinca major</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>sinuata</i>	<i>Poir.</i>	bien.	sp.	— <i>minor</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>utriculata</i>	<i>Lam.</i>	lign.	s. d.	<i>Viola altaica</i>	<i>Ker</i>	per.	s. d.
<i>Vialia macrophylla</i>	<i>Vis.</i>	lign.	tep.	— <i>biflora</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
<i>Viburnum dentatum</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>calcarata</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>edule</i>	<i>Pursh</i>	lign.	s. d.	— <i>canina</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>Lantana</i>	<i>L.</i>	lign.	sp.	— <i>cucullata</i>	<i>Ait.</i>	per.	s. d.
— <i>nudum</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>hirta</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>odoratissimum</i>	<i>Ker</i>	lign.	frig.				

<i>Viola lancifolia</i>	<i>Bieb.</i>	per.	s. d.	<i>Xanthium strumarium</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.
— <i>mirabilis</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Xeranthemum annuum</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>montana</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	— <i>cylindraceum</i>	<i>Sm.</i>	ann.	s. d.
— <i>multifida</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.	— <i>inapertum</i>	<i>W.</i>	ann.	sp.
— <i>occulta</i>	<i>Lehm.</i>	per.	s. d.	<i>Xerotes longifolia</i>	<i>R. Br.</i>	per.	frig.
— <i>odorata</i>	<i>L.</i>	per.	sp.	<i>Ximenesia encelioides</i>	<i>Cav.</i>	ann.	s. d.
— <i>palmata</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Xylophylla angustifolia</i>	<i>Sw.</i>	frig.	frig.
— <i>Patrinii</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.	— <i>falcata</i>	<i>Ait.</i>	lign.	tep.
— <i>pedata</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	— <i>latifolia</i>	<i>L.</i>	lign.	tep.
— <i>pinnata</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.	<i>Youngia mauritiana</i>	<i>DC.</i>	ann.	s. d.
— <i>Ruppii</i>	<i>All.</i>	per.	s. d.	— <i>integrifolia</i>	<i>Cass.</i>	ann.	s. d.
— <i>stagnina</i>	<i>Kit.</i>	per.	s. d.	<i>Yucca abyssinica</i>	<i>Hort.</i>	lign.	cal.
— <i>tricolor</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.	— <i>aloifolia</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— — <i>arvensis</i>	<i>Murr.</i>	ann.	sp.	— <i>angustifolia</i>	<i>Pursh</i>	lign.	tep.
— — <i>perennans</i>	<i>H. Pat.</i>	per.	s. d.	— <i>crenulata</i>	<i>Haw.</i>	lign.	tep.
<i>Virgilia aurea</i>	<i>Lam.</i>	lign.	tep.	— <i>Draconis</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
— <i>capensis</i>	<i>Lam.</i>	lign.	frig.	— <i>filamentosa</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
— <i>lutea</i>	<i>Michx. fil.</i>	lign.	s. d.	— <i>gloriosa</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.
<i>Viscum album</i>	<i>L.</i>	lign.	sp.	— <i>quadricolor</i>	<i>Hort.</i>	lign.	tep.
<i>Visnea Mocanera</i>	<i>L. fil.</i>	lign.	frig.	<i>Zacintha verrucosa</i>	<i>Gaertn.</i>	ann.	s. d.
<i>Vitex Agnus castus</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	<i>Zaluzania triloba</i>	<i>Pers.</i>	lign.	tep.
— <i>incisa</i>	<i>Lam.</i>	lign.	s. d.	<i>Zamia pumila</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.
— <i>Negundo</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.	<i>Zannichellia palustris</i>	<i>L.</i>	per.	sp.
— <i>trifolia</i>	<i>L.</i>	lign.	frig.	<i>Zantedeschia aethiopica</i>	<i>Spr</i>	per.	tep.
<i>Vitis laciniosa</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	<i>Zantorrhiza apiifolia</i>	<i>Herit.</i>	per.	s. d.
— <i>odoratissima</i>	<i>Dmont.</i>	lign.	s. d.	<i>Zanthoxylon fraxineum</i>	<i>W.</i>	lign.	s. d.
— <i>vinifera</i>	<i>L.</i>	lign.	s. d.	— <i>Pterota</i>	<i>Humb.</i>	lign.	cal.
<i>Vulpia alopecuroides</i>	<i>Link.</i>	ann.	s. d.	<i>Zea Caragua</i>	<i>Molin.</i>	ann.	s. d.
— <i>bromoides</i>	<i>Link.</i>	ann.	sp.	— <i>hirta</i>	<i>Bonaf.</i>	ann.	s. d.
— <i>ciliata</i>	<i>Link.</i>	ann.	sp.	— <i>Mays</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>geniculata</i>	<i>Link.</i>	ann.	s. d.	— — <i>praecox</i>	<i>Pers.</i>	ann.	s. d.
— <i>Myurus</i>	<i>Gmel.</i>	ann.	sp.	<i>Zingiber Cassumunar</i>	<i>Roxb.</i>	per.	cal.
<i>Wahlenbergia lobelioides</i>	<i>DC. fil.</i>	ann.	s. d.	— <i>officinale</i>	<i>Rosc.</i>	per.	cal.
<i>Waldsteinia geoides</i>	<i>W.</i>	per.	s. d.	<i>Zinnia elegans</i>	<i>Jacq.</i>	ann.	s. d.
<i>Waltheria indica</i>	<i>L.</i>	lign.	cal.	— <i>hybrida</i>	<i>Sims.</i>	ann.	s. d.
<i>Watsonia aletroides</i>	<i>Ker.</i>	per.	frig.	— <i>multiflora</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>iridifolia</i>	<i>Ker.</i>	per.	frig.	— <i>pauciflora</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
— <i>marginata</i>	<i>Ker.</i>	per.	frig.	— <i>tenuiflora</i>	<i>Jacq.</i>	ann.	s. d.
— <i>Meriana</i>	<i>Ker.</i>	per.	frig.	— <i>verticillata</i>	<i>Andr.</i>	ann.	s. d.
<i>Westringia rosmarinifor-</i>	<i>mis Sm.</i>	lign.	frig.	<i>Ziziphora capitata</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
<i>Wiedemannia orientalis</i>	<i>F. et M.</i>	ann.	s. d.	— <i>media</i>	<i>Link.</i>	per.	s. d.
<i>Wisteria chinensis</i>	<i>DC.</i>	lign.	s. d.	— <i>serpyllacea</i>	<i>Bieb.</i>	lign.	s. d.
— <i>frutescens</i>	<i>DC.</i>	lign.	s. d.	— <i>tenuior</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
<i>Witsenia corymbosa</i>	<i>Sm.</i>	per.	frig.	<i>Zizyphus bubalina</i>	<i>Lichtst.</i>	lign.	frig.
<i>Woodwardia radicans</i>	<i>Sw.</i>	per.	frig.	— <i>vulgaris</i>	<i>Lam.</i>	lign.	s. d.
<i>Wrightia coccinea</i>	<i>Wall.</i>	lign.	cal.	<i>Zoegea Leptaurea</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.
<i>Xanthium macrocarpum</i>	<i>DC.</i>	ann.	s. d.	<i>Zoximia absinthifolia</i>	<i>DC.</i>	per.	s. d.
— <i>spinosa</i>	<i>L.</i>	ann.	sp.	<i>Zygopetalum maxillare</i>	<i>Roxb.</i>	per.	cal.
				<i>Zygophyllum Fabago</i>	<i>L.</i>	per.	s. d.
				— <i>foetidum</i>	<i>Schrad.</i>	lign.	frig.
				— <i>simplex</i>	<i>L.</i>	ann.	s. d.

ILLUSTRAZIONI

DI

ALCUNE PIANTE DEL PRESENTE CATALOGO

1. **ACACIA UNDULATA** W. var. **LONGISPINA** H. Pat.

È probabilmente una pianta ibrida fra l'*Acacia undulata* e l'*A. armata* R. Br. Differisce da quella per le foglie più corte, e le spine tre volte più lunghe e più forti; da questa per le foglie più strette ed ondulate, e le spine due volte più lunghe e più forti.

2. **AGERATUM CORYMBOSUM** Zucc.

Questa pianta, che da tempo assai lungo coltivasi nell'Orto di Padova sotto un tal nome, differisce dalla descrizione datane dal DC. nel *Prodr. syst. veg.* 5. pag. 108 sotto il nome di *Coelestina ageratoides* H. B. et Kth, nonchè da quella di questi autori, pel caule suffruticoso e non erbaceo, e per essere pianta perenne e non annuale. Del rimanente è bene rappresentata dalla tavola 1730 del *Botan. Magaz.* sotto il nome di *A. coelestinum* Sims, e perciò non può da questa distinguersi: basterà pertanto rettificarne la durata, chiamandola, anzichè erbacea ed annuale, pianta suffruticosa e perenne.

3. **ALLIUM CORNUTUM** Clementi.

Di questa nuova specie di Aglio, scoperta in Dalmazia dal sig. dott. Giuseppe Clementi, Assistente degnissimo e benemerito di questa Cattedra ed Orto botanico, fu pubblicata non ha guari la descrizione nel sunto di una sua Memoria intorno al viaggio da lui fatto in Dalmazia l'anno 1840, letta alla Sezione botanica della terza Riunione degli Scienziati Italiani in Firenze il dì 27 Settembre 1841, ed inserita negli Atti della Riunione medesima alla pag. 517.

4. ALOE ECHINATA W.

Sembra che questa pianta non sia già buona specie, ma soltanto una forma più robusta e maggiore dell'*A. tuberculata* Haw., a foglie largamente lanceolate.

5. ALOE OBSCUREVIRENS Martinati.

È un ibrido nato dai semi dell'*A. nigricans* Haw., e mi fu comunicato colla descrizione seguente dal sig. dott. Domenico Martinati distinto naturalista, ed amatore intelligente dello studio e della coltivazione delle piante grasse.

A. caulescens, foliis distichis supra concavis, basi arcte approximatis, margine scabris, apice obtuse mucronatis pellucido serrulatis, verrucis albicantibus confluentibus obsitis, scapo simplici, perianthiis confertis curvatis pendulis, basi ventricosis, bracteis pedicellum aequantibus. Martin.

6. ALOE PUNCTATA Martinati.

Debbo anche questa specie, di cui s'ignora la provenienza, alla gentilezza del suo Autore, che la definì come segue:

A. caulescens, foliis distichis laevibus nitidis acuminatis basi approximatis, margine scabris, subtus convexis, transverse irregulariter albo fasciatis, undique minutissime punctulatis, scapo simplici, perianthiis incurvis basi ventricosis pendulis.

7. ALOE INCURVA Haw.

Questa specie non differisce dall'*A. humilis* Lam., e forse nè anco dall'*A. tuberculata* Haw., per cui tutte e tre potrebbero riunirsi nella sola specie di Lamarck.

8. ALTHAEA SPECIOSA Vis.

A. stellato-canescens, foliis subcordatis inferioribus 5-7 lobis, superioribus profunde trilobis, lobis dentatis, pedunculis axillaribus unifloris petiolo longioribus, involucello 6-8-fido nervoso cano calyce paullo brevior, carpellis extus tomentosis, margine acutis, utrinque radiato-rugosis. — Hab.

Ebbi questa bella specie a fiori purpurei, di radice perenne, e che regge all'aperto, dallo Stabilimento botanico-agrario della ditta Burdin e Comp. a Torino. Non trovandola indicata o descritta negli autori che mi è dato di consultare, ho stimato utile il darne almeno la frase specifica.

Benchè il suo involucello non sia quinquefido, pure pei caratteri del frutto dee collocarsi nella sezione terza (*Alphaea*) di questo genere. Ved. *DC. Prodr. syst. nat.* 1. pag. 437.

9. **AMARANTHUS BICOLOR** Nocca.

È pianta bene distinta dall' *A. tricolor* L., con cui la confuse lo Sprengel (*Syst. veg.* 1. pag. 297) per l'altezza sua, pel colore atro-purpureo di tutta la pianta, le cui foglie nella sommità del caule sono tinte di un rosso vivissimo sulla loro metà inferiore, e per la notevole lunghezza dei picciuoli rispettivamente alla lamina che sostengono. L' *A. bicolor* invece è pianta di poca altezza, tutta di un colore verde-giallo, le cui foglie sono verdi alla sommità, atro-purpuree nella metà inferiore, ed alla base hanno una macchia rossa: i picciuoli sono più corti delle lamine.

10. **ANCHUSA LEPTOPHYLLA** R. S.

Questa specie è ben diversa dalla *A. microcalyx* Vis. *Fl. Daln.* Vol. I. tab. 23. fig. 1., con cui la scambiò il Reichenbach, e sulla di lui fede lo Steudel.

11. **ANCHUSA OBLIQUA** Vis. *Sem. rar. H. Pat.* 1836.

A. hispida caule erecto ramoso, foliis oblongo-lanceolatis oblique semidecurrentibus subrepandis ciliatis, racemis densifloris conjugatis secundis, bracteis oblique subcordato-acuminatis hinc semidecurrentibus pedicello triplo longioribus, calycibus obtusis erectis tubo corollae brevioribus, demum inflatis nutantibus. Vis. *Memorie dell' I. R. Istituto Veneto*, Vol. I. 1842, tav. V.

Questa pianta, di cui raccolse i semi sulla riva europea del Bosforo il ch. sig. A. Parolini di Bassano, fu da me compiutamente descritta e figurata in un lavoro inserito nel Vol. I. delle Memorie dell' I. R. Istituto Veneto, intitolato *Illustrazione di alcune piante della Grecia e dell'Asia minore del professore Roberto de Visiani*. Venezia 1842, pag. 13.

12. **ANGOPHORA CORDATA** H. Hügel.

È una robusta specie provenuta dal ricchissimo Giardino del ch. Barone C. Hügel presso Vienna, distinta dall' *Angophora cordifolia* Cav. per le foglie ampie, glauche, lisce e prive di peli, obliquamente subcordate, lungamente picciuolate. Non avendo ancora fiorito fra noi, non ho

potuto riconoscerne il genere, nè descriverla compiutamente nel caso che fosse nuova.

13. **ANTHOLIZA BICOLOR** Gasparrini.

Ebbi questa bella pianta da semi dell'Orto reale di Napoli; è affine all'*A. aethiopica* L., ma ne differisce pei caratteri del fiore.

A. foliis ensiformibus nervosis, spica disticha, perianthii lacinia supra tubo longiore obtusa, reliquis lanceolato-acuminatis brevissimis, bracteis ovario subaequalibus, exterior truncata. Vis.

L'*A. aethiopica* invece ha tutte le lacinie del perianzio ottuse, la superiore più breve del tubo, le altre lineari bislunghe, le brattee più lunghe dell'ovario, acute od acuminate.

14. **ARAUJA UNDULATA** H. Pat.

Mi venne per semi dall'Orto botanico di Montpellier col nome di *Physianthus undulatus* H. Monsp., e mi nacque da altri semi ricevuti dal Cairo dal ch. sig. Antonio Figari, colà Ispettore di Sanità, e benemerito della Scienza per le ricche collezioni di piante e semi di cui fornì il Viviani, il Delile, e me pure. È molto simile all'*A. albens* G. Don, o *Physianthus albens* Mart.; ma non avendo ancora fiorito qui, non ho potuto stabilirne la differenza o la identità.

15. **ARTEMISIA NARONITANA** Vis.

Non è già la stessa cosa che l'*A. procera* W., come pensa il Besser, e sulla di lui fede lo Steudel, ma piuttosto è molto affine all'*A. Abrotanum*, con cui la congiunse il Reichenbach.

16. **ASPERULA SCUTELLARIS** Vis. *Sem. rar. H. Pat.* 1836.

È sinonimo di questa specie il *Galium rupestre* Vis. nella *Flor. od. bot. Zeit.* 1829, I. B., non già di DC., il quale nel *Prodromo* al Vol. IV. pag. 603 descrive una pianta diversa ricevuta sotto quel nome, ch'è affine al *G. Mollugo*, ma distinta per fiori e frutti gialli, la quale nella Flora Dalmatica porta il nome di *G. aureum* Vis. All'*A. scutellaris* spetta pure il sinonimo dell'*A. rupestris* Reichb. *Fl. exc.* pag. 205; ma questo nome non può conservarsi, perchè imposto già dal Tineo ad altra specie nel Catalogo dell'Orto Panormitano per l'anno 1807.

La nostra è pianta intermedia fra i *Galii* e le *Asperule*, però diversa da entrambi i generi per la corolla fatta a scodella.

17. *ATHAMANTHA FLAVESCENS* Vis.

Vi appartengono quai sinonimi l'*A. verticillata* e l'*A. ramossissima* Portenschlag. Non può conservarsi il primo di questi nomi, perchè dato già dal Sibthorp ad altra pianta; non il secondo, perchè il Link lo adoperò prima per indicare altra specie, che non è certo essere identica col l'*A. Matthioli* Wulf. Il nome nostro, desunto dal colorito del fiore, indica un carattere che al primo aspetto distingue questa specie dalle congeneri.

18. *BASELLA VESICARIA* Hort.

La pianta che coltivasi sotto un tal nome nell'Orto nostro è ben diversa dalla *B. vesicaria* di Lamarck, ch'è pianta annuale; mentre la nostra è vivace, ed a radici tuberose. Non ha peranco fiorito.

19. *BEGONIA MANICATA* H. Cels.

Ebbi di recente questa bella specie dai signori Cels di Parigi, distintissima da ogni altra a me nota per essere fornita nella sommità dei picciuoli di due o più collaretti membranosi, frangiati, volti all'ingiù, e d'un color rosso carico, che sembrano fatti da peli strigosi larghi uniti insieme in membrane. Di questi peli connati in espansioni membranacee rosse con punte bianche trovasi sparsa anche la pagina inferiore della lamina delle foglie, e specialmente le nervature della medesima.

20. *BEGONIA ERIOCAULIS* H. L'ovan.

Questa pianta ha caule diritto, foglie rotonde scudiformi quasi intiere, ed è tutta coperta di tomento bianchiccio corto lanuginoso, o più tosto simile ai ragnateli.

21. *BIDENS PALEACEA* Vis.

B. caule glabro superne tetragono, foliis inferioribus ternatis, superioribus impari-pinnatis, lobis ovatis acuminatis serratis pubescentibus, terminali majore longe petiolulato, petiolis basi utrinque barbatis, floribus axillaribus oppositis, terminalibus ternatis, pedunculatis, pauciradiatis, paleis receptaculi coloratis flosculos superantibus, acheniis lineari-tetragonis, basi subdilatatis areolatis, aristis 2-4 inaequalibus. Vis. *Illustrazione delle piante*

dell'Orto botanico di Padova nel Vol. IV. dei Nuovi Saggi dell'Accademia di Padova, 1840.

Pianta erbacea bienne, nativa della Nubia e dello Scheibun, il cui raggio è citrino, le pagliette del ricettacolo allungate petaliformi atro-purpuree; pel quale carattere diversifica dalle altre numerose specie di questo genere.

22. BUMELIA LYCIOIDES W.

Non differisce punto da questa la *B. ambigua* Tenore, che si coltiva qui da più anni, nata da semi ricevuti dallo stesso Orto botanico di Napoli.

23. CECROPIA ARGENTEA Vis.

Questa pianta si trova negli Orti sotto il falso nome di *C. palmata* W., la quale differisce dalla nostra, secondo la descrizione datane dall'Autore, pei lobi delle foglie profondi sino alla metà della lamina, distanti, bislungi, rotondati ed ottusi alla cima, liscii superiormente, e nelle vene e nervature inferiormente. La nostra invece ha i seguenti caratteri.

C. foliis peltatis breviter 8-9-lobis, lobis late ovatis abrupte acuminatis repando-dentatis, supra scabris viridibus, subtus argenteis, nervis venisque viridibus hirtis. Vis.

È bene rappresentata dallo Sloane (*Jamaic.* 1. tab. 88. f. 2., et tab. 89). A questa stessa specie parmi doversi pure riferire la *C. peltata* W. *Sp. pl.* IV. P. II. pag. 651 (non già del Linneo), perchè il Willdenow attribuisce alla sua lobi brevissimi; locchè se concorda colle figure dello Sloane testè citate, e che certamente appartengono alla nostra pianta, discorda però grandemente dai caratteri assegnati dal Linneo stesso (*Amoen.* 5. pag. 410) alle foglie della sua *Cecropia peltata* (*Sp. pl.* ed. II. p. 1449 et 1450) colle espressioni *folia octopalmata lobis acutis*, e più ancora dalle figure che il Linneo cita a rappresentare siffatta specie (*Pluken. Almag.* tab. 243. f. 5., *Pison. Hist. Ind. utr.* pag. 147). Queste figure danno l'immagine di una *Cecropia* a lobi profondi, qual'è appunto quella che si coltiva negli Orti botanici col nome di *C. peltata* L., ed alla quale oltre questa deesi aggiungere la figura datane dal Lamarck nell'*Enciclopedia botanica* alla tavola 800. La *C. peltata* a maggiore illustrazione può definirsi così:

C. foliis peltatis profunde 8-9-lobis, lobis oblongo-obovatis acuminatis integris serrulatisve, supra scabris viridibus, subtus albidis, petiolis nervisque molliter villosis viridibus. — Pluken. *Almag.* tab. 243. f. 5. (bona). Pison. *Hist. Ind.* pag. 147 (mediocris). Lam. *Enc. bot.* pl. 800, bona quoad habitum, sed lobis imbricatis nec distantibus, obtusis nec acutis.

24. CLERODENDRON TRIFLORUM Vis.

Cl. fruticosum canescens, ramis subtetragonis, foliis longe petiolatis late ovalibus, medio grosse dentatis, subtus nervosis, pedunculis axillaribus subtrifloris nutantibus, pedicellis lateralibus bracteolatis apice incrassatis, calycibus campanulato conniventibus pentagonis quinquefidis, dentibus lanceolatis, corollae calyce triplo longioris tubo filiformi gracili, limbi lobis ellipticis reflexis, stigmatibus indiviso.

Hab. in Nubia loco Reseres Tumad dicto, ubi legit cel. Th. Kotschy. Floruit Augusto. Fl. albi.

Tutti i rami, le foglie specialmente di sotto, i picciuoli, i peduncoli, le brattee, e la parte inferiore del calice, biancheggiano di una pelurie folta ed orizzontale. È affine al *Cl. serratum* Spr., da cui però differisce pei rami angolati, per la lunghezza dei picciuoli, che agguagliano quasi le lamine, per le foglie pelose al di sotto, pei peduncoli ascellari triflori sparsi, pei calici profondamente divisi in cinque denti. Il *Cl. serratum* invece ha rami rotondi, foglie quasi sessili ed affatto prive di peli, fiori in pannocchia brachiata, calici indivisi o appena dentati. Ved. W. *Sp. pl.* III. P. I. pag. 384 sub *Volkameria serrata*.

25. CROTON LACERUM Desf. var. PALMATUM H. Pat.

Differisce dalla specie per le foglie profondamente divise in lobi bislungi lineari, mentre in quella le foglie sono più larghe, ed i lobi assai brevi.

26. CROTON CASARETTIANUM Vis.

C. fruticosum stellato-hispidum, ramis patentibus, foliis subcordato-ovatis serrulato-glandulosis, supra scabriusculis viridibus, subtus stellato-tomentosis canis, apice acuminatis, spicis crassis dioicis nutantibus, foemineis serotinis, glandulis baseos floris masculini quinis sessilibus.

Hab. circa Bahiam, ubi floret a Decembri ad Januarium:

semina legit et benevole communicavit cl. Casaretto. In tepidario nostro flores masculi apparuere mense Augusto: his delapsis, sequenti mense flores foeminei.

27. CAPRARIA SALICIFOLIA Lk et O.

Sono sinonimi di questa specie, oltre quelli indicati dallo Steudel, anche la *Freylinia lanceolata* G. Don, coi sinonimi che lo Steudel stesso vi appose, distinguendola dalla prima.

28. CYTISUS ALSCHINGERI Vis. *Sem. H. Pat.* 1840.

C. fruticosus, adpresse canescens, petiolis canaliculatis, foliis oblongis utrinque attenuatis, ramis racemisque patulis apice nutantibus, calycibus sinu profundo acuto labiatis, labio inferiore ovato-lanceolato longiore, leguminibus margine incrassatis.

Hab. in montibus Vellebith Dalmatiae.

Affine al *C. Laburnum* L., il quale ne differisce nei picciuoli delle foglie piani, nei rami e racemi verticalmente pendenti, nei calici smarginati d'ambe le parti mediante un seno rotondo, e perciò leggermente labbiati.

29. DAHLIA MINOR Vis. *Sem. rar. H. Pat.* 1839.

Sembrami che questa pianta, e la *Dahlia Mercki* Lehm., e la *Dahlia scapigera* Otto sieno tutte la stessa specie. I due primi nomi sono anziani di data al terzo, ma contemporanei fra loro quanto all'epoca di loro pubblicazione.

30. DIANTHUS CILIATUS Gusson.

Appartengono a questo, come sinonimi, il *D. racemosus* Vis. ed il *D. littoralis* Host.

31. DIANTHUS VIRIDESCENS Vis.

Di questa specie pubblicò di recente il dott. Clementi una accurata frase specifica negli *Atti della quarta Riunione degli Scienziati Italiani*, Firenze 1842, pag. 521.

D. caule basi ramoso, ramis superne scabris dichotomis, foliis linearibus acutiusculis, mediis superioribusque tenuissime serrulatis, squamis calycinis saepius binis late obovatis longe cuspidatis, petalis obovato-cuneatis laciniato-dentatis supra pilosis, subtus discoloribus.

Hab. in Dalmatiae montanae locis campestribus.

Fiori rosei, verdognoli per di sotto. Affine al *D. pubescens*, che ne differisce a prima giunta per essere peloso vischioso, e per petali giallo-pallidi e non verdi al di sotto.

32. DIOSMA HÜGELIANA Vis.

Mi venne dal Giardino del sig. Hügel sotto il nome di *D. phoenicea*. Non convenendo però un tal nome ad una pianta che fa fiori di color lilla, ho dovuto sostituirla un altro, e l'ho intitolata al proprietario del sopradetto Giardino. Può definirsi così:

D. foliis lanceolatis acutis supra subconcavis, subtus carinatis glandulosisque, patulis ramisque hirtis, umbellis terminalibus multifloris hirtis.

I suoi rami sono ascendenti, le foglie rade. È affine alla *D. hirta* Vent. DC. *Prodr.* 1. pag. 715-716; ma ne diversifica per le foglie rade ed orizzontali, mentre sono folte, ritte ed embriciate nell'altra, pei fiori in ombrella e non in corimbo, e per l'ovario privo di ghiandole.

33. ELAEAGNUS FERRUGINEA Rich.

Corre negli Orti sotto il falso nome di *Capparis Breynia*. La nostra pianta differisce solo dalla descrizione datane dallo Sprengel (*Syst. veg. cur. post.* p. 47) pei peduncoli fiorali solitarii, mentre sono spesso ternati nell'*E. ferruginea*.

34. EUPHORBIA ATROPURPUREA Brousson.

A questa specie riferisco una pianta che coltivasi negli Orti botanici sotto il nome di *E. punicea* Sw. Differisce da questa per la mancanza delle grandi brattee colorate in rosso vivissimo, per gl'involucelli nè acuminati nè colorati come le brattee, per l'ombrella multifida, ec. Ha i principali caratteri dell'*E. atropurpurea*, assegnati a questa dal Willdenow nell'*En. pl. H. Berol.* 1. pag. 501: pure ne differisce alcun poco pei raggi dell'ombrella fiore non dicotomi, ma 4-5 fidi; per gl'involucri dei pedicelli lineari, e non bislungi unguicolari; per quelli dei fiori appena connati alla base.

35. FICUS SAUSSUREANA DC.

Si coltiva comunemente negli Orti botanici sotto il falso nome di *Galactodendron speciosum*. Avendo fiorito a Ginevra presso il ch. sig. De Saussure, il cel. De Candolle lo descrisse e figurò col nome nuovo sopra indicato in apposita Memoria, che fu forse l'ultima delle numerose, svariate ed importanti pubblicazioni di quel grande uomo.

36. FIRMIANA PLATANIFOLIA Endl.

Fu questo genere fondato dal mio illustre antecessore il prof.

Gio. Marsili nel 1781 in una Memoria inserita nel Vol. I. dei *Saggi scientifici e letterarii dell'Accademia di Padova* MDCCLXXXVI. pag. 106, che s'intitola *Descrizione della FIRMIANA, albero esotico che ha portati fiori e frutti a maturità nel pubblico Giardino de' Semplici in Padova*, con due tavole. L'individuo di questa specie da lui descritto vive tuttora prospero e robusto nel bosco dell'Orto nostro. Nell'anno stesso, in cui il Marsili leggeva la sua Memoria, Carlo Linneo il figlio pubblicava altra descrizione della stessa pianta, avuta per opera del Murray dall'Orto stesso di Padova, nel *Supplementum plantarum systematis vegetabilium*, Brunsv. 1781, p. 423, sotto il nome di *Sterculia platanifolia*. Il Medicus però più tardi restituì il genere creato dal Marsili, chiamando questa pianta *Firmiana chinensis*; e di recente ciò confermarono lo Schott e l'Endlicher, appellandola *Firmiana platanifolia*.

37. HARIOTA SALICORNIODES DC. (non Adans.)

Nella descrizione datane dal DC. (*Mém. VIII. sur quelques espèces de Cactées*, pag. 22-23) sono alcuni caratteri che non concordano colle osservazioni da me fatte sulla pianta fiorente. Ne' suoi fiori io trovai soltanto dieci petali, e non già quattordici o quindici; vidi questi affatto ottusi, anzi rotondati nell'apice, nè quasi acuti, come gl'indica il DC.; vi annoverai da cinquanta a sessanta stami, in vece che venti circa; e quattro, non cinque stigmi.

38. HERPETION RENIFORME Hort.

Ebbi questa pianta sotto l'anzidetto nome dal ricco Giardino dei Duchi Litta a Lainate, diretto dall'abilissimo signor Linneo Tagliabue. Vi corrisponde qual sinonimo la *Viola reniformis* R. Br. *V. hederacea* Labill. β *elatines* DC. *Prodr.* 1. pag. 305.

39. HIBISCUS RAINERIANUS Vis. *Sem. H. Pat.* 1841.

H. suffruticosus tomentosus inermis, foliis cordatis quinque-angularibus crenato-dentatis, stipulis setaceis, involucello 5-partito patulo, alabastro pentaptero, calyce 5-lobato, corolla expansa, capsularum loculis polyspermis seminibusque glabris.

Hab. in Africa loco Reseres Tumad, ubi legit cl. Th. Kotschy. Semina munifice largitus est Sereniss. Archidux

Austriacae RAINERIUS, *scientiarum omnium et naturalium imprimis cultor fautorque insignis.*

Dee collocarsi fra le *Ketmie* nel *Prodr.* Vol. I. pag. 448 del cel. DC. La corolla n'è grande sulfurea, ed ha un'ampia macchia stellata sanguigna nella fauce.

40. JASMINUM FLEXILE Vahl.

Questa pianta differisce dal *J. tortuosum* W., *flexile* Jacq., che l'assomiglia grandemente, non per la mancanza della pubescenza, essendochè i picciuoli e gli ultimi ramoscelli sono brevemente pubescenti in entrambe le dette specie; nè per le foglie ovato-bislunghe in quello, lanceolate in questo, coltivando noi una varietà di quest'ultimo a foglie molto più larghe (*J. tortuosum* β *latifolium* H. Pat.), come dicono gli autori, ma per le foglioline cuneate alla base e lucenti al di sotto nel *J. flexile*, ovate alla base ed opache nel *J. tortuosum*; e più ancora pei denti del calice minuti, quasi ovati, ottusi con punta e diritti in quello, subulati acuti e divergenti nell'altro.

41. IPOMOEA FICIFOLIA Lindl.

È diligentemente descritta e figurata dal ch. Lindley nel *Botan. Reg.* 1841, n.° 3, pag. 13. Coltivasi però negli Orti sotto il nome di *J. Aitoni* Lindl., che non trovo indicata se non di nome, ma che deve differire certamente dalla nostra, se tutte due queste specie sono fondate da un medesimo autore. Non può poi cader dubbio sulla esatta determinazione della pianta da noi coltivata, perchè in tutto conforme alla descrizione e figura sopra citata.

42. IPOMOEA SCHLECHTENDALII Vis.

Vi appartiene come sinonimo la *J. lilacina* Kunze *Del. Sem. Hort. Lips.* 1841, non *Blume*, nec *Schranck*, *Pharbitis lilacina* Schlecht. È pianta perenne, nativa del Messico.

43. JUSTICIA CARNEA Lindl.

È identica alla *J. longiflora* Vis. in *Sem. rar. H. Pat.* 1839.

44. JUSTICIA RIVINIAEFOLIA Vis. *Sem. rar. H. Pat.* 1839, n.° 3.

J. caulibus suffruticosis nodosis apice sulcatis pilosis, foliis ovatis acuminatis petiolatis puberulis integris, pedunculis axillaribus patulis, florum fasciculis binis bifloris, bracteis lineari-spathulatis obtusis, intimis calycisque laciniis aequalibus lanceolato-linearibus, corolla labiata tubo tor-

to resupinata, labio superiore ovali bidentato, inferiore oblongo truncato-trilobo, antherarum loculis alternis. Vis.

Vedi *Nuovi Saggi dell'Accad. di Padova*, Vol. V. 1840.

Specie elegante che lungamente fiorisce, e gira negli Orti sotto i falsi nomi di *J. violacea*, *elegans*, *speciosa*.

45. *KLEINIA CARNOSA* Vis.

È la *Cacalia carnosa* degli Orti botanici. Ignoro però se sia questa la *C. carnosa* Ait. H. Kew. 3. pag. 156, troppo brevemente descritta dagli autori. È poi ben diversa dalla *Kl. breviscapa* DC. *Prodr. V.* pag. 337, la quale ha un caule brevissimo carnoso, quasi villosa. Nella nostra sono molti cauli fruticosi tortuosi cinerei nudi liscii ramosissimi, a rami divaricati o riflessi, a foglie fascicolate in vetta ai rami, bislungo-lineari, carnose, liscie, striate, mucronate, convesse di sotto, canaliculate di sopra. Non ha peranco fiorito.

46. *LANTANA ASPERATA* H. Paris.

Non pare diversa dalla *L. nivea* Vent. La *Lantana involu-crata* L. coltivasi eziandio negli Orti sotto il nome di *L. cinerea* Lam.

47. *LEONOTIS RAINERIANA* Vis.

L. suffruticosa pubescens, foliis ovatis utrinque attenuatis crenatis, pseudo-verticillis densissimis haemisphaericis, calycis lanuginosi dentibus omnibus subulato-spinosis, supremo maximo ovato-cuspidato, corollis calyce duplo longioribus.

Hab. in Africa circa Kassan, ubi semina legit cl. Th. Kotschy: munifice largitus est Sereniss. Archid. Austriae RAINERIUS.

Vago suffrutice a grossi gruppi di fiori di color fulvo, simili a quelli della *L. Leonurus* Pers., però più piccoli.

48. *LINARIA WEBBIANA* Vis.

L. suffruticosa glabra, caule divaricato diffuso, ramis filiformibus, foliis alternis lineari-lanceolatis, hastatis integrisve, obtusis integerrimis patulis, longe petiolatis, floribus axillaribus solitariis, pedunculis capillaribus patentibus, calycis laciniis lanceolatis acuminatis, corollae pubescentis galea abbreviata obtusa biloba, fauce villosa, barba triloba, calcare subulato subincurvo, limbum duplo superante, filamentis villosis.

Hab. in ins. Lancerota maris Canariensis, ubi legit cl. Ph. Barker-Webb, et semina communicavit cl. A. Parolinio, a quo habui.

I fiori di questa umile pianticella sono citrini, il palato della corolla è giallo, la fauce n'è punteggiata di rosso.

49. MAMMILLARIA DECIPIENS Scheidw.

Dee preferirsi questo nome all'altro imposto alla medesima pianta dal Lemaire di *M. inuncinata*, come straniero alla lingua latina.

50. OCIMUM CITRIODORUM Vis. Sem. rar. H. Pat. 1840.

O. caule herbaceo pubescente, foliis petiolatis ovato-lanceolatis obtusis repando-dentatis glabriusculis, floralibus conformibus acutis integris brevi petiolatis ciliatis, racemi simplicis pseudo-verticillis 6-floris distantibus, pedunculis erectis calycibusque nutantibus extus et fauce villosis, dente supremo orbiculato leviter decurrente, lateralibus late ovatis apiculatis, infimis lanceolato-subulatis, corollis calyce majoribus, filamentis superioribus supra basim infractis ibique appendice penicilliformi munitis.

Hab. in Nubia. Pertinet ad sect. Hierocymum Benth. lab. gen. et sp. pag. 3. Vis. in Nuovi Saggi dell'Accademia di Padova, Vol. V. 1840.

È pianta semplicemente bienne, nè legnosa, quale mi parve prima, e pubblicai altra volta.

51. ONONIS BERNHARDII Vis.

Dovendosi mutare il nome di *O. macracantha*, con cui il ch. Bernhardi indicò nei cataloghi de' semi dell'Orto botanico di Erfurt questa pianta della Dalmazia, perchè quel nome specifico fu già prima adoperato dal Clarke per designare altra specie, trovo giusto d'intitolarla al primo suo scopritore.

52. ONOSMA VISIANII Clementi.

O. tuberculato-hispidissima, setis solitariis patentissimis uniformibus arcuatis, tuberculis nudis albo-papillosis, foliis inferioribus linearibus longissimis, caeteris lanceolatis basi attenuatis semi-amplexicaulibus, ramis paniculatis patentibus. Clementi in *Atti della terza Riunione degli Scienziati Italiani*. Firenze 1842.

Aveva io già raccolto in Dalmazia da più anni questa specie, ed esisteva tuttora incerta nel mio erbario, quando piac-

que al mio egregio Assistente dott. Clementi di nominarla da me. Vidi questa specie nell'erbario del cel. De Candolle sotto il nome tuttora inedito di *O. calycinum* DC.

53. *OXALIS CRENATA* Hort. (non Jacq.)

Questa specie coltivasi pe' suoi tuberj bernoccoluti giallicci semitrasparenti e mangiabili, nè potè finora essere descritta, perchè se ne ignorano i fiori. È però ben diversa dalla *O. crenata* di Jacq., ch'è pianta annuale, per cui dovrà mutarsi il nome alla prima.

54. *OXALIS DEPPEI* Lodd.

Si coltiva eziandio col nome di *O. esculenta*.

55. *PASSIFLORA SANGUINEA* Coll.

È la stessa pianta che la *P. coeruleo-racemosa* Sabin. DC.

56. *PHILLYRAEA DIVARICATA* Vis.

P. caule punctato-scabro, ramis divaricato-patentibus, foliis petiolatis oblongo-lanceolatis mucronatis integris, subtus costatis nervosis, racemis axillaribus abbreviatis 6-10floris nutantibus subsessilibus, pedicellis pubescentibus bractea elliptica pubescente cinctis, staminibus deflexis, stigmate crasso bilobo. — Hab.

Ebbi questa pianta dai Regii Giardini di Monza sotto il nome di *Olea divaricata* Desf., della quale non avvi descrizione in veruna delle opere da me vedute, nè anco nei Cataloghi dell'Orto di Parigi del Desfontaines, in cui trovasene il solo nome. Il portamento suo, ed il carattere dello stigma bilobo, e dell'ovario biloculare dispermo, mi persuadono a riporla tra le *Phillyreae*, anzichè fra le *Oleae*, benchè non abbia potuto vederne il frutto maturo. Fiori nell'Aprile di quest'anno.

57. *PIPER SPURIUM* Link.

Si è questo il *Piper nigrum* di moltissimi Orti botanici e Stabilimenti commerciali di piante, benchè sia facile a distinguerlo per le sue foglie cuoriformi alla base, mentre il vero *P. nigrum* L. le ha intere.

58. *PRUNUS MARASCA* Vis. (non Reichb.)

Il *P. Marasca* descritto dal ch. Reichb. *Fl. exc.* pag. 644, per le illustrazioni datane dallo stesso autore alla pagina 871 dell'Opera medesima, non è altro che il *P. Mahaleb* L., di cui mi consta che un raccoglitore di piante dalmate ha venduto esemplari in Germania pel vero *P.*

Marasca, da cui differisce sommamente. Questo è invece affine al *P. Cerasus*; ma avendone studiate le differenze, posso indicarne comparativamente i caratteri, che li distinguono.

P. Marasca Vis. *P. ramis divaricato-pendulis, foliis ovatis glabris, petiolis eglandulosis, petalis orbiculatis concavis basi complicatis utrinque auriculatis, fructibus globosis acidis.*

P. Cerasus L. *P. ramis erectis, foliis junioribus subtil lanuginosis, ovato-cuspidatis, petiolis biglandulosis, petalis ellipticis obovatisve basi planis integris, fructibus globosis dulcibus.*

59. PTEROCEPHALUS SIBTHORPIANUS Bertol.

Si è questa la mia *Scabiosa multiset*a, che credo eguale alla *Sc. Sibthorpiana* della Flora Greca. È però pianta diversissima non solo di specie, ma di genere la *Sc. silenifolia* W. et K., male a proposito dallo Steudel riferita tra' sinonimi della mia pianta, spettando agli *Asterocephalus*.

60. PYRUS AMYGDALIFORMIS Vill.

Vi appartengono quai sinonimi, oltre i già noti e riferiti dallo Steudel, il *P. cuneifolia* Gusson., *P. eriopleura* Reichb., *P. parviflora* Welden.

61. ROMULEA COELESTINA Vis.

Dovendosi preferire il genere *Romulea*, fondato dal Maratti sin dall'anno 1772, al *Trichonema* recentemente creato dal Ker, per diritto di anteriorità, il nome di *Trichonema coelestinum* dello Sweet dee conseguentemente mutarsi nel sopraddetto.

62. SALVIA LAMIIFOLIA Jacq.

Qui dee riferirsi la *S. leucanthera* Vis. *Sem. rar. H. Pat.* 1839.

63. SALVIA RECTIFLORA Vis. *Sem. rar. H. Pat.* 1839.

A questa appartiene come sinonimo la *S. tubiformis* Klotzsch, pubblicatasi la prima volta nel *Dietrich Gartenz.* ann. IX. n.° 15. pag. 113, nel 10 Aprile 1841, e quindi due anni dopo la descrizione da me stampatane nel Catalogo sopra citato, ed un anno dopo della seconda pubblicazione da me fattane nei *Nuovi Saggi dell'Accademia di Padova*, Vol. V. 1840, ove ne porsi la storia più compiuta e circostanziata. Trovasi bene rappresentata questa bella pianta nelle *Icon. plant. rar. Hort. Berol.* fasc. I. pag. 70.

tab. 28., che uscirono in quest'anno per cura dei chiarissimi direttori di quell'insigne Stabilimento i signori Link, Klotzsch ed Otto.

64. SATUREJA MONTANA L.

Nel *Nomenclator botanicus*, ediz. II. dello Steudel, a torto si pone qual sinonimo di questa specie la *S. cuneifolia* Tenor., alla quale invece appartiene la mia *S. spicata*, e la *S. obovata* Lagasc.; come a torto del pari si dà il sinonimo della *S. hyssopifolia* alla *S. subspicata*. La *S. hyssopifolia* Bertol. è invece la stessa cosa che la *S. montana* del Linneo, e forse la stessa *S. subspicata* non n'è che una varietà, modificata dalle situazioni più fresche ed elevate, ove questa suol crescere a preferenza della *S. montana*.

65. SEMPERVIVUM MOLLE Vis. Sem. H. Pat. 1841.

S. bienne pilis brevibus longioribusque molliter villosum, caule herbaceo tereti erecto dichotomo subflexuoso, foliis ovali-rhombeis longe petiolatis patulis, subtus rubro maculatis, floribus dichotome cymosis, petalis 10-12 lanceolato-cuspidatis patentibus, squamis minimis integris vel subdentatis.

Hab. in Nubia, ubi legit cl. Th. Kotschy.

È affine al *S. dichotomum* DC., ma ne differisce, secondo la breve diagnosi datane dall'Autore, per le foglie di forma diversa da quello, ed a picciuoli tre volte più lunghi della lamina e lineari, pei fiori cimosi e non corimbosi, pel numero dei petali, e per la minutezza delle squame.

66. SIDA HETEROSPERMA Vis. loc. cit.

S. suffruticosa velutina stellulato floccosa, caulibus teretibus, foliis cordato-acuminatis integris supra glabriusculis, stipulis setaceis, pedunculis axillaribus ramoso-paniculatis simplicibusque, folio longioribus, superne articulatis, corollis repando-crenulatis, carpellis 3-4 ovatis trispermis inflatis, apice divergentibus, cuspidatis.

Hab. in Africa loco Reseres Tumad dicto, ubi legit cl. Th. Kotschy. Flores flavi.

Questa specie sembra affine alla *S. excelsior* Cav., che però è pianta arborea, a stipole piccole e lanceolate, ed a cinque carpelli con due denti per ciascheduno. Le foglie giovani sono vellutate anche nella pagina superiore; col-

l'età perdono la pubescenza. In ogni carpello stanno tre semi, due dei quali nella parte superiore del medesimo opposti fra loro obovati-compresi, coperti di squamette stellate minutissime, setolosi nell'ilo; il terzo e inferiore è obovato-conico setoloso nell'apice, dove scorgonsi due fossette circondate da folti peli, nelle quali s'innicchia la base dei due semi superiori.

67. *SMILAX PSEUDOSARSA* Vis. *Sem. rar. H. Pat.* 1839.

S. caule angulato aculeis validis rectis armato, foliis cordatis et cordato-panduriformibus acutis subquiquenerviis coriaceis, margine spinosis, supremis inermibus, floribus umbellatis, baccis nigro-rubentibus.

Questo suffrutice, che da noi vive all'aperto, viene comunemente coltivato per la vera Salsaparriglia (*Smilax Sarsaparilla* L.); ma questa ne diversifica per gli aculei curvi, e per le foglie ovato-lanceolate inermi, ed un po' glauche di sotto. Somiglia alla *Sm. excelsa* Duh. *Arbr. ed. II.* Vol. I. pag. 236, tab. 54; ma le foglie di questa sono affatto inermi, appena coriacee, e secondo la figura data-ne le bacche sono verdi.

68. *SOLANUM MONODYNAMUM* Vis. *Sem. H. Pat.* 1841.

S. fruticosum inerme molliter pubescens, ramis dichotomis divaricatis, foliis petiolatis ovatis acuminatis integris, pedunculis extraxillaribus et in dichotomia solitariis aggregatisque unifloris, basi articulato deciduis, calyce truncato decemdentato, dentibus subulatis alterne brevioribus, corolla rotata, staminum filamento altero reliquis duplo longiore. — Hab. in Mexico.

Questo frutice fa fiori bianchi a cinque pieghe esternamente verdognole, internamente violacee. Il suo frutto è una bacca di color rosso vivo, grossa quanto un pisello, nitida, biloculare, con molti semi schiacciati reniformi circondati da un margine ottuso un po' grosso e semipelucido.

69. *STACHYS PUBESCENS* Tenor.

A torto si cita da qualche autore tra i sinonimi di questa pianta la *St. fragilis* da me descritta, che non ha con quella la più piccola somiglianza. Vis. *Fl. Dalm.* Vol. I. tab. 16.

70. *TAGETES LUCIDA* Cav.

Non è pianta annuale, come afferma lo Steudel, ma perenne, anzi suffruticosa.

71. **TEUCRIUM EUGANEUM** Vis. *Sem. rar. H. Pat.* 1836.

T. perenne, foliis cordato-oblongis crenatis petiolatis, racemo simplici terminali solitario secundo, bracteis petiolatis cordatis acuminatis pedicello longioribus, calicis dentibus infimis medios superantibus, corollae tubo villosa.

Hab. in sylvaticis collium Euganeorum prope Patavium.

Simile al *T. Scorodonia*, e con questo lungamente confuso, ne differisce perchè quest'ultimo ha racemi aggregati o ramosi alla base, tutti i quattro denti inferiori del calice quasi d'uguale lunghezza, il tubo della corolla pressochè senza peli, e le brattee di forma ovale-romboidea, ristrette ad ambe l'estremità, molto più piccole, eguali al peduncolo, o più corte di questo. La corolla è bianca in entrambi; ma il labbro inferiore è rossiccio nel *T. euganeum*, gialliccio nell'altro.

72. **TILLANDSIA? DURATHI** Vis.

T. argenteo-lepidota, foliis inferioribus lanceolato-subulatis crassis canaliculatis inermibus subtus convexis carinatisve, patulis recurvis aut circinatis, caule florifero multo brevioribus, caulinis bractaeiformibus adpressis brevissimis, panicula terminali contracta compressa e spiculis 3-5-floris bracteatis pedunculatis, floribus alternis distichis approximatis unibracteatis sessilibus, perianthii phyllis exterioribus basi coalitis aequalibus viridibus, interioribus liberis longe unguiculatis, lamina subrotunda undulata, anteris basifixis, stylo pyramidato trisulco.

Ebbi questa singolarissima pianta dalla gentilezza del signor Marchese Marcello Durazzo in Genova sotto il nome di *Tillandsia floribunda*, che non può conservarsi, perchè adoperato dal cel. Humboldt e Bonpland per indicare altra pianta. I fiori sono di color viola sbiadato con odore di violaciocche. Vive sospesa in aria senza terra e senza radici, al pari della *Tillandsia dianthoidea* del Rossi, che vince di vaghezza e di robustezza. Differisce notabilmente dalle *Tillandsie* per le foglioline esterne del perianzio eguali fra loro, per le interne libere e non connate in un tubo, per le antere terminali ed erette, ned incumbenti ed attaccate pel dorso; e finalmente per lo stilo pirami-

dale e non filiforme. I quali caratteri se fossero costanti, ciocchè mi propongo di riconoscere quando la pianta che ne possego metterà fiori, basterebbero certamente a farne un nuovo e distinto genere. Per più circostanziata notizia della medesima veggasi la mia Memoria intitolata *Illustrazione delle piante nuove o rare dell'Orto botanico di Padova*, nel Vol. V. dei *Nuovi Saggi* di quest' Accademia.

73. TREVESIA PALMATA Vis.

Nelle *Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino* per l'anno 1841, Serie II. Tom. IV. pag. 257, ho pubblicato un mio scritto *Sopra la Gastonia palmata di Roxburgh, proposta qual tipo di un nuovo genere nella famiglia delle Araliacee*. I caratteri di questo genere, che ho nominato *Trevesia*, sono minutamente descritti, ed oltre a ciò delineati nella tavola che accompagna quella Memoria.

74. TRIFOLIUM LATINUM Sebast.

Tolgasi dai sinonimi di questa specie, bene rappresentata nel Prodroino della Flora Romana del Sebastiani e del Mauri alla tav. 6., il mio *Trifolium dalmaticum*, che non ha punto che fare con quello, come sospettò il Presl indotto forse in errore da un falso esemplare; ed invece alla mia pianta appongansi quai sinonimi certi il *T. maculatum* Host. *Fl. Austr.*, ed il *T. lucanicum* Gasparr. in Gusson. *Fl. sic. prodr.*, tutti e due posteriori di tempo al primo nome da me imposto alla specie dalmata.

75. TULIPA ODORATISSIMA Vis.

T. glauca, caule unifloro pubescente, foliis ovato-oblongis acuminatis undulatis, perianthio campanulato, phyllis externis ellipticis basi cuneatis, apice complicato-acuminatis patentibus, internis obovatis abrupte apiculatis erectis, omnibus basi intus macula rhomboidea (flava) antice leviter fimbriata, fascia semilunari biloba rubra supercincta notatis, staminum pistillum aequantium filamentis anthera brevioribus, polline atro-purpureo.

Questa fragrantissima specie di Tulipano, che debbo alla cortese amicizia del sig. dottore F. Guolo, passionato ed intelligente amatore di orticoltura, differisce dalla *T. suaveolens* Roth, volgarmente detta *Duc de Toll*, con

cui venne indebitamente confusa, perchè in quest'ultima le foglie superiori sono lineari-lanceolate, e non simili alle inferiori; le foglioline del fiore sì esterne che interne uguali di forma fra loro, ma diverse nella figura della macchia che trovasi alla base delle medesime; i filamenti degli stami più lunghi delle antere, ed il polline giallo. Nella nostra le foglioline suddette, tranne la macchia della base, sono bianche di dentro, rosse di fuori, ed ivi orlate di bianco con macchia giallo-verdicia presso al peduncolo. È molto più grande e robusta dell'altra; ha foglie molto più larghe, e spira l'odor dei fiori dello *Spartium junceum* L.

76. VALLISNERIA MICHELII Savi.

Crescono spontanee nella Provincia di Padova ambedue le specie europee della Vallisneria, che il rispettabile Cav. G. Savi fu il primo a distinguere colle denominazioni di *V. Michelii* e *V. Jacquini*, e che lo Sprengel cangiò poscia immeritamente in *V. Micheliana* e *Jacquiniana*, senza pure indicare i sinonimi dell'illustre Botanico di Pisa. Ma la prima di queste non cresce che nelle acque termali; la seconda in tutte le acque comuni e stagnanti, fino anche nella città; ed è da Padova ch'ebbe il Jacquin figlio la specie che descrisse e figurò nelle sue *Eclogae plantarum*.

77. VELEZIA RIGIDA L.

Non è già pianta legnosa, come afferma lo Steudel, ma annuale ed erbacea.

78. VERBENA DENTATA Hort.

V. fruticosa erecta pubescens scaberrima, foliis ovato-ellipticis grosse serratis rugulosis nervosis coriaceis rigidis, spicis axillaribus oppositis filiformibus rectis cano-lanuginosis, corolla aequaliter subrotundo-quadriloba, fauce villosa, tetrandra.

Questo frutice, di cui ignoro la provenienza, vive con qualche cura all'aperto. I suoi fiori in lunghe spiche semplici, composte di falsi verticilli di 4 a 5 fiori con sottili brattee sottoposte, e di colore violetto, nonchè le sue foglie, sono odorosi.

79. VERBESINA TRIPLINERVIA Vis. Sem. rar. H. Pat. 1839.

V. suffruticosa, scabro-pubescens, foliis oppositis alternisve

petiolatis ovali-acuminatis mucronato-serrulatis triplinerviis, capitulis solitariis axillaribus terminalibusque brevissime pedunculatis, radiatis, ligulis uniseriatis, acheniis alatis aristis binis aequalibus.

Hab. in Mexico.

Le foglie di questa specie variano alterne ed opposte nella stessa pianta, per cui non regge la distinzione proposta dal ch. DC. delle *Verbesine*, in quelle a foglie alterne, ed in quelle a foglie opposte. Appartiene alle *Verbesinarie* del medesimo autore.

80. **VIALIA MACROPHYLLA** Vis. *Sem. H. Pat.* 1840 et 1841.

Vialia nov. gen. *Involucrum tripartitum laterale calyce majus. Calyx ovatus 5-partitus laciniis conniventibus. Corolla 5-petala petalis rhomboideis spiraliter convolutis. Filamenta decem membranacea inferne coalita, quibusdam liberis, quinque fertilibus antheris cordato-oblongis bilocularibus cum petalis alternantibus, quinque sterilibus ligulatis emarginatis petalis oppositis. Styli 5 coaliti apice divisi. Carpella 5-bivalvia 4-5sperma, in capsulam arcte connexa, seminibus subrotundo-irregularibus angulatis rugulosis.*

Si è questa la *Hermannia macrophylla* Hortul. Questo genere è forse troppo affine alla *Melhania* di Forskahl; ne differisce però per la corolla convoluta chiusa, e pei filamenti alati, alcuni dei quali liberi. Se ciò non basta a differenziarla, sarà sempre una nuova specie, *Melhania macrophylla* Vis.

R. DE VISIANI

Prof. di Botanica, e Prefetto
dell'Orto di Padova.



ANNOTAZIONE

Sono avvertitamente escluse dal precedente Catalogo molte piante tuttavia dubbie od anonime, perchè non anco giunte a fiorire e fruttificare, e quasi tutte le varietà numerose, procurate dai fioristi ed orticultori, delle specie o più avvenenti o più utili, come quelle i cui nomi non sono punto scientifici, ed i caratteri che le distinguono assai leggieri e variabili. Si coltivano però anche queste in gran numero, ad ornamento e ricchezza dell'Orto nostro.

20474

PADOVA
COI TIPI DI ANGELO SICCA

Stampatore dell'Accademia

1842





3 2044 102 800 976



